




Geslachtsgebonden wetenswaardigheden

Teef

Teefjes worden loops en de leeftijd waarop de eerste loopsheid optreedt, varieert van 6 maanden leeftijd tot wel 1,5 jaar. Gemiddeld worden teven 2x per jaar loops. De duur van de loopsheid is 2 tot 3 weken. De teef is niet gedurende de gehele periode vruchtbaar, de eisprong en dus het dektijdstip, is ongeveer halverwege de loopsheid, maar varieert sterk. Om de loopsheid te voorkomen zijn er twee mogelijkheden. De prikpil is een hormooninjectie die gegeven kan worden tussen twee loopsheid periodes in. Deze methode heeft als bijwerkingen een grotere kans op baarmoederontsteking en melkkliertumoren. Een definitieve loopsheid preventie is castratie, ook wel sterilisatie genoemd. Hierbij worden de eierstokken verwijderd. Al op een jonge leeftijd (6 maanden) kan de sterilisatie plaatsvinden. Nadelen van een operatieve ingreep zijn: vachtveranderingen (bij een aantal rassen), het operatierisico en bij een aantal grotere rassen een toegenomen kans op incontinentie.

Reu

Voorhuidontsteking komt regelmatig bij reuen voor. De ontsteking is voor de hond niet schadelijk maar kan wel voor de eigenaar lastig zijn. Dominantie en "rijen" is gedrag dat door mannelijke hormonen wordt beïnvloed. Castratie kan dan soms helpen deze problemen te verminderen. Bijwerkingen van de castratie kunnen zijn: gedragsveranderingen, toename van het gewicht en (bij sommige rassen) vachtveranderingen.



Dierenartsen:

M.C.M. Imholz
H.M. de Ruijter
J. Deinum
J.M.D. van den Berg
M.H. Drummen

Jelsumerstraat 47
8917 EM Leeuwarden
Tel: 058-2123891
Fax: 058-2128367

Openingstijden:

Maandag: 08.00 uur t/m 19.00 uur
Dinsdag: 08.00 uur t/m 19.00 uur
Woensdag: 08.00 uur t/m 19.00 uur
Donderdag: 08.00 uur t/m 19.00 uur
Vrijdag: 08.00 uur t/m 18.00 uur
Zaterdag: 10.00 uur t/m 12.00 uur

Spreekuur uitsluitend op afspraak

Dependance Zuiderburen:

Het Zool 2
8939 BM Leeuwarden
Tel: 058-2123891
Spreekuur uitsluitend op afspraak

www.kliniekvoorgezelschapsdieren.com

Vaccineren van uw hond;



waartegen en waarom?



Parvo

Het parvovirus is een zeer besmettelijk virus. Vooral pups zijn erg gevoelig. Infectie vindt plaats door opname van besmette faeces (ontlasting). Het ziektebeeld kenmerkt zich door een hevig bloederige diarree. Geïnfecteerde dieren zijn vaak ernstig ziek en kunnen zelfs overlijden. Voor een goede bescherming moet een pup 3 maal goed gevaccineerd worden. Deze vaccinatie dient jaarlijks herhaald te worden. De eerste inenting is op 6 weken leeftijd.

Hondenziekte: Ziekte van Carré / Canine Distemper

Dit is een virusziekte waar vooral jonge honden gevoelig voor zijn. De infectie vindt plaats door opname van virusdeeltjes via de lucht. Preventief vaccineren kan al vanaf de leeftijd van 6 weken, de 2e inenting vindt plaats op 12 weken leeftijd. Volwassen honden worden om het jaar gevaccineerd.

Infectieuze leverziekte: HCC

Dit (adeno) virus wordt met name aangetroffen bij jonge honden. De infectie vindt plaats door inademing of opname van virusdeeltjes via de bek. De honden zijn acuut ziek met koorts en een pijnlijke buik waarbij braken en diarree op kunnen treden. De lever is vergroot en de ogen zijn geïnfecteerd. Vaccinatie vindt plaats op 6 en 12 weken leeftijd en bij volwassen honden om het jaar.

Ziekte van Weil: Leptospirose

Deze ziekte wordt veroorzaakt door leptospiren (bacteriën) en is besmettelijk voor de hond maar ook voor de mens. Geïnfecteerde dieren scheiden de leptospiren met de urine uit. Deze urine is infectieus voor dieren en mensen. Ratten spelen een rol in de overbrenging van de ziekte. Geïnfecteerde honden zijn ernstig ziek en hebben koorts. De nieren zijn ontstoken en er kan geelzucht ten gevolge van een leverontsteking optreden. Vaccinatie vindt plaats op 9 en 12 weken leeftijd. Daarna moet er jaarlijks gevaccineerd worden om een goede bescherming te houden.

Kennelhoest

Kennelhoest wordt door meerdere virussen (Para-influenza en Canine Adeno- type 2) en een bacterie (Bordetella) veroorzaakt. Besmetting vindt plaats door inademing of opname van besmette deeltjes via de bek. De ziekte wordt gekenmerkt door een harde droge hoest.

Bescherming tegen het parainfluenza- en adenovirus vindt plaats met de hondenziekte inenting. Tegen Bordetella kan door middel van een neusenting (druppels in de neus) of via een onderhuidse enting bescherming worden geboden. Sommige pensions verplichten deze enting ook.



Rabiës: Hondsdolheid

Hondsdolheid is een besmettelijke dodelijke aandoening voor de hond, maar ook voor de mens. Infectie vindt plaats via bijtewonden bijvoorbeeld door een vos, maar ook als er wondjes aan handen zijn, kan via likken de mens besmet worden. Geïnfecteerde dieren gaan gedragsveranderingen vertonen en kunnen agressief worden en overlijden. Vaccinatie is mogelijk en verplicht als dieren naar het buitenland gaan.

Herpesvirus

Dit virus geeft problemen bij drachtige teven. Een geïnfecteerde teef geeft de infectie tijdens de dracht of vlak na de geboorte aan haar pups door. Jonge pups kunnen ziek worden en overlijden. Bij de teef zelf kan het tot vruchtbaarheidsproblemen of abortus leiden. Vaccinatie is mogelijk.

Opvoeding / gedrag

Een pup moet veel leren. En een goed begin is essentieel voor de ontwikkeling van de hond. Bij de fokker vindt al de belangrijkste inprentingsfase plaats als de pup tussen de 5 en 7 weken oud is. De pup behoort dan kennis te maken met veel verschillende prikkels (vreemde mensen, kinderen, dieren en geluiden). Vanaf 8 weken leeftijd begint bij de pup de socialisatie fase, hij of zij maakt verder kennis met de wereld, de regeltjes binnen de groep en er worden weer vele nieuwe indrukken opgedaan. Hier begint een belangrijke taak voor de nieuwe eigenaar, een goede begeleiding in deze periode is van belang. Tevens begint nu ook de opvoeding, dit moet wel geleidelijk en rustig gebeuren, consequent zijn en het belonen van goed gedrag is essentieel. Mocht u vragen hebben over het opvoeden of het gedrag van een pup dan bent u welkom op onze puppy party. U kunt ook een afspraak maken met Marloes de Wit (paraveterinair en gedragsadviseur), zij kan u informatie geven over het opvoeden en het gedrag van uw pup. Als u de eerste maanden tijd investeert in uw pupje, dan hebben u en uw hond daar veel plezier van.

Gebit

Het gebit van uw hond is belangrijk, regelmatig bekijken is onderdeel van de opvoeding. Pups hebben net als mensen een melkgebit. Op ongeveer 3 maanden leeftijd beginnen ze met wisselen, eerst de snijtandjes en dan volgen de kiezen en de hoektanden. Vooral bij kleine rassen komt het voor dat de melkhoektanden blijven zitten. Dan is het nodig om deze te laten verwijderen zodat de volwassen hoektanden goed kunnen doorkomen en er geen standsafwijkingen en of ontstekingen ontstaan. Om tandsteen te voorkomen is het van belang om al op jonge leeftijd het gebit van uw hond te poetsen.

Buitenland

Als u met uw hond naar het buitenland wilt reizen, moet er aan een aantal voorwaarden zijn voldaan. De hond moet een chip of leesbare tatoeage hebben ter identificatie, ingeënt zijn tegen rabiës (hondsdolheid) en in het bezit zijn van geldig dierenpaspoort. Voor Engeland, Zweden en Noorwegen zijn nog extra eisen van kracht. Hierover kunt u informatie krijgen bij onze assistentes.



Chip

Een chip is een kleine microtransponder die onder de huid wordt geplaatst. Met een speciale reader is deze af te lezen. Er is een databank waar de gegevens worden opgeslagen (www.chipnummer.nl). Zo is uw pup als hij of zij wegloopt weer snel bij u terug. Voor het reizen naar het buitenland met uw hond is het dus verplicht. Als u een pup met stamboom heeft is deze al gechipt.

Ontwormen

Pups hebben vaak spoelwormen. De besmetting kan via de moedermelk plaatsvinden of zelfs al in de baarmoeder. Een spoelworminfectie kan diarree en groeiachterstand tot gevolg hebben. Ook mensen kunnen besmet raken met spoelwormen. Vooral kinderen kunnen geïnfecteerd raken, door eitjes die in de grond aanwezig zijn of in de vacht van het dier. Ontwormen is dus van belang. Pups kunnen vanaf 2 weken leeftijd ontwormd worden. Ze moeten minimaal 3 maal ontwormd worden met een tussentijd van 2 weken. Daarna om de 2 maanden tot ze een half jaar zijn. Volwassen honden moeten minimaal 2x per jaar ontwormd worden. Als er b.v. kleine kinderen in huis zijn of de hond eet veel honden of kattenpoep dan is 4x per jaar ontwormen verstandig. Naast spoelwormen komen er nog lint- zweep- en haakwormen voor; bij volwassen honden is het aan te raden om een breed werkend wormmiddel te gebruiken.

Vlooiën

Vlooiën zijn ongewenste gasten op uw hond en in huis. Alleen de volwassen vlo zit op het dier en voedt zich met het bloed van de hond of kat. De ontwikkeling van ei via larve tot pop vindt plaats in de omgeving van het dier, dus in uw huis.

Vlooiënbeten kunnen jeuk geven waardoor het dier gaat krabben. Sommige dieren kunnen overgevoelig (allergisch) worden, waardoor een enkele beet al een heftige jeukreactie tot gevolg kan hebben. Een goede vlooiënbestrijding is gebaseerd op het voorkomen van vlooiën. In verwarmde huizen kan de vlo het gehele jaar actief zijn. Dit betekent dat de behandeling gedurende het gehele jaar gegeven moet worden met een regelmatig interval. Vergeet niet dat alle katten en honden, die in het huishouden aanwezig zijn, behandeld moeten worden.

Teken

Teken zijn kleine spinachtige bloedzuigende parasieten. Zij boren zich door de huid van het dier en blijven gedurende meerdere dagen aangehecht, waarbij ze sterk opzwellen door de opname van bloed. Een volgezogen teek laat zich van het dier vallen en ontwikkelt zich in de natuur tot het volgende stadium in zijn levenscyclus of legt eieren als het een volwassen vrouwtjesteek betreft.

De beet van een teek kan voor een plaatselijke ontsteking zorgen. Sommige teken zijn besmet met bepaalde ziekten (zoals de ziekte van Lyme) en kunnen wanneer zij enige tijd op het dier aanwezig zijn die ziekte overbrengen. Het is daarom zaak om het dier te behandelen met een middel dat de teken afdoet. Dit soort middelen voorkomt niet dat de teek op de hond komt en het duurt enige tijd, soms tot 2 dagen, voordat de teek werkelijk sterft. Naast deze behandeling blijft een dagelijkse controle op teken belangrijk. Verwijder de gevonden teken op de juiste manier (beste is met een teekentang).

