



Vlooien

Vlooien zijn ongewenste gasten op de kat en in huis. En voorkomen is beter dan een vlooiënplaag in huis te moet bestrijden. Er zijn een aantal


middelen in de handel die u kunt gebruiken om de vlooiën op uw kat te bestrijden, niet alle middelen zijn echter even effectief. Daarnaast is het nodig om ook de omgeving/huis te behandelen. U moet wel alle katten behandelen en eventueel andere dieren (hond/konijn).

Castratie kater

Katers kunnen vanaf de leeftijd van 6 maanden gecastreerd worden. Deze ingreep vindt plaats onder algehele narcose. Gecastreerde katers hebben minder de neiging om te vechten, dit heeft ook als voordeel dat de kans op overbrenging van besmettelijke ziekten afneemt. Ook het risico van sproeien in huis wordt kleiner.

Sterilisatie poes

Poesjes worden krols en kunnen dan gedekt worden. Ze kunnen al krols worden als ze 5 maanden oud zijn. Om te voorkomen dat uw kat een nestje krijgt is het verstandig haar op jonge leeftijd (6 maanden) te laten steriliseren. Eigenlijk moeten we spreken van castratie, want de eierstokken worden verwijderd. Het gebruik van de poezenpil is af te raden, zeker langdurig gebruik. De nadelige bijwerkingen van het gebruik van de poezenpil, zijn een verhoogde kans op suikerziekte en het ontstaan van melkkliertumoren.



KLINIEK VOOR GEZELSCHAPSDIEREN

Dierenartsen:

M.C.M. Imholz
H.M. de Ruijter
J. Deinum
J.M.D. van den Berg
M.H. Drummen

Jelsumerstraat 47
8917 EM Leeuwarden
Tel: 058-2123891
Fax: 058-2128367

Openingstijden:

Maandag: 08.00 uur t/m 19.00 uur
Dinsdag: 08.00 uur t/m 19.00 uur
Woensdag: 08.00 uur t/m 19.00 uur
Donderdag: 08.00 uur t/m 19.00 uur
Vrijdag: 08.00 uur t/m 18.00 uur
Zaterdag: 10.00 uur t/m 12.00 uur

Spreekuur uitsluitend op afspraak

Dependance Zuiderburen:


Het Zool 2
8939 BM Leeuwarden
Tel: 058-2123891
Spreekuur uitsluitend op afspraak

www.kliniekvoorgezelschapsdieren.com

Vaccineren van uw kat;



waartegen en waarom?



KLINIEK VOOR GEZELSCHAPSDIEREN

Uw kat is ingeënt tegen katten- en niesziekte.

Kattenziekte (= panleukopenie) is een zeer besmettelijk virus ziekte die met name bij kittens en jonge katten ernstige problemen kan geven. De dieren kunnen er zelfs aan overlijden. De verschijnselen zijn koorts, braken en diarree en treden vrij acuut op. De infectie wordt overgebracht via de ontlasting. De eerste inenting kan vanaf de leeftijd van 8 weken worden gegeven en moet dan op 12 weken leeftijd herhaald worden. De vaccinatie dient om het jaar herhaald te worden om zo een goede bescherming te houden.

Niesziekte is een besmettelijke aandoening die door meerdere ziekteverwekkers (o.a. herpes en calicivirus) wordt veroorzaakt. De verschijnselen variëren van wat niezen en ooguitvloeiing tot algeheel ziek zijn. De infectie wordt overgebracht via direct contact en uitademingslucht. De eerste inenting kan vanaf de leeftijd van 12 weken worden gegeven en voor een goede opbouw van de afweer moet deze na 3 weken herhaald worden. Daarna moet de vaccinatie jaarlijks herhaald worden.

Het jaarlijks vaccineren van uw kat geeft bescherming tegen de belangrijkste ziekteverwekkers.



Andere besmettelijke ziekten bij de kat zijn:

FIV: = Feline Immunodeficiency Virus ofwel Katten Aids. Deze virusinfectie wordt met name door bijtwonden overgebracht. Een risico is de kater die een poes dekt en op die manier de infectie overbrengt, op tijd de katten castreren werkt dus preventief. Het afweermechanisme van de kat wordt onderdrukt. Infecties krijgen de kans om toe te slaan. Er is geen vaccinatie mogelijk.

FIP: = Feline Infectieuze Peritonitis. Dit is een besmettelijke ziekte die wordt veroorzaakt door een Corona virus, maar niet iedere kat met het corona virus ontwikkelt FIP. Er bestaat een natte vorm, waarbij er ten gevolge van een ontsteking vocht in de buikholte en borstholte wordt gevormd. Bij de droge vorm zijn er ontstekingshaarden in onder andere de nieren en in de lever aanwezig. Overbrengen gaat onder andere via de ontlasting. Vaccinatie is mogelijk, dit wordt echter niet standaard gedaan.

FELV: = Kattenleukemie. Dit is een virus infectie, waarbij de afweer van het geïnfecteerde dier wordt aangetast. De besmetting vindt plaats via direct contact. (speeksel, urine, ontlasting) of via de baarmoeder. Vaccinatie wordt alleen in overleg gedaan.

Rabiës: = Hondsdolheid. Vaccinatie tegen deze virusinfectie is verplicht als de kat mee naar het buitenland gaat. De vaccinatie is 1 jaar geldig. Overbrenging gaat via bijtwonden of likken aan wondjes of slijmvliesen. De dieren worden agressief en sterven. Voor de mensen is deze ziekte gevaarlijk, zij kunnen via dieren besmet raken.


Leuk; een kat in huis!

Wat kunt u doen om problemen te voorkomen?


Ontwormen

Spoel- en lintwormen zijn de meest voorkomende darmparasieten. Kittens worden vanuit het nest met spoelwormen besmet. Ook kinderen kunnen met deze spoelwormen besmet raken. Katten die veel buiten komen hebben veel kans op besmetting met spoelwormen. Bedenk dat 1 worm per dag 200.000 eitjes legt. Ontwormen kan al vanaf de leeftijd van 4 weken en dit dient met een tussentijd van 2 weken herhaald te worden tot ze 3 maanden zijn.

Hierna moet de kat iedere twee maanden ontwormd worden totdat de kat 6 maanden oud is. Daarna minimaal 2-4 keer per jaar de kat ontwormen, hoe vaak is afhankelijk van de leefwijze.



De lintworm



De spoelworm

Het ontwormen kan door middel van een pasta of tabletten. Het ontwormen van volwassen katten is mede afhankelijk van hun leefwijze. Katten die veel buiten zijn en wel eens een muis vangen, hebben een grotere kans op besmetting met wormen. Zij dienen dus vaker ontwormd te worden. Vlooiën brengen lintworm over, dus naast de bestrijding van de lintworm moeten ook de vlooiën bestreden worden.

