

Narcis

0,1% drift

clm



Middel	Toe- passings- tijdstip	Advies- dosering kg/ha of l/ha	Kg actieve stof kg a.s./ha	Milieu-effecten				Nuttige organismen	
				Grondwater		Water- leven MBP	Lucht kg a.s./ha	Bestuivers	Bestrijders
				organische stofklassen					
				<1,5%	1,5-3%	MBP	MBP	MBP	kg a.s./ha
Grondontsmetting ¹ , voor het planten									
Monam	aug	750	382,50	7500	3750	0	0,00	A	C
Warmwaterbehandeling / Bolontsmetting (bij 600 l aanhangend vocht /ha)									
Admire	aug-sept	0,05%	0,21	4500	1050				
captan 546 g/l	aug-sept	0,25%	0,82	27	27				
Dipper	aug-sept	0,13%	0,02	0	0				
Jet 5	aug-sept	0,50%	0,83	?	?				
Sportak / Mirage Elan	aug-sept	0,10%	0,27	0	0				
Sumislex vloeibaar	aug-sept	0,10%	0,30	15000	7800				
Topsin M	aug-sept	0,25%	0,75	2700	195				
Onkruidbestrijding, voor opkomst									
Actor	jan-feb	4	0,80	0	0	12	0,00	A	A
Chloor-IPC 400	sept-feb	5	2,00	200	0	0	0,06	A	A
Goltix WG	jan-feb	3	2,10	6300	210	4	0,00	A	A
Gramoxone	jan-feb	2	0,40	0	0	0	0,00	A	A
Pyramin DF	jan-feb	2	1,30	13000	1300	1	0,00	A	A
Reglone	jan-feb	3	0,60	0	0	22	0,00	A	A
Roundup	jan-feb	3	1,08	0	0	1	0,00	?	A
Stomp	jan-feb	2	0,80	0	0	12	0,15	?	A
Touchdown	jan-feb	2,7	1,30	0	0	0	0,00	A	A
Onkruidbestrijding, na opkomst									
Aramo	april-juli	2	0,10	6	2	0	0,01	?	?
Focus Plus	april-juli	4	0,40	1040	520	0	0,34	A	A
Fusilade	april-juli	1,5	0,19	465	150	0	0,03	A	A
Goltix WG	april-juli	1	0,70	700	7	1	0,02	A	A
Herbasan	april-juli	2	0,32	440	64	1	0,00	A	A
Targa Prestige	april-juli	1,5	0,08	12	0	0	0,00	A	A
Luis/virusbestrijding, na opkomst									
Calypso	april-juni	0,25	0,12	48	1	0	0,00	B	B
Decis Micro	april-juni	0,16	0,01	0	0	7	0,00	B	C
Karate Zeon	april-juni	0,05	0,01	0	0	0	0,00	C	C
Splendid	april-juni	0,4	0,01	0	0	7	0,00	B	C
Sumicidin super (>2 toepassingen/jaar)	april-juni	0,4	0,01	0	0	4	0,00	C	C
Sumicidin super (max. 2 toep./jaar)	april-juni	0,4	0,01	0	0	1	0,00	C	C
Vuurbestrijding, na opkomst									
Allure vlb	april-juli	1,5	0,65	990	81	1	0,11	?	A
Daconil	april-juli	2,2	1,65	3300	264	1	0,25	A	A
Flint ²	april-juli	0,25	0,13	0	0	1	0,01	?	?
Folicur 25 WG ²	april-juli	0,6	0,15	3780	900	0	0,01	A	A
Frupica	april-juli	0,35	0,18	0	0	0	0,02	A	?
Kenbyo ²	april-juli	0,4	0,20	1480	1280	1	0,01	?	A
mancozeb vlb ³	april-juli	4	1,80	2320	180	0	0,23	A	B
maneb spp ³	april-juli	2,5	2,00	2500	200	0	0,26	A	B
Mirage Plus 570	april-juli	1,5	0,86	0	0	2	0,35	?	A
Nautilus	april-juli	1,25	0,89	1625	99	0	0,11	?	?
Ronilan FL ⁴	april-juli	0,5	0,25	3	1	0	0,03	A	A
Shirlan	april-juli	0,4	0,20	0	0	1	0,08	A	A
Narcisvliegbestrijding, na opkomst									
Perfekthion	mei-juli	1	0,40	1	0	0	0,14	C	C

¹ Bij grondontsmetting en grondbehandeling is de drift 0%.

² Rond de bloei middel toevoegen.

³ Niet in Bloembollenstreek.

⁴ Ronilan is per 31-12-2006 niet meer toegelaten maar heeft een opgebruiktermijn tot 31-12-2007.

Legenda

Grondwater
Waterleven
Lucht
Nuttige organismen

Eenheid

MBP
MBP
kg a.s./ha

Kleuren

≤ 100
≤ 10
≤ 0,12

> 100 en ≤ 1000
> 10 en ≤ 100
> 0,12 en ≤ 0,42

> 1000
> 100
> 0,42

A Bruikbaar in geïntegr. teelt

B Beperkt bruikbaar

C Niet bruikbaar

? Risico niet bekend

Toelichting en streefwaarden

Met de Milieu-effectenkaart is het mogelijk om bestrijdingsmiddelen te vergelijken op het risico voor uitspoeling naar grondwater, waterleven in de sloot, vervluchting naar de lucht en nuttige organismen.

- Het risico voor uitspoeling naar het grondwater is weergegeven in Milieubelastingspunten (MBP). Een score van 100 MBP komt overeen met de toelatingsnorm van het College voor Toelating van Bestrijdingsmiddelen (CTB). Het risico voor uitspoeling is vaak afhankelijk van de hoeveelheid neerslag die valt. Daarom is op deze kaart (indien relevant) onderscheid gemaakt in toepassingstijdstip. In het najaar regent het immers meer dan in het voorjaar.
- Het risico voor waterleven is weergegeven in Milieubelastingspunten (MBP). Een score van 10 MBP komt overeen met de toelatingsnorm van het College voor Toelating van Bestrijdingsmiddelen (CTB). De milieubelasting voor waterleven wordt bepaald door de hoeveelheid drift. Deze kaart gaat standaard uit van 0,1% drift, dat is een driftreductie van 90% te behalen door middel van spuittechniek. Bij een lagere driftreductie wordt de MBP-waterleven evenredig groter.
- De vervluchting naar de lucht is weergegeven in kg actieve stof/hectare. Streefwaarde in Telen met toekomst is 0,42 kg a.s./ha. De waarden op de kaart zijn afkomstig van Alterra en RIVM.

- Het risico voor bestrijders (natuurlijke vijanden zoals sluipwespen, lieveheersbeestjes, roofmijten) en bestuivers (bijen en hommels) is weergegeven met een symbool. Dit symbool geeft de bruikbaarheid in geïntegreerde teelt weer en is een samenvoeging van de effecten van bestrijdingsmiddelen voor elk afzonderlijk nuttig organisme. Meer gedetailleerde informatie kunt u vinden in de neveneffectengidsen van de verschillende leveranciers van nuttige organismen.

Informatie

Deze kaart is opgesteld door Telen met toekomst, in samenwerking met CLM.

De punten voor grondwater en waterleven zijn afgeleid van de CLM-Milieumeetlat. De BRI lucht is afkomstig van PPO, Alterra en RIVM en de symbolen voor nuttige organismen zijn gebaseerd op de neveneffectengids van Koppert Biological Systems. Voor meer informatie kunt u terecht bij uw begeleider van Telen met toekomst. De Milieu-effectenkaarten zijn digitaal verkrijgbaar op www.telenmettoekomst.nl.

Aansprakelijkheid

CLM en Telen met toekomst aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van eventueel in de Milieu-effectenkaart voorkomende onjuistheden en voor onbedoeld gebruik van de kaart.