

Overlegstrategie

Zeug met te weinig 'goede' spenen

Onvoldoende ruimte binnen afdeling

Biggen zoveel mogelijk bij eigen moeder groot laten brengen



Overleggen binnen afdeling zoveel mogelijk binnen 3 dagen



Overleggen binnen weekgroep zoveel mogelijk binnen 3 dagen



Gebruik van kunstzeug alleen voor biggen ouder dan 3 weken



Alleen als het niet anders kan een pleegzeug gebruiken



Overleggen over weekgroepen zoveel mogelijk binnen 3 dagen



Voor het maken van een pleegzeug is mogelijk een kunstzeug nodig

Onvoldoende ruimte over weekgroepen

* Vanuit gezondheidsoogpunt is het overleggen van biggen binnen en over weekgroepen af te raden

Colofon:

Deze advieskaart is een product van het netwerk Topproducenten met ondersteuning van het programma Netwerken in de Veehouderij. (juli 2007)

Hoe verlaag ik mijn biggensterfte?

Stem de voergift van zeugen af op het aantal zogende biggen.

Vuistregel: 1% van lichaamsgewicht aan onderhoudsvoer + 0,5 kg per big

Schakel 5 tot 7 dagen voor het werpen over op lactovoer. Bij een soepele voerovergang blijft mest smeug.

Voer niet teveel energie aan het einde van de dracht, dit kan ertoe leiden dat de zeugen slecht vreten na werpen.

Zorg voor goede voerovergangen tussen dracht- en kraamperiode. Bespreek dit regelmatig met uw mengvoeradviseur.

Strategische keuzes

- In kraamhokken met gietijzeren rooster onder de zeug en verder kunststofroosters is de biggensterfte gemiddeld lager dan bij een vloeruitvoering van beton en ijzeren roosters.
- Durf van eindbeer te wisselen. Overleg met uw fokkerijorganisatie welke keuze het beste bij uw omstandigheden past.

biggen

Zorg dat biggen direct na de geboorte zo min mogelijk afkoelen. Gebruik indien nodig werpmatjes of een lamp achter de zeug (let op hygiëne).

Behandel biggen op 3-4 dagen na geboorte en voer alle handelingen het liefst in één keer uit. Dit voorkomt stress bij biggen en is arbeidsefficiënter (behandel tomen met diarree later).

Sleep geen smerige behandelkragen of andere materialen van de ene naar de andere afdeling. Dit verhoogt de kans op verspreiding van ziektekiemen.

Beperk zoveel mogelijk het overleggen van biggen. Dit voorkomt veel stress en beperkt de overdracht van ziektekiemen (z.o.z.).

kraam

Zorg voor voldoende fris water in het kraamhok. Controleer regelmatig de kwaliteit van het water. Vlotterbakken zijn een potentiële bron van kiemen. Monteer spoelkranen zodat waterleidingen vlot doorgespoeld kunnen worden.

Zorg voor voldoende frisse lucht bij de zeug. Bij bestaande plafondventilatie met matige luchtverversing kan het aanbrengen van een 160 mm PVC-buis boven de kop van iedere zeug uitkomst bieden

Voor goede inseminatieresultaten geldt: durf te wachten met insemineren van berige zeugen. Te vroeg insemineren geeft lagere reproductieresultaten.

Sla zeugen die schraal uit de kraamstal komen bij de eerste berigheid over. Dit betaalt zich vaak uit in meer en vitalere biggen.

Insemineer pas gelten bij een gewicht van rond 150 kg en met een spekdikte van 11 - 14 mm (P2).

dek

Voer zeugen in begin van de dracht relatief hard. Dit zorgt voor uniformere tomen.

zeug

Varkens