

Aardbeien

Vermeerdering, 1% drift

clm



Middel	Toe-passings-tijdstip	Advies-dosering kg/ha of l/ha	Kg actieve stof kg a.s./ha	Milieu-effecten				Nuttige organismen	
				Grondwater		Water-leven	Lucht	Bestuivers	Bestrijders
				organische stofklassen					
				1,5-3%	3-6%	MBP	MBP	MBP	kg a.s./ha
Onkruidbestrijding									
Dual Gold	mrt-aug	0,7	0,67	0	0	1	0,13	A	A
Dual Gold	sept-feb	0,7	0,67	1	0	1	0,06	A	A
fenmedifam	mrt-aug	3,5	0,55	109	4	11	0,00	A	A
fenmedifam	sept-feb	3,5	0,55	277	7	11	0,00	A	A
Goltix	mrt-aug	1	0,70	7	1	14	0,01	A	A
Goltix	sept-feb	1	0,70	70	1	14	0,00	A	A
Herbasan SC, 75% driftreductie ¹	mrt-aug	6	0,96	192	6	5	0,00	A	A
Herbasan SC, 75% driftreductie ¹	sept-feb	6	0,96	480	12	5	0,00	A	A
Targa prestige	jan-dec	1,25	0,06	0	0	0	0,01	A	A
Ziektebestrijding									
Aliette	mrt-aug	7,5	6,00	0	0	0	0,12	B	B
Aliette	sept-feb	7,5	6,00	0	0	0	0,06	B	B
Captan 480 SC	mrt-aug	1,5	0,72	24	24	5	0,06	A	A
Captan 480 SC	sept-feb	1,5	0,72	24	24	5	0,02	A	A
Enzicur ²	jan-dec	1,5	0,11	0	0	0	0,00	?	?
Frupica	mrt-aug	0,9	0,45	0	0	8	0,03	A	A
Frupica	sept-feb	0,9	0,45	0	0	8	0,02	A	A
Nimrod ³	mrt-aug	1,25	0,31	138	0	9	0,03	A	A
Nimrod ³	sept-feb	1,25	0,31	163	0	9	0,02	A	A
Paraat	mrt-aug	3	1,50	45	3	0	0,02	A	A
Paraat	sept-feb	3	1,50	81	0	0	0,02	A	A
Rovral aquaflo	jan-dec	0,2	0,10	0	0	0	0,00	A	A
Rubigan 12 sc ⁴	mrt-aug	0,7	0,08	420	7	2	0,00	A	A
Rubigan 12 sc ⁴	sept-feb	0,7	0,08	420	4	2	0,00	A	A
Signum	mrt-aug	1,8	0,60	95	0	2	0,04	?	?
Signum	sept-feb	1,8	0,60	144	0	2	0,02	?	?
Stroby	mrt-aug	0,3	0,15	960	750	4	0,00	A	A
Stroby	sept-feb	0,3	0,15	9000	5700	4	0,00	A	A
Plaagbestrijding									
Apollo	mrt-aug	0,3	0,15	0	0	42	0,01	A	A
Apollo	sept-feb	0,3	0,15	0	0	42	0,00	A	A
Calypso	jan-dec	0,25	0,12	1	0	3	0,00	B	B
Cantack	mrt-aug	1	0,16	2	0	1	0,03	?	?
Cantack	sept-feb	1	0,16	34	0	1	0,02	?	?
Decis micro	jan-dec	0,08	0,01	0	0	34	0,00	B	C
deltamethrin (25 g/l)	jan-dec	0,2	0,01	0	0	34	0,00	B	C
Floramite	mrt-aug	0,4	0,10	0	0	3	0,01	A	A
Floramite	sept-feb	0,4	0,10	0	0	3	0,00	A	A
Milbeknock	jan-dec	0,5	0,01	0	0	5	0,00	A	C
Nissorun sp	jan-dec	0,5	0,05	0	0	0	0,00	A	A
Pirimor	mrt-aug	0,5	0,25	125	2	55	0,04	A	A
Pirimor	sept-feb	0,5	0,25	200	2	55	0,03	A	A
Spruzit-vlb	mrt-aug	1	0,20	2	0	727	0,06	A	A
Spruzit-vlb	sept-feb	1	0,20	160	140	727	0,04	A	A
Vertimec	mrt-aug	0,5	0,01	0	0	105	0,01	B	C
Vertimec	sept-feb	0,5	0,01	0	0	105	0,00	B	C
Aaltjesbestrijding									
Basamid, 0% drift ⁵	mrt-aug	300	297,00	9000	9000	0	0,00	A	A
Basamid, 0% drift ⁵	sept-feb	300	297,00	3300000	2220000	0	0,00	A	A
Monam, 0% drift ⁵	mrt-aug	750	382,50	3750	1500	0	0,00	A	C
Monam, 0% drift ⁵	sept-feb	750	382,50	2100000	1425000	0	0,00	A	C

¹ Voor dit middel gelden drifbeperkende maatregelen: drift = 0,25%.

² Enzicur alleen toegelaten in de bedekte teelt.

³ Nimrod alleen toegelaten in de vollegrond.

⁴ Vervallen, opgebruikt tot 1-7-08, niet toegestaan in grondgebonden teelt.

⁵ Bij grondbehandeling/grondontsmetting is de drift 0% .

Legenda

Grondwater

Eenheid

MBP

MBP

Lucht

kg a.s./ha

Nuttige organismen

A Bruikbaar in geïntegr. teelt

Kleuren

≤ 100

≤ 10

≤ 0,12

B Beperkt bruikbaar

> 100 en ≤ 1000

> 10 en ≤ 100

> 0,12 en ≤ 0,42

C Niet bruikbaar

> 1000

> 100

> 0,42

? Risico niet bekend

Toelichting en streefwaarden

- Met de Milieu-effectenkaart is het mogelijk om bestrijdingsmiddelen te vergelijken op het risico voor uitspoeling naar grondwater, waterleven in de sloot, vervluchtiging naar de lucht en nuttige organismen. Het risico voor uitspoeling naar het grondwater is weergegeven in Milieubelastingspunten (MBP). Een score van 100 MBP komt overeen met de toelatingsnorm van het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb). De milieubelasting voor waterleven wordt bepaald door de hoeveelheid drift. Deze kaart gaat standaard uit van 1% drift. Voor middelen waarvoor op het etiket extra driftbeperkende maatregelen zijn voorgeschreven is gerekend met een lager driftpercentage (zie voetnoot). Met onderstaande tabel kunt u het drift% behorende bij uw eigen situatie bepalen en de specifieke MBP's berekenen.
- De vervluchtiging naar de lucht is weergegeven in kg actieve stof/hectare. Streefwaarde in Telen met toekomst is 0,42 kg a.s./ha. De waarden op de kaart zijn afkomstig van Alterra en RIVM.
- Het risico voor waterleven is weergegeven in Milieubelastingspunten (MBP). Een score van 10 MBP komt overeen met de toelatingsnorm van het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb). De milieubelasting voor waterleven wordt bepaald door de hoeveelheid drift. Deze kaart gaat standaard uit van 1% drift. Voor middelen waarvoor op het etiket extra driftbeperkende maatregelen zijn voorgeschreven is gerekend met een lager driftpercentage (zie voetnoot). Met onderstaande tabel kunt u het drift% behorende bij uw eigen situatie bepalen en de specifieke MBP's berekenen.

Drift%, afhankelijk van de breedte van de teeltvrije zone en het type spuit.

Teeltvrije zone (cm)	Volveldsspuit (%)	Volveldsspuit + kantdoppen (%)	Volveldsspuit + driftarmedoppen 50% driftreductie (%)	Volveldsspuit + driftarmedoppen 75% driftreductie (%)	Volveldsspuit + driftarmedoppen 90% driftreductie (%)	Lucht-ondersteuning (%)	Rijensputten (%)
0	5,00	4,50	2,50	1,25	0,50	2,35	2,50
25	5,00	4,50	2,50	1,25	0,50	2,35	2,50
50	5,00	4,50	2,50	1,25	0,50	2,35	2,50
75	5,00	4,50	2,50	1,25	0,50	2,35	2,50
100	4,35	3,92	2,18	1,09	0,44	2,04	2,18
125	3,70	3,33	1,85	0,93	0,37	1,74	1,85
150	3,05	2,75	1,53	0,76	0,31	1,43	1,53
175	2,40	2,16	1,20	0,60	0,24	1,13	1,20
200	2,21	1,99	1,11	0,55	0,22	1,04	1,11
225	2,03	1,82	1,01	0,51	0,20	0,95	1,01
250	1,84	1,65	0,92	0,46	0,18	0,86	0,92
275	1,65	1,49	0,83	0,41	0,17	0,78	0,83
300	1,36	1,23	0,68	0,34	0,14	0,64	0,68
325	1,08	0,97	0,54	0,27	0,11	0,51	0,54
350	0,79	0,71	0,39	0,20	0,08	0,37	0,39
375	0,50	0,45	0,25	0,13	0,05	0,24	0,25
>375	0,50	0,45	0,25	0,13	0,05	0,24	0,25

Informatie

- Het risico voor bestrijders (natuurlijke vijanden zoals sluiwespes, lieveheersbeestjes, roofmijten) en bestuivers (bijen en hommels) is weergegeven met een symbool. Dit symbool geeft de bruikbaarheid in geïntegreerde teelt weer en is een samenvoeging van de effect-ten van bestrijdingsmiddelen voor elk afzonderlijk nuttig organisme. Meer gedetailleerde informatie kunt u vinden in de neveneffectengidsen van de verschillende leveranciers van nuttige organismen.

Deze kaart is opgesteld door Telen met toekomst, in samenwerking met CLM. De punten voor grondwater en waterleven zijn afgeleid van de CLM-Milieumeetlat. De BRL lucht is afkomstig van PO, Alterra en RIVM en de symbolen voor nuttige organismen zijn gebaseerd op de neven-effectengids van Kopert Biological Systems. Voor meer informatie kunt u terecht bij uw begeleider van Telen met toekomst. De Milieu-effectenkaarten zijn digitaal verkrijgbaar op www.telenmettoekomst.nl.

Aansprakelijkheid

CLM en Telen met toekomst aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van eventueel in de Milieu-effectenkaart voorkomende onjuistheden en voor onbedoeld gebruik van de kaart.