

## Narcis

1% drift



Middel	Toe- passings- tijdstip	Advies- dosering	Kg actieve stof	Milieu-effecten				Nuttige organismen	
				Grondwater		Water- leven	Lucht	Bestuivers	Bestrijders
				organische stofklassen					
				<1,5%	1,5-3%	MBP	MBP	MBP	kg a.s./ha
Grondontsmetting <sup>1</sup> , voor het planten									
Monam	aug	750	382,50	7500	3750	0	0,00	A	C
Warmwaterbehandeling / Bolontsmetting (bij 600 l aanhangend vocht /ha)									
Admire	aug-sept	0,05%	0,21	4200	840				
captan 546 g/l	aug-sept	0,25%	0,82	27	27				
Dipper	aug-sept	0,13%	0,02	0	0				
Jet 5	aug-sept	0,50%	0,83	?	?				
Sportak / Mirage Elan	aug-sept	0,10%	0,27	0	0				
Securo	aug-sept	0,50%	1,20	0	0				
Spore-stop	aug-sept	0,30%	0,13	0	0				
Topsin M	aug-sept	0,25%	0,75	2700	195				
Onkruidbestrijding, vóór opkomst									
Chloor-IPC 400	sept-feb	5	2,00	200	0	0	0,44	A	A
Goltix WG	jan-feb	3	2,10	6300	210	42	0,00	A	A
Pyramin DF, 75% driftreductie <sup>2</sup>	jan-feb	2	1,30	13000	1300	2	0,00	A	A
Reglone	jan-feb	3	0,60	0	0	219	0,00	A	A
Roundup	jan-feb	3	1,08	0	0	6	0,00	A	A
Stomp, 75% driftreductie <sup>2</sup>	jan-feb	2	0,80	0	0	30	0,19	A	A
Touchdown	jan-feb	2,7	1,30	0	0	3	0,00	A	A
Onkruidbestrijding, na opkomst									
Aramo	april-juli	2	0,10	6	2	2	0,00	?	?
Focus Plus	april-juli	4	0,40	1040	520	0	0,00	A	A
Fusilade	april-juli	1,5	0,19	465	150	2	0,03	A	A
Goltix WG	april-juli	1	0,70	700	7	14	0,01	A	A
Herbasan	april-juli	2	0,32	440	64	6	0,00	A	A
Targa Prestige	april-juli	1,5	0,08	12	0	0	0,01	A	A
Luis/virusbestrijding, na opkomst									
Calypso	april-juni	0,25	0,12	48	1	3	0,00	B	B
Decis Micro	april-juni	0,16	0,01	0	0	69	0,00	B	C
Karate Zeon, 90% driftreductie <sup>3</sup>	april-juni	0,05	0,01	0	0	2	0,00	C	C
Splendid	april-juni	0,4	0,01	0	0	68	0,00	B	C
Sumicidin super (>2 toepassingen/jaar)	april-juni	0,4	0,01	0	0	40	0,00	C	C
Sumicidin super (max. 2 toepassingen/jaar)	april-juni	0,4	0,01	0	0	5	0,00	C	C
Vuurbestrijding, na opkomst									
Allure vlb	april-juli	1,5	0,65	990	81	11	0,10	A	A
Daconil	april-juli	2,2	1,65	3300	264	7	0,25	A	A
Flint <sup>4</sup>	april-juli	0,25	0,13	0	0	7	0,02	?	?
Folicur 25 WG <sup>4</sup>	april-juli	0,6	0,15	3780	900	0	0,01	A	A
Frupica	april-juli	0,35	0,18	0	0	3	0,02	A	A
Kenbyo <sup>4</sup>	april-juli	0,4	0,20	1480	1280	5	0,01	A	A
mancozeb vlb <sup>5</sup>	april-juli	4	1,80	2320	180	4	0,20	A	B
maneb spp <sup>5</sup>	april-juli	2,5	2,00	2500	200	3	0,22	A	B
Mirage Plus 570	april-juli	1,5	0,86	0	0	21	0,63	A	A
Nautilus <sup>5</sup>	april-juli	1,25	0,89	1625	99	1	0,10	?	?
Rudis	april-juli	0,25	0,12	0	0	0	0,00	?	?
Shirlan	april-juli	0,4	0,20	0	0	14	0,02	A	A
Narcisvliegbestrijding, na opkomst									
Perfekthion	mei-juli	1	0,40	1	0	1	0,11	C	C

<sup>1</sup> Bij grondontsmetting en grondbehandeling is de drift 0%.

<sup>2</sup> Voor dit middel gelden drifbeperkende maatregelen: drift = 0,25%.

<sup>3</sup> Voor dit middel gelden drifbeperkende maatregelen: drift = 0,1%.

<sup>4</sup> Rond de bloei middel toevoegen.

<sup>5</sup> Niet in Bloembollenstreek.

## Legenda

Grondwater  
Waterleven  
Lucht  
Nuttige organismen

## Eenheid

MBP  
MBP  
kg a.s./ha

**A** Bruikbaar in geïntegr. teelt

## Kleuren

≤ 100  
≤ 10  
≤ 0,12

**B** Beperkt bruikbaar

> 100 en ≤ 1000  
> 10 en ≤ 100  
> 0,12 en ≤ 0,42

**C** Niet bruikbaar

> 1000  
> 100  
> 0,42

**?** Risico niet bekend

## Toelichting en streefwaarden

Met de Milieu-effectenkaart is het mogelijk om bestrijdingsmiddelen te vergelijken op het risico voor uitspoeling naar grondwater, waterleven in de sloot, vervluchting naar de lucht en nuttige organismen.

- Het risico voor uitspoeling naar het grondwater is weergegeven in Milieubelastingspunten (MBP). Een score van 100 MBP komt overeen met de toelatingsnorm van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb). Het risico voor uitspoeling is vaak afhankelijk van de hoeveelheid neerslag die valt. Daarom is op deze kaart (indien relevant) onderscheid gemaakt in toepassingsstijp. In het najaar regent het immers meer dan in het voorjaar.
- Het risico voor waterleven is weergegeven in Milieubelastingspunten (MBP). Een score van 10 MBP komt overeen met de toelatingsnorm van het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb). De vervluchting naar de lucht is weergegeven in kg actieve stof/hectare. Streefwaarde in Telen met toekorst is 0,42 kg a.s./ha. De waarden op de kaart zijn afkomstig van Alterra en RIVM.
- Het risico voor bestrijders (natuurlijke vijanden zoals sluipwespen, lieveheersbeestjes, roofmijten) en bestuivers (bijen en hommels) is weergegeven met een symbool. Dit symbool geeft de bruikbaarheid in geïntegreerde teelt weer en is een samenvoeging van de effecten van bestrijdingsmiddelen voor elk afzonderlijk nuttig organisme. Meer gedetailleerde informatie kunt u vinden in de neveneffectengidsen van de verschillende leveranciers van nuttige organismen.

## Drift en MBP waterleven

De milieubelasting voor het waterleven wordt bepaald door de hoeveelheid drift. Deze kaart gaat standaard uit van 1% drift. Voor middelen waarvoor op het etiket extra driftbeperkende maatregelen zijn voorgeschreven is gerekend met een lager driftpercentage (zie voetnoten). Als u standaard gebruik maakt van driftreducerende spuittechnieken zal de MBP waterleven ook voor de andere middelen lager uitkomen. Daarbij geldt dat door driftreductie van bijvoorbeeld 75% de MBP waterleven ook met 75% afneemt.

## Informatie

Deze kaart is opgesteld door Telen met toekorst, in samenwerking met CLM. De punten voor grondwater en waterleven zijn afgeleid van de CLM-Milieumeetlat. De BRL lucht is afkomstig van PO, Alterra en RIVM en de symbolen voor nuttige organismen zijn gebaseerd op de neveneffectengids van Kopert Biological Systems. Voor meer informatie kunt u terecht bij uw begeleider van Telen met toekorst. De Milieu-effectenkaarten zijn digitaal verkrijgbaar op [www.telenmettoekorst.nl](http://www.telenmettoekorst.nl).

## Aansprakelijkheid

CLM en Telen met toekorst aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van eventueel in de Milieu-effectenkaart voorkomende onjuistheden en voor onbedoeld gebruik van de kaart.