

Stalmanagement

Vuistregels helpen weerkerende problemen te voorkomen

Naarmate het afkalfseizoen vordert word ik telkenmale weer geconfronteerd met stallen die nokvol komen te zitten. Dit verhoogt uiteraard de infectiedruk waardoor de kansen op problemen zoals diarree, groeistilstand en sterfte toenemen. Voor de veehouder resulteert dit bijkomend in stijgende behandelingskosten en tijdverlies door de extra verzorging zoals het toedienen van antibiotica en van elektrolyten.

Een goed stalmanagement kan zeer veel problemen voorkomen. Het toepassen van enkele eenvoudige vuistregels kan wonderen verrichten op sommige bedrijven. De onderlinge bedrijfsverschillen bewijzen dit in onze groepspraktijk overduidelijk.

John Campe,
vakdierenarts rund



Tips voor een goed stalmanagement

Enkele vuistregels voor een goed stalmanagement dat zowel bij dier als veehouder veel leed voorkomt.

- Bewaak zorgvuldig de hygiëne bij het afkalven: een propere afkalfstal en veeverlosser, ontsmetten van de vulva, het wassen van de handen et cetera.
- Breng het kalf na de geboorte onder in een eenlingbox die proper en gedesinfecteerd is.
- Verschaf binnen de 24 uur 10 procent van het lichaamsgewicht van het kalf in de vorm van biest. Verse biest verdient de voorkeur op ingevroren biest. Ingevroren biest moet langzaam ontdooid worden in een warmwaterbad van maximaal 55° C (niet in de

magnetronoven!). Verstrekk steeds warme biest (39° C) om een goede opname te stimuleren. Uit onderzoek blijkt dat 35 procent van de kalveren te weinig biest of biest van onvoldoende kwaliteit heeft gehad.

- Houd de kalveren gescheiden van de oudere dieren om infectieoverdracht te voorkomen.
- Elk kalf verdient een eigen, propere speenemer.
- Vaccinatie van de koeien zorgt voor meer antistoffen in de biest waardoor we een betere bescherming bekomen van het kalf.
- Bij zoogkoeien dient de melkgift sterk in de gaten gehouden te worden. Sommige moederdieren geven te weinig melk waardoor het

kalf te weinig opneemt en verzwakt, wat resulteert in een hogere gevoeligheid voor infecties.

- In geval van kalverdiarree: hou het kalf warm onder een warmtelamp. Wissel de melkverstrekking af met een elektrolytoplossing. Laat mestonderzoek uitvoeren ter bepaling van de infectieuze kiem. Voeg 100 tot 200 milliliter biest bij in de melk. Dien eventueel antibiotica toe.

Heeft u vragen of wilt u meer informatie over dit onderwerp?

Raadpleeg uw dierenarts