



# Rassenbulletin Triticale 2004

Dit rassenbulletin geeft de eigenschappen en opbrengsten weer van het triticale rassenonderzoek. Dit rassenonderzoek vindt jaarlijks plaats op drie locaties in Nederland, twee op zandgrond (Rolde en Vredepeel) en één op dalgrond (Sibculo). De resultaten zijn geanalyseerd door het PPO-AGV. De in de tabel vermelde aanbevelingen zijn conform de 79<sup>e</sup> Aanbevelende Rassenlijst voor Landbouwgewassen 2005.

Overzicht van raseigenschappen bij triticale. Gemiddelden over de jaren 1999 t/m 2004.

		Lengte stro (rel.)	Stevigheid	Vroegheid aar	Vroegrijpheid	Resistentie tegen:			Korrelopbrengst relatief	
						Meeldauw	Bruine roest	Bladvlekkenziekte	Zandgrond	Dalgrond
<b>A</b>	Santop	98	8.0	7.0	8.0	6.0	9.0	7.0	103	101
<b>A</b>	Lupus	104	7.0	5.0	5.5	8.5	9.0	8.0	100	104
<b>B</b>	Eldorado	98	7.5	5.5	6.0	8.5	9.0	7.5	97	95
<b>Nieuw in Rassenlijst 2005</b>										
<b>N</b>	SW Talentro	83	9.0	7.5	8.0	8.0	9.0	7.5	116	113
<b>N</b>	Matinal	79	8.5	6.5	6.5	8.5	9.0	8.0	104	102
<b>N</b>	Triamant	93	8.0	8.0	8.5	8.0	9.0	6.5	113	113
<b>4 jaar onderzoek</b>										
	Dinaro	78	9.0	5.0	7.0	8.5	9.0	7.5	109	109
100 = ...cm, ton/ha		124							7.3	8.1

Alg: een hoog cijfer = gunstiger waardering voor de eigenschap; vroegheid aar: hoog cijfer = vroeger ras; vroegrijpheid: hoog cijfer = vroeger rijp.

Rubricering Rassenlijst 2005: A = algemeen aanbevolen ras; B = beperkt aanbevolen ras; N = nieuw ras