

Rantsoenschommelingen zijn voor **hoogproductieve koeien** in de wei gauw te groot.

Werk aan stabiel rantsoen

Bewaking van de voerkwaliteit is voor koeien die veel melk geven een belangrijk punt. Als ze op stal staan, is het dus aan te raden voer van hoge kwaliteit te geven. Hiermee kunnen veranderingen in het weidegras gecompenseerd worden. Een goede kwaliteit ruwvoer heeft meer invloed op de melkproductie dan bijvoeren met een krachtvoer.

► Schaar de koeien in als er 1.700 kilo droge stof per hectare is. Doorgaans bevatten deze weidesnedes veel DVE en rond de 1.000 VEM.

► Maak logische combinaties met kuil en weidegras. Het voorjaarsgras is meestal van goede kwaliteit. Probeer dit zo veel mogelijk te combineren met een graskuil van lagere kwaliteit. Zo compenseert het goede gras de tekorten in het voer van lagere kwaliteit.

► Voorkom een hoog ruweiwitgehalte in het gras door matig te zijn met stikstof. Zo bereikt u een laag ureumgehalte. Dit is gunstig voor de mestafvoer. Een ureumgetal van 20 is een goede richtlijn. Een ruweiwitgehalte in gras van 250 is te hoog, want dat gaat niet samen met een ureumgetal van onder de 20.

► Stel onbepert vers water beschikbaar. Vee met een hoge productie moet goed kunnen drinken. Een hoogproductieve koe kan op een warme dag met gemak 150 liter opnemen. Koud water is niet bevorderlijk voor de koe. Drinkwater van 17 graden is ideaal.

► Houd op erg warme dagen de koeien overdag binnen. Stuur ze in plaats van overdag 's nachts naar buiten. In de brandende zon staan de koeien vooral rond de waterbak (een

broedplaats van ziektekiemen) en van grazen is dan weinig of geen sprake. Het loont de moeite om de koeien 's nachts te weiden. De grasopname is in dat geval gelijk aan die van overdag. Het uitgangspunt is ongeveer 1 kilo droge stof per uur.

► Geef de koeien de kans om op hete dagen uit de zon te blijven. Als 's nachts weiden niet mogelijk is, zorg dan over-

dag voor beschutting in de wei.

► Denk eens iets langer na over de beste conserveringsmethode. Al is een graskuil praktisch en goedkoop, bij wisselende hoeveelheden kuil in het rantsoen kan broei gemakkelijk vat op het gras krijgen. Besteed extra aandacht aan de bepaling van de kuilafmetingen zodat de voersnelheid op peil blijft, of laat vierkante balen maken. ■

500 Duitse Campina-leden weg

Per 1 januari 2008 gaan 500 leden weg bij Campina in Duitsland. In totaal gaat het om 185 miljoen kilo melk.

De Duitse boeren vertrekken uit onvrede over de in het eerste halfjaar duidelijk lagere melkprijs dan bij andere Duitse zuivelaars. De Campina-melkprijs bestaat uit een voorschotprijs (95 procent van de verwachte melkprijs), zomerheffing en wintertoeslag. De ver-

trekkers gaan vooral naar de fabrieken Hochwald, Milch-Union Hocheifel en Humana.

Campina betreurt het verlies van een kwart van de Duitse leden die intensief benaderd zijn door de omliggende fabrieken. Bij Campina is de opzegtermijn 6 maanden, bij de concurrenten is dat 24 maanden. Campina moet de melkstromen wel aanpassen, maar verwacht hierbij geen grote problemen. ■