

1. Kwaliteit gras sturen (wat RE betreft):

bij weiden => In net even langer gras inscharen
en net even minder strooien

bij stalvoeren => Maaien als de stengel er in komt => "harder gras" maaien.
Voerstructuur voor gezondere koe en een beter (lager)
ureumgehalte in de melk.

2. Indien je 300 N wilt strooien op een grond die eigenlijk 340 N vraagt, moet je 300N nivo aanhouden, maar de september km gift verschuiven naar 1^e snede en daar optellen (1^e snede optimaal bemesten, najaar ouder N-niveau maar de nawerking +/- levering vangt dit wel op)!
3. Drijfmestonderzoek dient eerst een paar jaar achtereen gedaan te worden (Let wel: goede gemixte mest en voldoende mest in put). Als blijkt dat de samenstelling constant is, dan kun je wel een jaar overslaan. Let wel: als het rantsoen wijzigt, moet je weer een mestmonster nemen.
4. Bij bedrijven die gras voeren (weiden of stalvoeren), heeft de zomermest een duidelijk andere samenstelling dan de wintermest. Neem ook eens een zomermestmonster!
5. Doelstelling RE in versgras is 200-215 RE. Bemesting moet je afstellen op verwachte opbrengst. Daarmee stuur je op RE en dus op ureum in de melk. Bijvoorbeeld door de hele 1^e snede te maaien en daarna de koeien "snel" over de percelen te weiden. De eerste percelen dan één dag weiden. Deze percelen dienen voor dit snelle weiden geen stikstofbemesting te krijgen, maar *na* het weiden bemest te worden. Zo is RE in gras en ureum in melk te sturen.
6. Het herinzaaien op grasland oude zode levert 100kg N! Houd hier rekening mee bij bemesting bij herinzaai. Bij inzaai na maïs of bouwland: geen oude zode de N levert dan 50 kg N meer bemesten.
7. Een computerprogramma dat ondersteuning biedt bij het sturen op eiwit (RE is gras) is te vinden op: www.nmi-agro.nl. Het programma houdt ook rekening met de weermeetgegevens van de regio waar je gevestigd bent.
Het programma berekent de:
 - N-beschikbaarheid uit mineralisatie van de bodem
 - Stikstof nawerking uit dierlijke mest
 - Effect van de snedezwaarte! En geeft daarnaast advies over hoeveel kg N je meer of minder moet strooien t.o.v het advies uit de standaard tabellen en doet een berekening (en advies) over de verhoging of verlaging van het RE-gehalte van het verse gras!
8. **Verdeel je bedrijf in 2 a 3 blokken grond met vergelijkbare N-levering. Maak hiervan een berekening voor je kunstmestgift, je hoeft niet per perceel het te laten berekenen.**