

## Meedruppelen van Admire® in Roos tegen witte vlieg

<b>Informatie</b>	Het meedruppelen van Admire heeft vooral een effect op de larven van witte vlieg. Het middel kan optimaal werken wanneer het in voldoende mate in het blad terecht komt, waar de larven zitten: het oudere, ingebogen blad.
<b>Meedruppelen of spuiten</b>	Bij meedruppelen bij voorkeur het hele bedrijf behandelen of toedienen per kraanvak. Bij pleksgewijze behandeling kan worden gespoten.
<b>Goed resultaat</b>	Tussen maart en eind september, bij hoge verdamping
<b>Slecht resultaat</b>	Bij weinig verdamping en te veel drain; Als de plant dreigt slap te gaan als gevolg van te weinig water. Kokos: bindt Admire, waardoor effectiviteit slecht is.
<b>Vorbereiding</b>	Berekenen en onthouden/vastleggen van de inhoud van het watergeefstelsel per afdeling / kraanvak: hoofdleiding + semi-leidingen + druppelslangen. Navragen bij installateur – zie offerte of bestek van installatie Omrekenen naar aantal beurten c.q. liters voordat middel in voldoende mate bij de alle planten aankomt zodat bekend is: <ol style="list-style-type: none"> <li>hoeveel water er gegeven moet worden VOORDAT het middel bij de eerste plant komt</li> <li>hoeveel water er gegeven moet worden voordat de LAATSTE plant voldoende heeft gehad</li> </ol>
<b>Drainsilo leeg</b>	Zorg dat drainsilo zo leeg mogelijk is zodat alle drainwater opgevangen kan worden en kan worden hergebruikt (grecirculeerd), door: <ol style="list-style-type: none"> <li>(eventueel) tijdelijk het percentage hergebruik te verhogen</li> <li>Verhogen van de EC - voorregeling.</li> </ol>
<b>Bestrijdingshistorie</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Welke insecticiden zijn in het afgelopen halfjaar toegepast?</li> <li>➤ Afwisseling om resistentie te voorkomen</li> <li>➤ Admire max. 2 cycli per jaar – het late voorjaar en vroege najaar</li> </ul>
<b>Optimale toediening</b>	<b>GEEN gebruik van oxiderende middelen</b> in het watersysteem (Anti-Bloc; waterstofperoxide; etc) tijdens toediening in verband met afbraak Admire <b>Toedienen middel via de dagvoorraad:</b> zorg dat het met de laatste beurt van de vorige dag in het systeem zit <b>Injectie in de leiding of direct op de kraan:</b> middel tussen 10:00-12:00 uur bij de plant brengen <ol style="list-style-type: none"> <li>Kleine beurten vanaf drainmoment om drain te voorkomen.</li> <li>Zoveel water geven dat de laatste plant voldoende middel heeft gehad (evt. te controleren door rood ijzer als kleurstof mee te geven).</li> </ol>
<b>Na de toediening</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Op de dag van toediening: drain beperken tot max. 10%</li> <li>Zo lang mogelijk, en zeker minimaal 3 (zomer) tot 6 weken (winter) recirculeren om verliezen van middel te voorkomen</li> </ol>
<b>Herhaling</b>	Na ca. 7-10 dagen
<b>Na 2<sup>e</sup> of 3<sup>e</sup> toediening</b>	Ingebogen blad dat nog actief is bemonsteren om concentratie van middel te controleren. Adviseur of toeleverancier kan adviseren hoe de analyses te beoordelen.