

Rood op zwartbontbasis

Zwartbontstieren krijgen steeds meer concurrentie

Hoe presteren roodbonte stieren op zwartbontbasis? De roodbonte Andrieszoon Kian kan voor Inet prima mee in het zwartbontveld en wie betere uiers wil moet Tulip en Stadel niet vergeten.

roodbont	zwartbont
Stadel	Himster Grandprix
Kian	Laurenzo
Jerom	Downalane Cello
Beautiful	Noorder Dustin
Match 2	Hunter
Midwolder George	Swamo Jewel
Creyhorst Clor 2	Giessenhof Cashflow
Batenburg F Daan	Eastland Cash
Koerier 114	VAH Wonderboy
Cassius	Melchior
Subliem Tulip	Silverpost Sinatra
Broeklander Kibo	Etazon Slogan
Jusaba Lex	Delta Amarillo
CBU Ferdinand	Eemvelder Osmond
Lima	Barnkamper Donjuan

Tabel 1 – Vijftien meestgebruikte rood- en zwartbontstieren (1 september 2002-28 februari 2003)

De KI-cijfers spreken boekdelen: na jaren van afnemende interesse voor stieren met een rood vel, sloten de roodbontstieren het KI-jaar 2001-2002 af met een klein plusje. Iets meer dan één op de zes verspoten rietjes was afkomstig van een roodbontstier. Bovendien kwamen die rietjes in toenemende mate terecht in zwartbontkoeien. Afgelopen boekjaar noteerde NRS ruim 78.000 eerste inseminaties met roodbontstieren op zwartbontkoeien. Vanwaar die hernieuwde aandacht voor roodbont? Enerzijds hebben de roodbontstieren de afgelopen jaren met hun dochtergroepen een positieve indruk achtergelaten, vaak meer dan de zwartbonte dochtergroepen deden. Anderzijds kampten de roodbontstieren niet met erfelijke gebreken als BLAD en CVM. Bovendien was er de afgelopen jaren veel discussie over de inhoud en breedtematen van zwartbont. Ook dat speelde de roodbontstie-

ren met hun meer robuuste imago in de kaart. Maar hoe presteren de roodbontstieren vergeleken met zwartbont foktechnisch eigenlijk? Om die vraag te beantwoorden rekende Vee-teelt de fokwaarden van de 15 meestgebruikte roodbontstieren (zie tabel 1) over de eerste helft van het KI-jaar 2002-2003 om naar zwartbontbasis. Vervolgens zijn deze fokwaarden vergeleken met de fokwaarden van de 15 meestgebruikte zwartbontstieren over dezelfde periode (tabel 1). De gemiddelde fokwaarden van de 15 meestgebruikte zwart- en roodbontstieren berekend op zwartbontbasis staan in tabel 2. Op de meeste onderdelen zijn de zwartbontstieren hun roodbontcollega's nog steeds de baas. Helemaal eerlijk is die vergelijking overigens niet. Het aantal geteste stieren ligt bij zwartbont hoger, waardoor de kans op toppers groter is. Toch presteren de roodbontvererfers op een aantal pun-

fokwaarden	zwartbont	roodbont	verschil	basisverschil zwart naar rood
DPS	209	142	67	95
DU	106	104	2	0
kg melk	906	318	588	728
% vet	0,00	0,13	-0,13	-0,14
% eiwit	0,00	0,08	-0,08	-0,04
kg vet	39	24	15	21
kg eiwit	30	17	13	22
kg vet + eiwit	69	40	29	43
Inet	148	98	50	95
frame	107	105	2	—
uier	107	107	0	2
benen	106	103	3	3
totaal exterieur	109	105	4	4
uiergezondheid	101	102	-1	0
vruchtbaarheid	97	100	-3	0
directe levensvatbaarheid	102	101	1	0
voorhand	100	101	-1	-1
inhoud	102	104	-2	-1
conditiescore	97	101	-4	-3

Tabel 2 – Gemiddelde fokwaarden 15 meestgebruikte stieren (rood en zwart) op zwartbontbasis

ten opvallend goed. Allereerst het eiwitgehalte, dat voor de roodbontstieren op zwartbontbasis gemiddeld 0,08 procent bedraagt. De roodbontstieren scoren daarmee precies 0,08 procent beter dan de zwartbontstieren. Dat is twee keer zoveel als het basisverschil, dat 0,04 procent eiwit bedraagt. Het meest opvallend zijn de uiercijfers. De roodbonten halen met 107 een even hoog gemiddelde als de zwartbonten. Het robuustere imago van roodbont is niet alleen een kwestie van beeldvorming.

Een vergelijking van de scores voor inhoud en voorhand wijst uit dat de roodbontstieren voor beide onderdelen een hoger gemiddelde halen dan de zwartbonten. Ook op basis van de gezondheidskenmerken presteren de roodbonten goed. Terwijl de zwartbonte stieren voor vruchtbaarheid 97 scoren, halen de roodbonten gemiddeld 100.

Kian Inet-winnaar

Gemiddeld genomen kunnen de roodbontstieren het niveau van de zwartbonten nog

Tabel 3 – Toppers in onderdelen, geselecteerd uit de 15 meestgebruikte stieren (rood en zwart) op zwartbontbasis, roodbont = vetgedrukt

vruchtbaarheid	DPS	DU	kg melk
Koerier 114 105	VAH Wonderboy 295	Stadel 111	Eemvelder Osmond 1603
Lima 104	Laurenzo 289	VAH Wonderboy 110	Downalane Cello 1591
Stadel 102	Kian 282	Himster Grandprix 110	Jusaba Lex 1473
Noorder Dustin 102	Noorder Dustin 257	Laurenzo 109	Sinatra 1428
Midwolder George 102	Cashflow 252	Cashflow 109	Cashflow 1402
directe levensvatbaarheid	% vet	% eiwit	kg vet
Laurenzo 111	Subliem Tulip 0,74	Kian 0,33	VAH Wonderboy 67
Noorder Dustin 107	Kian 0,66	Match 2 0,27	Jusaba Lex 64
Eastland Cash 107	Match 2 0,46	CBU Ferdinand 0,23	Sinatra 59
Downalane Cello 106	Midwolder George 0,43	Melchior 0,22	Subliem Tulip 54
Melchior 106	Melchior 0,38	Midwolder George 0,18	Kian 50