

Jerom boven Cello

Jabotzonen nadrukkelijk aanwezig in jaaroverzicht Vlaamse KI

Cello was in 2002 de meestgebruikte zwartbontstier in Vlaanderen. Zijn inzet van 7216 eerste inseminaties werd alleen door roodbonttopper Jerom met 8080 eerste inseminaties overtroffen.

De naam Downalane Cello prijkt bovenaan het overzicht van meestgebruikte zwartbontstieren in Vlaanderen 2002. De Celsiuszoon was het afgelopen boekjaar in Nederland als melkverervingstopper ook al de meestgebruikte zwartbonte stier. Een totaal van 7216 inseminaties bracht Cello in Vlaanderen van de derde plaats in 2001 naar de huidige koppositie (tabel 2). De tweede plek was evenals vorig jaar weggelegd voor Marpar Jabot Betty Bruce (v. Jabot). Dit jaar werden van CRI-stier Bruce 751 eerste inseminaties meer dan in 2001 geregistreerd.

Nieuweling op het erepodium is Regancrest Juror Bond (v. Ked Juror), die met 4668 eerste inseminaties op de derde plaats staat. Op nummer vier volgt Carousel Sierra als tweede Jabotnakomeling. Sierra was in 2000 de populairste zwartbontstier van Vlaanderen, terwijl hij vorig jaar ook al de vierde plaats innam. De topvijf wordt afgesloten met een derde Jabotproduct: Tidy-Brook Steven. Vorig jaar nam Steven de eerste plaats nog in beslag maar door een halvering van de 6075 eerste inseminaties in 2001 geeft hij zijn toenmalige eerste plaats op aan Downalane Cello.

De enige Vlaamse stier in de toptien is Leliehoeve Jabon, ook voortgekomen uit een paring met fokstier vader Jabot.

Leliebon was vorig jaar nog de op vier na best verkochte zwartbontstier met 4279 eerste inseminaties. Dit jaar werden 2221 eerste inseminaties met deze stier uitgevoerd.

Daling roodbontgebruik

Na een aantal jaren van lichte daling in het aantal eerste inseminaties is in 2002 voor de zwartbonte stieren het niveau van 1998 bijna weer bereikt (tabel 1).

Voor de rode stieren is het toekomstscenario minder rooskleurig. Red Holstein toont een neergaande lijn over de laatste vijf jaar. Ook in Nederland is de laatste jaren een daling in het gebruik van roodbontsperma geconstateerd. Deze neergaande tendens werd vorig boekjaar in Nederland met een kleine stijging in het aantal inseminaties doorbroken. Dit was mede te danken aan de prestaties van de Stollbergzoon Stadel, die voor het tweede achtereenvolgende jaar het Nederlandse klassement leidde. In Vlaanderen is deze stier met 5637 eerste inseminaties goed voor de tweede plaats (tabel 2). Jerom bleef Stadel in het Vlaamse ver voor met 8080 eerste inseminaties. Deze zoon van Clara's Orkan heeft met 1356 inseminaties meer dan vorig jaar zijn eerste plaats in Vlaanderen weten te behouden. Het intensieve gebruik van Jerom resulteerde evenals in 2001 in meer gere-



Boven: Jerom (v. Clara's Orkan) in Vlaanderen populairder dan Cello
Onder: Downalane Cello (v. Celsius): zowel in Nederland als in Vlaanderen meestgebruikte zwartbontstier

ras	2002	2001	2000	1999	1998
zwartbont	106.659	105.836	103.896	104.146	106.862
Red Holstein	58.343	62.214	65.598	71.326	80.817
witrood	4.457	5.558	7.426	8.269	9.724

Tabel 1 – Eerste inseminaties per ras (1998-2002)

gistreerde eerste inseminaties dan de hoogst genoteerde zwartbontstier. De roodbonttopdrie wordt compleet door Faber (v. Factor). Vorig jaar stond deze Duitse stier op de tiende plek in het Vlaamse overzicht. Van 2006 inseminaties in 2001 heeft hij zich met een royale verdubbeling opgewerkt naar de derde plaats in 2002.

De andere rode rassen, naast Red Holstein, verliezen in Vlaanderen steeds meer terrein. Bij de witroden is vanaf 1998 het aantal inseminaties bijna gehalveerd. Ook roodbont en West-Vlaams rood worden door het grote publiek terzijde geschoven. Bij slechts 618 dieren is voor de eerste inseminatie West-Vlaams rood gebruikt. Bij roodbont, waar-

naam	eerste ins.
zwartbont	
Downalane Cello	7216
Marpar Jabot Betty Bruce	6576
Regancrest Juror Bond	4668
Carousel Sierra	3467
Tidy-Brook J Steven	3030
Eemvelder Osmond	2978
Etazon Lord Lily	2758
Hunter	2710
Jesther	2279
Leliehoeve Jabon	2221
Rocker	2101
Lightning RF	1889
Ricecrest Emerson	1655
Holly Rainbow	1649
Red Holstein	
Jerom	8080
Stadel	5637
Faber	4295
Beautiful	4031
Midwolder George	3647
Cassius	3407
Lima	2487
Laurens 220	1896
CBU Ferdinand	1836
Koerier 114	1835
Batenburg F Daan	1781
Finn	1283
Bon Glorentum	1243
Kian	1016

Tabel 2 – Eerste inseminaties per stier (Vlaanderen 2002)

onder de dieren met minder dan vijftig procent Holsteinbloed vallen, blijft de teller op 97 inseminaties staan.

Van alle rassen in Vlaanderen zijn 60.319 eerste inseminaties uitgevoerd door DHZ'ers geregistreerd. Dit is 22,3 procent van het totaal aantal eerste inseminaties. In 2001 werd 21,7 procent van het aantal eerste inseminaties door de veehouder zelf uitgevoerd.

Christel van Raay