



Voorkomen van ziektes

Je kunt zelf een aantal maatregelen nemen om de kans op ziekte bij je paard te verkleinen. Houd in ieder geval altijd in de gaten of je paard er slecht of ziek uitziet.

Worminfecties voorkomen

Wormen kunnen je paard ziek maken. Dit wordt een worminfectie genoemd. Als de infectie nog niet zo ernstig is, ziet het paard er minder goed uit. Het heeft een doffe vacht en is sloom. Het gevaar zit 'm er in als de infectie groter wordt en langer duurt: een paard kan dan koliek krijgen. Het is daarom belangrijk dat je een worminfectie op tijd herkent en laat behandelen. Je kunt de kans op worminfecties verkleinen door paarden in een niet te grote groep in een schone wei en stal te zetten. Er is steeds meer resistentie van wormen tegen ontwormingsmiddelen. Bepaal daarom regelmatig of een paard al ontwormd moet worden of niet. Je kunt hiervoor hulp krijgen via de website Parasietenwijzer:

http://www.parasietenwijzer.nl/Paard/Intro_Paard.html

Luchtweginfecties voorkomen

Een luchtwegontsteking is een ontsteking van het slijmvlies van de luchtwegen. Hierdoor wordt het slijmvlies prikkelbaar en kan er minder zuurstof uit de lucht worden opgenomen. Je paard gaat dan heel nadrukkelijk ademen, kan hoesten en het uithoudingsvermogen van je paard wordt minder. Je kunt dit voorkomen door het paard te laten inenten tegen virusinfecties. Het beste is om je paard eerst een basisinenting te geven. Dat zijn twee injecties in een periode van zes tot acht weken. Daarna moet je je paard afhankelijk van het vaccin één of twee keer per jaar laten inenten.

Ook is het belangrijk dat de stal van je paard ruim, fris, schoon en tochtvrij is en dat het hooi of kuilvoer stofvrij is. Na een inspanning is het beter ervoor te zorgen dat je paard niet bezweet en/of warm in de stal staat. Als je paard verkouden lijkt te zijn, zorg er dan voor dat het actieve rust en tijd heeft om volledig te herstellen.

Tetanus voorkomen

Tetanus of klem is een ziekte die leidt tot verkramping van de spieren over het hele lichaam. Vaak overlijdt het paard eraan. Je kunt een tetanusinfectie voorkomen door je paard jaarlijks te laten inenten tegen tetanus. Het is ook verstandig zelf iedere vijftien jaar een inenting tegen tetanus te halen bij je dokter als je dagelijks met je paard omgaat. Als je zelf een grote wond hebt, is het verstandig om direct een tetanusinjectie te halen.

BRONNEN

- *Zorgen voor je paard*. brochure (RDA 2003/04) Raad voor Dierenaangelegenheden, Den Haag.
- *Tussen de oren*. Praktijkonderzoek Rundvee, Schapen en Paarden (PR) Publicatie september 1997, ISSN 1385-0121.



- *Paarden gezond houden.* brochure Vlaamse overheid, Departement Landbouw en Visserij, Afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling, Sector Paarden, Brussel.