

Eind augustus heb ik mijn gras/klaverpercelen gemaaid. Op sommige plaatsen overheerst rode klaver behoorlijk en na een zware snede blijft een ruige stoppel achter waar praktisch alle gras verdwenen is, wat een zeer open zode achterlaat. Ik overweeg om met gras door te zaaien. Kan ik dit op de droogtegevoelige zandgrond beter in het najaar of in het voorjaar doen?

Antwoord :

Vooraf in de nazomer kan na het maaien van een vrij zware snede van een gewas gras met een groot aandeel (rode) klaver een stoppel overblijven waarin gras nauwelijks meer voorkomt.

Gras doorzaaien in september is dan een goede oplossing. De grondtemperatuur is nu nog vrij hoog en er is (komt) meestal voldoende vocht beschikbaar. Het gras zal gemiddeld een vlotte opkomst en eerste vestiging geven. De concurrentie van de (rode) klaver is in deze tijd al veel minder. Doorzaaien na half oktober geeft meer risico op een matige opkomst en meer kans op onkruid, met name muur. Wordt in het voorjaar doorgezaaid dan heeft het voorkeur vooral op droge zandgrond dit op tijd te doen, bijvoorbeeld al in maart. De inzaai-omstandigheden, zoals draagkracht van de grond, moeten natuurlijk wel goed zijn.

Beste oplossing nu zo snel mogelijk doorzaaien!

Deze vraag is beantwoord op: 13-9-2004