

Acer platanoides 'Fairview'



Andelst (Overbetuwe), Beatrixstraat; zomer 2009, 5 jaar na het planten.



Gebruikswaarde: 'Fairview' is een relatief snelgroeende boom met een mooie smal ovale kroon en geschikt als straat- en laanboom; ook in de verharding mits een goede grondbewerking is toegepast en/of plantgatverbetering is uitgevoerd.



Winterbeeld jonge boom



Herfstbeeld



Straatbeeld na 5 jaar

Beschrijving

- Hoogte:** 10-15 m.
Kroon: smal ovaal, later breed ovaal (tot 10 m breed).
Blad: 5-7-lobbig. Het blad loopt roodbruin uit, verkleurt in de zomer bruingroen en in de herfst naar oranjegeelgroen.
Bloemen: bloeit in april, voor de bladontwikkeling, met geelgroene bloempjes in tuilen.
Vruchten: éénzadige gevleugelde nootjes, met 2 bijeen.
Herkomst: Amerikaanse cultivar; zaailing van 'Crimson King'.
Overig: 'Fairview' lijkt veel op *A. platanoides* 'Deborah', maar de kroon van 'Fairview' is iets smaller.

Groeiplaatseisen

- Grondsoort:** alle grondsoorten, behalve als het te nat is (bv. natte veengrond).
Vochtvoorziening: niet te nat; droogtebestendig.
Windgevoeligheid: weinig windgevoelig. Niet zeewindbestendig.
Overig: Gevoelig voor strooizout.

Gebruik

Gebruikswaarde

'Fairview' is voor het onderzoek geplant in Bunnik, Andelst (Overbetuwe), Zeewolde en Zundert in het voorjaar van 2004. In Andelst (in bomenzand op klei) staan de bomen in een smalle beplantingsstrook. Deze bomen ontwikkelden zich goed met een breed kegelvormig opgaande kroon (tot 2,5 m breed). In Zeewolde (jonge zeeklei met vrije uitworteling) was de groeikracht van de bomen zeer groot. Dit uitte zich in bredere kronen (4.5 m) en zware takken. Bij enkele bomen waren problemen met stamscheuren die overigens wel herstelden. In Bunnik (in klei, omsloten door verharding van parkeerplaats) was de ontwikkeling van de bomen zeer goed, vergelijkbaar met die in Overbetuwe. In Zundert (schrale zandgrond, vrije uitworteling) verliep de aanslag wat moeizamer en zijn onregelmatige kroonvormen ontstaan.

Onderhoud

Afhankelijk van de groeikracht wordt aanbevolen om 3-4 jaar na planten lichte uitdunnings snoei toe te passen in de kroon.

Ziekten en plagen

Geen bijzonderheden.

