



PLANTEN GIFTIG VOOR (DIERENTUIN)DIEREN

<p>Wolfskers <i>Atropa Belladonna</i> <u>Schadelijke onderdelen:</u> Gehele plant (vooral zwarte bessen). <u>Gevoelige diersoorten:</u> Hondachtigen, katachtigen, paarden, zebra's, en ezels. <u>Symptomen:</u> Rode huid, opgezette hals, wijde pupillen, droge slijmvliezen, koorts, braken, hart klopt sneller, en hallucinaties kunnen optreden (dier maakt een zeer verwarde indruk).</p>		<p>Buxus <i>Buxus sempervirens</i> <u>Schadelijke onderdelen:</u> De zaden, bladeren, en bast van de wortel. <u>Gevoelige diersoorten:</u> Katachtigen, hondachtigen, paarden, zebra's, ezels, runderen, en varkens (zwijnen). <u>Symptomen:</u> Diarree, ongecoördineerd gedrag, stuip trekkingen, en eventueel verlammingen van het centrale zenuwstelsel kunnen optreden.</p>	
<p>Gevlekte scheerling <i>Conium maculatum</i> <u>Schadelijke onderdelen:</u> Gehele plant (vooral het sap). <u>Gevoelige diersoorten:</u> Paarden, zebra's, ezels, hondachtigen, katachtigen, runderen, varkens (zwijnen), en vogels. <u>Symptomen:</u> Verlamming van motorische zenuwen; kan zelfs de dood tot gevolg hebben.</p>		<p>Cyclaan <i>Cyclamen sp.</i> <u>Schadelijke onderdelen:</u> Gehele plant (vooral de knol en bladeren). <u>Gevoelige diersoorten:</u> Katachtigen, hondachtigen, runderen, schapen, paarden, geiten, en varkens (zwijnen). <u>Symptomen:</u> Spijsverteringsproblemen, buikkrampen (hijgen, niet willen liggen, kijken naar de buikstreek), en verlamming. Deze verschijnselen kunnen al optreden bij de inname van een klein stukje van de knol van de plant.</p>	
<p>Gewone brem <i>Cytisus scoparius</i> <u>Schadelijke onderdelen:</u> Voornamelijk peulen en zaden. Jonge twijgen en bladeren in lichte mate. <u>Gevoelige diersoorten:</u> Hondachtigen, reeën, herten, schapen, ganzen, en vogels. <u>Symptomen:</u> Buikkrampe, braken, misselijkheid, stoornissen van het hartritme en bloedsomloop, bewusteloosheid, en krampen (onrust, hijgen, niet willen liggen, kijken naar de buikstreek).</p>		<p>Dieffenbachia <i>Dieffenbachia</i> <u>Schadelijke onderdelen:</u> Gehele plant (vooral sap en stengels van de plant). <u>Gevoelige diersoorten:</u> Katachtigen, hondachtigen, en olifanten. <u>Symptomen:</u> Roodheid, geïrriteerdheid, brandende pijn en kan leiden tot huidontstekingen. Bij inname kunnen er ontstekingen en zwellingen in het spijsverteringskanaal (inclusief de mond) ontstaan. Dit leidt vrijwel altijd tot diarree.</p>	
<p>Laurierkers <i>Prunus sp.</i> <u>Schadelijke onderdelen:</u> Bladeren en zaden zijn zeer giftig. <u>Gevoelige diersoorten:</u> Paarden, zebra's, geiten en honden. Dodelijke vergiftigingen komen veelal voor bij runderen en schapen. <u>Symptomen:</u> Erge opwinding, braken, en ademhalingsstoornissen.</p>		<p>Gouden regen <i>Laburnum anagyroides</i> <u>Schadelijke onderdelen:</u> Gehele plant (vooral de vruchten). <u>Gevoelige diersoorten:</u> Katachtigen, hondachtigen, varkens, zwijnen, schapen, geiten, runderen, paarden, zebra's, en vogels. <u>Symptomen:</u> Overgeven, diarree, zwakte, slaperigheid, verslechterde coördinatie, zweten, bleekheid, vergrote pupillen, en de hartslag versneld.</p>	
<p>Oleander <i>Nerium oleander</i> <u>Schadelijke onderdelen:</u> Gehele plant (vooral het sap in de bladeren en stengels). <u>Gevoelige diersoorten:</u> Paarden (uit zich in koliek), schapen, runderen, geiten, en hondachtigen. <u>Symptomen:</u> Misselijkheid, braken, bovenmatig kwijlen, buikpijn (onrust, niet willen gaan liggen, zakken door de voorpoten, hijgen, kijken naar de buikstreek), diarree (met of zonder bloed), hartritme stoornissen, beschadigingen aan het zenuwstelsel, en coma. Bij ernstige vergiftiging kan het dier sterven.</p>		<p>Rhododendron <i>Rhododendron catawbiense</i> <u>Schadelijke onderdelen:</u> Vruchten (in nectar en meeldraden). <u>Gevoelige diersoorten:</u> Dodelijk voor paarden, zebra's, en runderen. Een tiental blaadjes zijn reeds voldoende om vergiftiging te doen optreden. <u>Symptomen:</u> Remt de prikkelgeleiding van het centraal zenuwstelsel. Daarnaast diarree, bradycardie (te lage hartslag), en bewusteloosheid (bij hoge dosering).</p>	
<p>Skimmia <i>Skimmia japonica</i> <u>Schadelijke onderdelen:</u> Alle onderdelen zijn licht giftig, maar met name de bessen (acute effecten hiervan zijn merkbaar bij inname van grotere hoeveelheden). <u>Gevoelige diersoorten:</u> Knaagdieren, runderen, paarden, zebra's, ezels, schapen, en geiten. <u>Symptomen:</u> Misselijkheid, diarree, en irritatie in de mond bij inslikken van meerdere bessen.</p>		<p>Venijnboom <i>Taxus baccata</i> <u>Schadelijke onderdelen:</u> Alles behalve de vlezige zaadrok. <u>Gevoelige diersoorten:</u> Paarden, muil dieren, runderen, bizons, schapen, geiten, varkens (zwijnen), haasachtigen, ijsberen, bruine beren, kangoeroes, eenden, kippen, fazanten, patrijzen, grasparkieten, lammergier, vogels, rendieren, en hondachtigen. Vooral paarden zijn gevoelig. <u>Symptomen:</u> Hartritme stoornissen, hartstilstand, en lever- en nierbeschadigingen.</p>	