



Herbicides in Zomerbloemen

Casper Slootweg en Annette Bulle
e-mail: casper.slootweg@wur.nl

Waarom dit overzicht?

Door de veelheid van gewassen zijn er bij telers van zomerbloemen vaak veel vragen over de herbicides die zij kunnen en mogen toepassen in hun teelten. Vanuit de landelijke commissie is gevraagd om, met financiering door het Productschap Tuinbouw, een overzicht samen te stellen met de toegelaten herbicides en hun werking.

Wat is er te zien?

Alle herbicides met een toelating in zomerbloemen zijn op een rijtje gezet. Van elk product zijn werkzame stof, effecten op onkruidsoorten, mogelijke schade in gewassen en toepassing in een tabel gezet. Hiermee is gemakkelijk te zien welk herbicide in de teelt is toe te passen.

Waar kan ik het overzicht vinden?

De leaflet is te downloaden op de website van LTO Groeiservice (www.groeiservice.nl/Zomerbloemen), het Productschap Tuinbouw (www.tuinbouw.nl), of PPO (www.ppo.wur.nl).

Middel	Toelating	Type middel	Bestrijdt goed	Bestrijdt niet of minder	Omstandigheden	Toepassing
Mega 2,4-D	Onbeteeld land	Systemisch bladherbicide	Tweezaadlobbige onkruiden	Grassen	Voldoende blad, groeizaam weer. Niet bij felle zon.	Dosering: 2 liter per ha.
Legurame vloeibaar	Bloementeel	Selectief bodemherbicide	Eenjarige grassen, tweezaadlobbige onkruiden	Muur, kamille, klein kruiskruid en herderstasje	Werkzaam langzaam	Dosering: 7 liter Legurame Vloeibaar + 1,5 liter chloorprofam (400 g/l) per ha.
Certis Chloor-IPC 40%, Brabant Chloor-IPC vl, Isopan	Bloementeel	Systemisch herbicide	Eenjarige onkruiden	Composieten, kleefkruid, overblijvende onkruiden	Toepassen op onkruidvrije grond.	1.5 - 2 liter per ha
Focus Plus	Bloementeel	Bladherbicide	Grassen	Straatgras	Toepassen onder goede groeiomstandigheden	Toepassen onder goede groeiomstandigheden van de onkruiden. Twee tot vijf weken na toepassing is een volledig effect te verwachten. Spuiten met fijne druppel op een droog gewas, bij droog weer. Onkruid moet goed worden geraakt en bevochtigd. Enkele uren droog weer na de bespuiting is gewenst. Binnen één week na de bespuiting geen mechanische bewerkingen uitvoeren.
Basta	Zomerbloemen	Contactherbicide	Eenjarige grassen, breedbladig onkruid		Werkingsnelheid beïnvloed door weersomstandigheden en groeiomstandigheden.	
Finale SL 14	Zomerbloemen	Contactherbicide	Eenjarig, één- en tweezaadlobbig onkruid		Bij groeizaam weer.	
Velen o.a. Roundup	Onbeteeld land en akkerranden	Systemisch bladherbicide	Eenjarig en overblijvend grasachtig en tweezaadlobbig onkruid	Paardenstaart, klaver- en wikke, moerasdoorn en mos	Beste werking als onkruid voldoende blad heeft.	2
Afalon flow, Budget	Zonnebloem	Systemisch	Tweezaadlobbigen	Paarse dovenetel,	De grond moet van	10-15ml per are

