

9 | Resultaten selectiemesterijen in de jaren 30

De selectiemesterijresultaten van de geprimeerde NL-tomen (baconvarkens) over de jaren 1936 tot en met 1940 staan vermeld in de volgende tabel.

JAAR	GROEI KG/DAG	VE KG/KG	LENGTE CM	SPEKD. CM	KARB. %	HAM %	TYPE
1936	0,61	3,24	79,6	3,6	7,8	13,6	6,43
1937	0,61	3,20	79,5	3,5	7,7	13,5	6,40
1938	0,61	3,23	80,0	3,5	7,8	13,6	6,40
1939	0,65	3,25	80,4	3,5	7,8	13,5	6,39
1940	0,63	3,38	80,4	3,4	8,0	13,8	6,46

Bij de Nederlandse Landvarkens nam de lengte wat toe, evenals het karbonade- en het gewichtpercentage van het achterstel. Uit de verslaglegging blijkt verder dat de gewichtpercentages van de karbonade en het achterstel van de NL-varkens uit Overijssel niet hoger waren dan die van het VDL uit Noord-Brabant. De spekdikte en het percentage eerste klasse-varkens waren bij het VDL wel minder regelmatig.

De selectiemesterijresultaten van de geprimeerde GY-tomen (slagersvarkens) over de jaren 1936 tot en met 1940 staan vermeld in de volgende tabel.

JAAR	GROEI KG/DAG	VE KG/KG	LENGTE CM	VLEES %	VET %	TYPE
1936	0,65	3,69	82,7	45,5	41,4	6,21
1937	0,66	3,60	83,3	46,0	41,3	6,27
1938	0,63	3,66	83,7	47,0	40,0	6,52
1939	0,65	3,68	84,2	48,8	43,4	6,85
1940	0,65	3,79	84,2	51,0	41,0	7,18

Over deze periode van vijf jaar steeg het vleespercentage met ruim één procent per jaar, wellicht mede beïnvloed door een toename van de lengte met 1,5 cm. Toch nam het vetpercentage met slechts 0.4 % af. Opmerkelijk is, dat zowel bij de Nederlandse Landvarkens als bij de Groot Yorkshires de groei en het voederverbruik (VE) weinig veranderden. Het hogere voederverbruik bij beide rassen in het jaar 1940 zou wel eens met de oorlogsomstandigheden te maken kunnen hebben.