



Aan de hand van voorbeelden uit hun dagelijkse praktijk schrijven drie dierenartsen over diergezondheid in de vleesveehouderij. Om en om beschrijven John Campe, Piet De Meuter en René Bemers maandelijks vastgestelde ziektebeelden, uitgevoerde behandelingen en/of mogelijke preventie maatregelen.

## Herstel van bloeding aan de hand van een bloedtransfusie

# Plotse bloeding

**H**et was al enkele dagen geleden dat ik op het bedrijf een keizersnede had uitgevoerd. Nu belde de veehouder me op met de vraag of ik toch nog even naar die specifieke koe kon komen kijken.

Op het bedrijf aangekomen, vertelde de veehouder me dat de toestand van deze koe plots was verslechterd. Er waren sinds de keizersnede al negen dagen verstreken en het dier had de voorbije tijd zelfs twee kalveren kunnen zogen. Het dier stond wel nog in een bindstal, waardoor de veehouder snel had kunnen opmerken dat er wat mankeerde.

De koe lag neer bij mijn aankomst, gaf meteen een slappe indruk en ging ook met moeite rechtstaan. De melkopdruk in de uier was volledig verdwenen en opvallend was de bleke kleur van de lichaamsweefsels bij de uier en de vulva. Het dier voelde ook koud aan.


Ik dacht meteen aan bloedverlies. De koe had daar eigenlijk alle tekenen van. Bij het rectaal opvoelen kon ik ook een opgezette en erg gespannen baarmoeder voelen. Dat bevestigde nog maar eens mijn vermoeden van een interne bloeding.

Op basis van deze verschillende symptomen besloot ik de koe een bloedtransfusie te geven. Daartoe zochten de veehouder en ik een geschikte, gezonde koe uit om daaropvolgend vijf liter bloed van dit dier af te nemen. Dit bloed gaf ik vervolgens aan de zieke koe.

Gelukkig had deze veehouder tijdig in de gaten dat het niet goed ging met deze koe en had hij alert gereageerd. Door op tijd vijf liter bloed toe te dienen kon dit dier nog gered worden. Twaalf uur later was de koe al flink opgeknapt.



## De encyclopedie nazorg keizersnede



De keizersnede is bij het Belgisch-witblauwras de meest uitgevoerde operatie. De keizersnede blijft een medische ingreep waarbij na afloop ook complicaties kunnen optreden. Voorbeelden zijn buikvlies- of baarmoederontsteking of verbloeden. Het genezingsproces neemt toch enige tijd in beslag.

Het is belangrijk om dieren na de kalving goed in de gaten te houden. Zo is het de

eerste dag raadzaam om elke twee tot drie uur het dier te bekijken om eventueel abnormale zaken op te sporen.

Bij de routinematige controle van het vee is het belangrijk om de eetlust in de gaten te houden. Pasgekalfde koeien die in een bindstal staan, zijn beter te controleren op voeropname en vaginale uitvloeit dan koeien die rondlopen in een ruime strobox.

Het is ook aan te bevelen om bij twijfel over de gezondheidstoestand de temperatuur te nemen en bij een temperatuur boven 39,5 graden Celsius actie te ondernemen. Koorts kan wijzen op het begin van een ontsteking. Bij elke abnormaliteit luidt het devies de dierenarts te contacteren.