

## Potentilla fruticosa – sortimentsonderzoek en keuringsrapport

*Ir. M.H.A. Hoffman*

*Potentilla fruticosa L. (Struikganzerik) is een heester die veel wordt gebruikt in het openbaar groen en op beperkte schaal in particuliere tuinen. Van nature is het een gemakkelijke plant, die vooral opvalt door zijn lange bloeitijd, vaak van het late voorjaar tot in de nazomer of herfst. Naast de natuurlijke gele en witte bloemkleur, zijn er in de loop van de jaren nieuwe cultivars ontwikkeld met rode, roze en oranje bloemen. Ook de gezondheid is flink verbeterd. Dit heeft het gewas een enorme impuls gegeven. Inmiddels zijn er ruim 150 verschillende cultivars bekend. Ongeveer 80 cultivars zijn op twee verschillende locaties getest. De planten zijn door PPO beschreven en beoordeeld op gebruikswaarde. De KVBC voerde een sterrenkeuring uit.*

Over *Potentilla* is al eerder in *Dendroflora* gepubliceerd. In *Dendroflora* 37 (2000) is door Piet Kolster en Wout Kromhout een artikel verschenen waarin voorlopige resultaten stonden. Dit was gebaseerd op planten uit de Nederlandse Plantencollectie, bij Piet Kolster, te Boskoop. Er werden per kleurgroep cultivars aanbevolen en een uitgebreidere sterrenkeuring werd toen aangekondigd. De laatste sterrenkeuring dateert van 1982 (*Dendroflora* 19), geschreven door Harry van de Laar. Sindsdien is het sortiment flink toegenomen en verbeterd.

Na deze laatste sterrenkeuring is ook in Duitsland en in Engeland, onafhankelijk van elkaar, een sortimentskeuring uitgevoerd. De uitkomsten hiervan worden in grote lijnen in dit artikel weergegeven.

### Het onderzoek

In totaal zijn er 80 verschillende *Potentilla*'s verzameld en aangeplant op de proefvelden van Praktijkonderzoek Plant & Omgeving (PPO) in Boskoop (veengrond) en in Lisse (zandgrond). De planten waren afkomstig van *Potentilla*-specialist Piet Kolster, aangevuld met enkele cultivars van Darthuizer Boomkwekerijen. Het sortiment bestond in principe uit de nieuwe cultivars, aangevuld met het standaard handels-sortiment en goede referentiecultivars. Resultaten uit de vorige sterrenkeuring en bevindingen van de Nederlandse Plantencollectie speelden een belangrijke rol bij het bepalen van de keuze. Van 2009 tot 2012 zijn er waarnemingen verricht door PPO en is de collectie diverse malen gekeurd door de keuringscommissie van de KVBC.



Alle beoordeelde planten zijn op naam gebracht, beschreven en gefotografeerd. De beschrijvingen zijn samengesteld aan de hand van literatuuronderzoek, veldobservaties en discussies met kwekers en specialisten, o.a. tijdens de keuringen. De weergegeven gebruikswaardedata, zoals ziektegevoeligheid, bloeitijd en stevigheid zijn een gemiddelde van de waarnemingen van de opplantingen in Lisse en Boskoop. Het onderzoek werd gefinancierd door het Productschap Tuinbouw.

### Taxonomie en verspreiding

In totaal zijn er wereldwijd zo'n 500 soorten *Potentilla*. Hiermee is het één van de grotere

geslachten van de Rozenfamilie (Rosaceae). Veruit het grootste deel is kruidachtig; slechts een enkeling, waaronder *P. fruticosa* is houtig. Moleculair onderzoek van Eriksson et al. (2003) heeft aangetoond dat de groep van struikvormige *Potentilla*'s erg afwijkt van de andere soorten. Daarom wordt deze groep in deze publicatie in een apart geslacht ondergebracht: *Dasiphora*. Daarbij wordt dus ook de soortnaam *Potentilla fruticosa*, de belangrijkste soort in deze groep, veranderd in *Dasiphora fruticosa*. Dit is overigens niet nieuw, want het is iets dat in het verleden ook al eens is voorgesteld. In enkele moderne taxonomische werken, o.a. GRIN (2012), wordt deze taxonomische opvatting gevolgd. In de (internationale) boomkwekerijsector en ook de naamlijst van houtige gewassen wordt deze ingrijpende naamsverandering (voorlopig) niet gevolgd. Ook in dit artikel wordt daarom de oude (en vertrouwde) naam *Potentilla fruticosa* aangehouden.

Binnen *P. fruticosa* zijn diverse ondersoorten of variëteiten bekend, zoals var. *arbuscula*, var. *davurica* en var. *parvifolia*. In deze publicatie worden ze beschouwd als variëteiten binnen de variabele soort *P. fruticosa*. Sommige bronnen, zoals GRIN (2012) en de Flora van China, beschouwen één of meerder hiervan als aparte



70. *P. fruticosa* is één van de weinige houtige soorten van het grote geslacht *Potentilla*.

soorten: *P. arbuscula* (of *Dasiphora arbuscula*), *P. davurica* (of *Dasiphora davurica*) en *P. parvifolia* (*Dasiphora parvifolia*). Voor meer informatie zie hoofdstuk "Ondersoorten en variëteiten".

Het natuurlijke verspreidingsgebied van *Potentilla fruticosa* en bijbehorende variëteiten is erg groot, van Azië tot Europa en Noord-Amerika. De soort komt vooral voor in gematigd Azië (China, Kaukasus, Mongolië, Kazachstan, Rusland/Siberië), maar ook in het berggebied van tropisch Azië (Nepal, Bhutan, Pakistan en India). Het Europese verspreidingsgebied loopt van Zuidwest-Europa (Spanje en Frankrijk) tot Zuidoost-Europa (Bulgarije en Italië), Oost-Europa (Rusland, Estland en Letland en Noord(west)-Europa (Zweden, Verenigd Koninkrijk en Ierland). Het verspreidingsgebied in Noord-Amerika loopt van Canada via het noordwesten en noordoosten tot aan het zuiden van de Verenigde Staten. Een opmerkelijk groot verspreidingsgebied voor één soort, waarbinnen bovendien behoorlijk uiteenlopende klimaten voorkomen.

### Beschrijving

Door het grote natuurlijke verspreidingsgebied over verschillende continenten kent de soort een grote uiterlijke variatie. Het zijn sterk vertakte opgaande struiken, gewoonlijk van 0,60 tot 1,5 m hoog. In Nederland zijn de planten loofverliezend, maar in warmere streken zijn ze (semi) bladhoudend. Sommige variëteiten en cultivars hebben horizontale of kruipende takken en zijn veel lager. De takken hebben een (donker)bruine afschilferende schors. Het blad is samengesteld en bestaat uit 3-7 deelblaadjes. De deelblaadjes zijn ovaal tot lancetvormig, gaafrandig, met een spitse top, tot 2,5 cm lang en ze zijn ongesteeld. De bladranden zijn vaak meer of minder ingerold. De beharing is erg variabel, van sterk behaard tot vrijwel kaal. De bladkleur is gewoonlijk groen, maar bij sommige variëteiten en cultivars zijn ze grijsgroen of zilvergrijs. Verder staan er onderaan de bladsteel steunblaadjes die in meer of mindere mate opvallen. De bloemen zijn 2-4 cm in diameter en staan solitair of met 2 of 3 bijeen. Naast de kelk is er een zogenaamde bijkelk waarvan de blaadjes smal lancetvormig of soms breed en stomp zijn; de top kan gevorkt zijn. Er zijn in principe 5 afgeronde kroonbladen, maar bij sommige (half) gevulde cultivars zijn het er meer; deze zijn geel en bij diverse variëteiten en cultivars kunnen ze ook wit, oranje, rood of roze zijn. Vooral de oranje, rood en roze-bloeiende planten kunnen lichter



71. *P. fruticosa* gebruikt als tuinplant. ('Goldfinger')

verkleuren bij langdurige felle zon (vooral in de zomermaanden). De kroonbladen staan los van elkaar of kunnen elkaar sterk overlappen. De bloeitijd is lang, van mei tot september of oktober, vaak met een hoofdbloei in juli en augustus.

### Standplaats en gebruik

*Potentilla fruticosa* groeit bij voorkeur op een droge zonnige plaats. Halfschaduw en een vochtige bodem worden doorgaans wel getolereerd, maar te veel schaduw of een te natte standplaats niet. Schrale voedingsarme bodems worden ook goed verdragen, maar zijn niet noodzakelijk.

De planten laten zich heel goed snoeien, ook met een maaibalk voor grootschalige toepassing. Het blijkt dat planten die elk jaar (diep) worden teruggesnoeid, er langer goed uit blijven zien. Ze gaan wat later bloeien, maar bloeien langer door. Een plant die al jaren niet gesnoeid is, moet niet ineens in een keer diep worden teruggesnoeid. Dit kan beter in twee keer gebeuren. Bij sommige cultivars is snoeien niet nodig omdat ze door hun horizontale vertakking van nature laag blijven.

De soort is in principe zeer goed winterhard (USDA zone 3), maar er zit enige variatie binnen de soort. In Nederland zijn er qua koude en vorst geen problemen; wel kan een te natte standplaats



72. *P. fruticosa* in openbaar groen. ('Living Daylight')



73. *P. fruticosa* in openbaar groen. ('Sommerflor')

uitval geven in de winter.

### Ziekten en plagen

Ziekten en plagen bij *Potentilla fruticosa* komen in beperkte mate voor. Het gaat daarbij vooral om (echte) meeldauw en spint. In beide gevallen is aantasting zelden desastreus, maar zorgt wel voor een lelijke aanblik en verminderde vitaliteit van de plant. Planten onder suboptimale omstandigheden worden eerder aangetast dan goed verzorgde vitale planten. Verder is het ook een kwestie van genetische aanleg; de ene cultivar is gevoeliger dan de andere. Tijdens het onderzoek zijn gestructureerde waarnemingen gedaan en deze zijn weergegeven bij de cultivarbeschrijvingen. Er zijn cultivars die niet of nauwelijks gevoelig zijn voor spint en meeldauw.

**Spint** is een infectie van mijten, bij *Poten-*

*tilla fruticosa* is dit met name de bonenspintmijt (*Tetranychus urticae*). De aantasting komt vooral voor bij droog en warm weer. De kleine mijten, in kleur variërend van oranje, geel, groen, tot rood of bruin, zitten vooral aan de onderzijde van het blad. De spintmijt zuigt aan de onderkant van het blad. Hierdoor ontstaan aan de bovenzijde van het blad kleine lichte stipjes. Deze plekken breiden zich uit over het hele blad. Aan de onderzijde van het blad produceren de mijten een glanzend spinsel en het blad wordt grijswit. Uiteindelijk zal het blad van de plant vallen. De bonenspintmijt heeft zeer veel waardplanten, naast *Potentilla* zijn dit bijvoorbeeld *Aralia*, *Callicarpa*, *Cornus*, *Daphne*, *Hydrangea*, *Laburnum*, *Skimmia*, *Sorbus*, *Rosa* en *Ulmus*.

**Echte meeldauw** komt evenals spint ook vooral voor bij droog en warm weer. Op bladeren, scheuten en bloemen is een makkelijk afwrijfbaar, witgrijs poeder te zien. Een sterke aantasting zorgt voor bruinverkleuring en een geremde groei. Aangetaste bloemen zijn verstoord in hun ontwikkeling. Echte meeldauw komt voor bij vele heesters en vaste planten, zoals *Acer campestre*, *Quercus*, *Rosa*, *Aster*, *Chrysanthemum*, *Delphinium* en *Phlox*. Per gewas zijn dit overigens vaak afzonderlijke schimmelsoorten van met name *Erysipheae* en *Sphaerotheca*. Op *Potentilla fruticosa* wordt vooral *Sphaerotheca* waargenomen; o.a. *S. macularis* en *S. aphanis*.

### Resultaten uit buitenlands onderzoek

Na afronding van de Nederlandse sterrenkeuring in 1982 is het sortiment van *Potentilla fruticosa* ook in het buitenland gekeurd; in Duitsland (1985) en Engeland (2002).

In Duitsland bestaat een systeem van sterrenwaarderingen, conform dat van Nederland. Veel nieuwe cultivars hebben overigens niet in dit onderzoek meegelopen. De Duitse resultaten zijn als volgt:

- Drie sterren (\*\*\*) : 'Goldteppich', 'Sommerflor' en 'Goldfinger'.
- Twee sterren (\*\*): 'Kobold' en 'Goldstar'.
- Één ster (\*): 'Hachmanns Gigant', 'Elizabeth', 'Abbotswood' en 'Primrose Beauty'.
- Speciale doeleinden (s): 'Manchu' en 'Red Ace'.

In Engeland is het sortiment beoordeeld door de keuringscommissie van de RHS in Wisley; zie Miller (2002). Engeland kent geen sterrenstelsel; de beste planten krijgen een Award of Garden Merit (AGM). In 2002 (of daarvoor) kregen de volgende (14) planten een AGM toebedeeld: 'Abbotswood', 'Chelsea Star', 'Groneland', 'Hopleys Orange', 'Jackman', 'King

Cup', 'Limelight', 'Marrob' (MARIAN RED ROBIN), 'Medicine Wheel Mountain', 'Penny White', 'Pink Beauty' (LOVELY PINK), 'Primrose Beauty' 'Sommerflor' en 'Yellow Bird'.

In relatie tot ons eigen keuringsrapport valt het volgende op:

- De meeste cultivars hebben ook een positieve beoordeling gekregen.
- De cultivars 'Goldstar' en 'Hachmann's Gigant' hebben geen positieve beoordeling gekregen.
- Vijf cultivars uit de Engelse Trial met AGM waren niet aanwezig in de Nederlandse proef, dit zijn: 'Groneland', 'Penny White', 'Jackman', 'King Cup' en 'Chelsea Star'.

## Ondersoorten en variëteiten

Onder andere vanwege het grote verspreidingsgebied en de bijhorende grote variatie binnen de soort zijn er vrij veel natuurlijke variëteiten en ondersoorten bekend en beschreven. Sommigen worden niet of nauwelijks meer gebruikt, of zijn verworpen tot synoniemen van andere ondersoorten of variëteiten. Andere worden regelmatig gebruikt en worden zelfs gekweekt als tuinplant of zijn gebruikt als kruisingsouder van cultivars.

Door diverse bronnen worden één of meer van onderstaande ondersoorten en variëteiten beschouwd als aparte soorten. In deze publicatie is er bewust voor gekozen om dit niet te doen. Ten eerste kruisen deze variëteiten gemakkelijk met elkaar; er is dus geen biologische kruisingsbarrière. Veel cultivars behoren ook duidelijk tot één van deze variëteiten of hebben op zijn minst één deze variëteiten als voorouder. Als deze variëteit een aparte soort zou zijn, kan de cultivar taxonomisch gezien ook niet meer worden gerekend tot *P. fruticosa*. Dan zou de hele naamgeving van het sortiment *P. fruticosa* behoorlijk overhoop moeten worden gehaald.

Overigens zijn in het verleden enkele namen van soorthybriden benoemd en beschreven, o.a.. *P. ×rehderiana* Hand-Mazz. (als kruising tussen *P. parviflora* en *P. davurica*), *P. ×friedrichsenii* Rehd. (als kruising tussen *P. davurica* en *P. fruticosa*) en *P. ×sulphurascens* (als kruising tussen *P. arbuscula* en *P. davurica*).

De belangrijkste ondersoorten en variëteiten en ondersoorten worden hieronder genoemd.

***P. fruticosa* var. *arbuscula*** (D.Don) Maximowicz  
syn. *P. fruticosa* var. *albicans* Rehder &



74 *P. fruticosa* var. *arbuscula*

E.H. Wilson

*P. arbuscula* var. *bulleyana* B. Balfour

*P. fruticosa* var. *vilmoriniana* Komrov

*P. arbuscula* D. Don

*P. rigida*

*Dasiphora arbuscula* (D.Don) Sojak

Deze variëteit komt van nature voor in de Himalaya en het berggebied van China (2600-4600 m hoog). De groeiwijze is laag en compact, tot 60 cm hoog, soms hoger. De takken zijn relatief dik. Het blad bestaat uit 3-5 sterk behaarde en relatief grote deelblaadjes, vaak grijsgroen tot zilvergrijs gekleurd. De bladranden zijn al dan niet ingerold. Er zijn opvallende steunblaadjes. De bloemen zijn groot en geel. De blaadjes van de bijkelk zijn vaak gevorkt.

*P. fruticosa* 'Beesii', 'Elizabeth' en 'Dakota Sunrise' zijn voorbeelden van cultivars die duidelijk invloeden hebben van deze variëteit.

***P. fruticosa* var. *davurica***

syn. *P. davurica* Nestl.

*P. glabra* Lodd. et al.

*P. mandshurica* Maxim.

*P. veitchii* E.H. Wilson

*Dasiphora davurica* (Nestl.) Kom.

Deze variëteit komt van nature voor van Japan tot China en Siberië. De bloemen zijn wit en het blad bestaat uit 5 deelblaadjes. De blaadjes van de bijkelk zijn breed en stomp. De groeiwijze is compact en de blaadjes en stengels zijn meestal kaal.

Diverse witbloeiende cultivars behoren tot deze variëteit, bijvoorbeeld 'Abbotswood', 'Manchu' en 'Mount Everest'.



75. *P. fruticosa* var. *davurica*

#### *P. fruticosa* subsp. *fruticosa*

Deze ondersoort uit Noord-Europa is door Linnaeus gebruikt voor het beschrijven en definiëren van de soort. Opvallend is dat deze ondersoort eenslachtige bloemen heeft en tetraploid is. Als cultuurplant is deze ondersoort veel minder bekend dan de andere ondersoort subsp. *floribunda*.

#### *P. fruticosa* subsp. *floribunda* (Pursh) Elkington

syn. *P. floribunda* Pursh  
*P. fruticosa* var. *pyrenaica* Willd.  
 Ex Schltdl.

Deze ondersoort vertegenwoordigt het grootste

verspreidingsgebied van *P. fruticosa*. Deze is ook veruit het meest bekend en veel cultivars zijn hieraan ontleend. De bloemen zijn "gewoon" tweeslachtig (met meeldraden en stampers).

#### *P. fruticosa* var. *pumila* J.D. Hooker

syn. *P. arbuscula* var. *pumila* (J.D. Hooker) Handel-Mazzetti

Deze variëteit komt van nature voor in de Himalaya (4200-5000 m hoog). Het zijn kleine compacte planten, hooguit 10 cm groot. Het blad is klein; de blaadjes zijn ovaal, 3-5 × 3-4 mm groot, vooral aan de onderzijde vrij sterk behaard. De bladrand is ingerold. De bloemen zijn klein, 1-1,5 cm in diameter en staan solitair.

#### *P. fruticosa* var. *parvifolia* (Lehm.) Wolf

syn. *P. parvifolia* Fisch. ex Lehm.  
*Dasiphora parvifolia* (Fisch. ex Lehm.) Juz.

Deze variëteit komt van nature voor in Siberië, Mongolië en Centraal Azië. Het opvallend kleine blad bestaat meestal uit 7 (soms 5) deelblaadjes, waarbij de onderste 2 paren vaak handvormig gerangschikt zijn. De blaadjes zijn gewoonlijk smaller en kleiner (maximaal 10 mm lang) dan die van *P. fruticosa*. Ook de bloemen zijn vaak niet groter dan 2 cm in diameter en daarmee gemiddeld kleiner dan *P. fruticosa*. De plant is meestal los vertakt.

*P. fruticosa* 'Klondike', 'Goldkissen', 'Buttercup' en 'Gold Drop' zijn voorbeelden van cultivars die duidelijk invloeden hebben van deze natuurlijke variëteit.

#### *P. fruticosa* var. *unifoliolata* Ludl.

Deze variëteit komt van nature voor in Bhutan. Er is maar één deelblaadje per blad, soms twee. De blaadjes zijn 0,7-1,5 cm lang. De plant wordt maximaal 1 m hoog. De gele bloemen staan solitair en zijn 2-3 cm breed.

## Keuringsrapport en beschrijvingen

Onderstaande beschrijvingen zijn gemaakt aan de hand van de planten uit de proef in Boskoop, aangevuld met waarnemingen uit Lisse. De hoogtes en breedtes zijn gemeten aan de hand van 4-5-jarige planten die in de winter licht teruggeknipt zijn (conform praktijk). Oudere planten die niet worden teruggeknipt kunnen dus nog hoger worden. De bloemkleuren zijn een indicatie, want vooral de oranje, roze en rode bloemen kunnen verbleken door de zon.

Bij beoordeling van de ziektegevoeligheid is een gezamenlijke beoordeling gegeven voor meeldauw en spint omdat ze vaak samen voorkomen en daardoor lastig afzonderlijk te beoordelen zijn.

**Beoordelingen:**

\*\*\* = uitstekend

\*\* = zeer goed

\* = goed

s = voor speciale doeleinden

o = kan vervallen

**\* *P. fruticosa* ‘Abbotswood’**

(F. Tustin, Abbotswood, Gloucester, Engeland, ca. 1960)

GROEIWIJZE: vrij hoge, breed opgaande plant; ca. 70 cm hoog en 90 cm breed; dicht vertakt, vrij stevig.

BLADEREN: groen, vrij groot, ca. 2 cm breed; bladsteel 0,5 cm lang; deelblaadjes 5, vrij breed, ca. 1,5 x 0,6 cm.

BLOEMEN: enkel, middelgroot, ca. 3 cm breed; kroonbladen wit (RHS-CC 155B), iets overlappend; bloei (vrij) rijk; bloeitijd half mei tot eind september (hoofdbloei half juni tot eind juli).

ZIEKTES/PLAGEN: vrij gevoelig voor spint en meeldauw.

Mooie breed groeiende witbloemige cultivar, die tot voor enkele jaren geleden tot de top van het sortiment witbloemige behoorde. Inmiddels zijn er nieuwe bloeirijkere en/of gezondere cultivars zoals ‘McKays White’ en ‘White Lady’. Toch krijgt ‘Abbotswood’ nog een ster vanwege de rijke bloei en de zuiverwitte bloemen. Kreeg in Engeland een AGM.

**o *P. fruticosa* ‘Alice’**

(Wilfrid, F. Simms, Engeland)

GROEIWIJZE: middelhoge, breed opgaande plant; ca. 50 cm hoog en 60 cm breed; halfdicht vertakt, vrij stevig.

BLADEREN: groen, middelgroot, ca. 1,5 cm breed; bladsteel 0,5 cm lang; deelblaadjes 5(-7), breed, ca. 1,2 x 0,6 cm.

BLOEMEN: enkel, vrij klein, ca. 2,5 cm breed; kroonbladen witgeel (RHS-CC 8D), niet overlappend; bloei (vrij) rijk; bloeitijd begin mei tot begin september (hoofdbloei juni-juli).

ZIEKTES/PLAGEN: gevoelig voor spint en meeldauw.

Opvallend vanwege de kleine witgele bloemen. Lijkt op ‘Limelight’, maar kleiner en met iets kleinere bloemen en met kroonbladen die niet overlappen. Helaas niet erg gezond, een belangrijke reden voor de keuringscommissie om deze



76. *P. fruticosa* ‘Abbotswood’

cultivar niet positief te waarderen. Toevalsaailling van ‘Ochroleuca’. Vernoemd naar de moeder van de winner.

**o *P. fruticosa* ‘Annette’**

(J.P. Louwers, Hazerswoude, 1983)

GROEIWIJZE: middelhoge, breed opgaande plant; ca. 50 cm hoog en 60 cm breed; dicht vertakt, stevig.

BLADEREN: groen, klein, ca. 1,2 cm breed; bladsteel 0,2 cm lang; deelblaadjes 5-7, vrij smal, ca. 1 x 0,3 cm.

BLOEMEN: enkel, vrij groot, ca. 3,2 cm breed; kroonbladen geeloranje (RHS-CC 15B), door zon snel verkleurend naar (oranje)geel, vrij sterk overlappend; bloei rijk; bloeitijd begin juni tot half november (hoofdbloei half juni tot eind september).

ZIEKTES/PLAGEN: iets gevoelig voor spint en meeldauw.

Deze oranjebloemige cultivar verkleurt bij zonnig weer sterk naar (oranje)geel. De gezondere en qua kleur veel stabielere ‘Hopley’s Orange’ overtreft de iets oudere ‘Annette’. Kruising tussen ‘Hachmanns Gigant’ en ‘Red Ace’.

**s *P. fruticosa* ‘Beesii’**

(Bees Ltd, Engeland, 1925)

syn. ‘Nana Argentea’

GROEIWIJZE: vrij lage, (breed) opgaande plant; ca. 45 cm hoog en 45 cm breed; halfdicht vertakt, stevig.

BLADEREN: zilvergrijs, vrij groot, ca. 2 cm breed; bladsteel 0,5 cm lang; deelblaadjes 3-5, zeer breed, ca. 1 x 0,6 cm.

BLOEMEN: enkel, vrij klein, ca. 2,5 cm breed; kroonbladen goudgeel (RHS-CC 6A), iets overlappend; bloei vrij rijk; bloeitijd begin mei tot eind oktober (hoofdbloei eind mei tot half juli).

ZIEKTES/PLAGEN: niet of nauwelijks gevoelig voor spint en meeldauw.

Opvallend vanwege de vrij lage groeiwijze en het vrij grote zilvergrijze blad met zeer brede deelblaadjes, waarbij het aantal deelblaadjes (3-5) gering is (karakteristiek van var. *arbuscula*); De bloei is niet opvallend rijk, maar vooral vanwege de bladkleur is het wel een plant die opvalt en door sommigen erg wordt gewaardeerd. Een echte plant voor de liefhebber dus. Steriele cultivar waarvan de stampers ontbreken; er worden geen zaden gevormd. De cultivar is geselecteerd van zaad uit Tibet.

o *P. fruticosa* 'Blink' (PRINCESS)

(R. Blair, Dawyck Gardens, Schotland, 1982)

syn. 'Pink Queen'

GROEIWIJZE: vrij lage, horizontaal tot breed opgaande plant; ca. 40 cm hoog en 65 cm breed; halfdicht vertakt, stevig.

BLADEREN: groen, klein, ca. 1,2 cm breed; bladsteel 0,3 cm lang; deelblaadjes 5(-7), middelbreed, ca. 0,8 x 0,3 cm.

BLOEMEN: enkel, vrij klein, ca. 2,5 cm breed; kroonbladen lichtroze (RHS-CC 56C), vaak iets donkerderroze aan de basis; na langdurige zonnige periode soms bijna wit, sterk overlappend, soms iets gekruld.; bloei rijk; bloeitijd half mei tot eind oktober (hoofdbloei juni-augustus).

ZIEKTES/PLAGEN: weinig gevoelig voor spint en meeldauw.

Opvallend vanwege de vrij kleine lichtroze bloemen en de vrij lage en brede groeiwijze. Helaas is de bloemkleur niet erg stabiel bij zonnig weer. 'Blink' wordt overtroffen door moderne rozebloemige cultivars zoals 'Kupinpa' (PINK PARADISE) en 'Pink Beauty'.

*P. fruticosa* 'Bloace': *P. fruticosa* 'Red Ace'

o *P. fruticosa* 'Buttercup'

(Knaphill Nurseries, Woking, Engeland, ca. 1980)

syn. 'Knaphill Buttercup'

GROEIWIJZE: middelhoge, breed opgaande plant; ca. 65 cm hoog en 80 cm breed; vrij los vertakt, vrij stevig.

BLADEREN: lichtgroen, klein, ca. 1,2 cm breed; bladsteel 0,3 cm lang; deelblaadjes 5-7, breed, ca. 0,7 x 0,3 cm.

BLOEMEN: enkel, vrij klein, ca. 2,5 cm breed; kroonbladen goudgeel (RHS-CC 6A), iets overlappend; bloei vrij rijk; bloeitijd half mei tot eind oktober (hoofdbloei juni-juli).

ZIEKTES/PLAGEN: weinig gevoelig voor spint en meeldauw.

Opvallend vanwege de vrij kleine goudgele bloemen in combinatie met klein en lichtgroen

blad. De groeiwijze bleek in de sortimentsproef erg los en onregelmatig. De vergelijkbare 'Klondike' en 'Goldkissen' hebben een mooiere en dichtere groeiwijze.

o *P. fruticosa* 'Chilo'

(A.A. Harkes, Hazerswoude, 1994)

GROEIWIJZE: vrij lage, (breed) opgaande plant; ca. 45 cm hoog en 45 cm breed; dicht vertakt, zeer stevig.

BLADEREN: wit- tot geelbont (grijsgroen met onopvallend geelwitte rand), middelgroot, ca. 1,8 cm breed; bladsteel 1 cm lang; deelblaadjes 5-7, zeer smal, ca. 1,5 x 0,3 cm.

BLOEMEN: enkel, middelgroot, ca. 2,8 cm breed; kroonbladen goudgeel (RHS-CC 6A), vrij sterk overlappend; kelk in vruchtstadium vrij sterk rood verkleurend; bloei (vrij) rijk; bloeitijd half mei tot half oktober (hoofdbloei juni-juli).

ZIEKTES/PLAGEN: niet of nauwelijks gevoelig voor spint en meeldauw.

Karakteristiek vanwege de vrij lage groei en het grijze bonte blad. Het bonte blad is echter niet erg stabiel en bovendien valt de bontheid nauwelijks op vanwege de grijze bladkleur. De goudgele bloemen worden gevolgd door opvallend rood gekleurde vruchtkelken. Qua bontheid is 'Silvery Moon' beter en opvallender.

o *P. fruticosa* 'Coronation Triumph'

(Indian Forestry Station, Saskatchewan, Canada ca. 1950)

GROEIWIJZE: vrij hoge, (breed) opgaande plant; ca. 75 cm hoog en 80 cm breed; halfdicht vertakt, vrij stevig.

BLADEREN: groen, groot, ca. 2,5 cm breed; bladsteel 1 cm lang; deelblaadjes 5-7, vrij smal, ca. 2 x 0,6 cm.

BLOEMEN: enkel, groot, ca. 3,5 cm breed; kroonbladen goudgeel (RHS-CC 6AB), niet overlappend; bloei (vrij) rijk; bloeitijd begin mei tot eind september (hoofdbloei juni tot half augustus).

ZIEKTES/PLAGEN: weinig gevoelig voor spint en meeldauw.

Het meest karakteristiek van deze vrij hoge geelbloemige cultivar zijn de grote, zeer losse bloemen waarvan de kroonbladen ver van elkaar staan en niet overlappen. De bloemen zijn vrij kwetsbaar; na een flinke regenbui vallen veel kroonbladen af. De cultivar vertoont veel overeenkomst met 'Dart's Sunnyboy'; voor verschillen zie aldaar. In het sortiment hoge grootbloemige gele cultivars zijn er veel betere zoals 'Goldfinger' en 'Grandiflora'.

Er is onduidelijkheid over de soortechtheid van



de deze cultivar; planten die in de trial van de RHS stonden waren anders (geen losse bloemen).

o *P. fruticosa* 'Cream Carpet'

(P. Kolster, Boskoop, ca. 2004)

GROEIWIJZE: vrij lage, horizontaal tot breed opgaande plant; ca. 40 cm hoog en 80 cm breed; halfdicht vertakt, vrij slap.

BLADEREN: grijsgroen, middelgroot, ca. 1,5 cm breed; bladsteel 0,5 cm lang; deelblaadjes 5, breed, ca. 1 x 0,5 cm.

BLOEMEN: enkel, middelgroot, ca. 3 cm breed; kroonbladen crèmekleurig (RHS-CC 8CD), iets overlappend; kelk in vruchtstadium iets rood verkleurend; bloei vrij rijk; bloeitijd eind mei tot begin oktober (hoofdbloei juni-juli).

ZIEKTES/PLAGEN: weinig gevoelig voor spint en meeldauw.

Cultivar met vrij lage groeiwijze in combinatie met crèmekleurige bloemen en grijsgroen blad. Vergelijkbaar met 'Interma' (DART'S CREAM), maar deze heeft grotere bloemen, met een iets opvallender geel centrum en met iets grover blad. De keuringscommissie geeft de voorkeur aan deze groeibloemige cultivar boven 'Cream Carpet'.

\* *P. fruticosa* 'Dakota Sunrise'

(North Dakota State University, Verenigde Staten, ca. 1978)

GROEIWIJZE: vrij lage, horizontaal tot liggende plant; ca. 40 cm hoog en 80 cm breed; halfdicht vertakt, vrij stevig.

BLADEREN: (grijs)groen, middelgroot, ca. 1,5 cm breed; bladsteel 0,5 cm lang; deelblaadjes 3-5, middelbreed, ca. 1,2 x 0,4 cm.

BLOEMEN: enkel, groot, ca. 3,5 cm breed; kroonbladen (licht)geel (RHS-CC 6C), vrij sterk overlappend; kelk in vruchtstadium iets rood verkleurend; bloei rijk; bloeitijd half mei half oktober (hoofdbloei juni-september).

ZIEKTES/PLAGEN: iets gevoelig voor spint en meeldauw.

De meest opvallende eigenschappen van deze cultivar zijn de lage brede groeiwijze en de grote (licht)gele bloemen. Ook het blad met relatief weinig deelblaadjes (3-5) is opvallend. De cultivar lijkt veel op 'Elizabeth', 'Oktober-sonne' en 'Longacre'. Vooral ten opzichte van 'Oktober-sonne' is het verschil minimaal. In de teelt is 'Dakota Sunrise' wat gemakkelijker te vermeerderen. Wellicht dat het toch om dezelfde plant gaat. Ten opzichte van 'Elizabeth' zijn de verschillen ook zeer klein; 'Dakota Sunrise' heeft iets minder grijs blad en de deelblaadjes

zijn iets smaller. Ook is de vatbaarheid voor meeldauw en spint lager. Van deze drie lage lichtgele cultivars is 'Dakota Sunrise' de beste. Voor verschillen met 'Longacre', zie aldaar.

*P. fruticosa* DART'S CREAM: zie *P. fruticosa* 'Interma'

\*\* *P. fruticosa* 'Dart's Golddigger'

(Darthuizer Boomkwekerijen B.V., Leersum, 1970)

syn. 'Interdig'

GROEIWIJZE: vrij lage, horizontaal tot breed opgaande plant; ca. 45 cm hoog en 70 cm breed; dicht vertakt, stevig.

BLADEREN: (grijs)groen, vrij groot, ca. 2 cm breed; bladsteel 0,6 cm lang; deelblaadjes 5-7, smal, ca. 2 x 0,5 cm.

BLOEMEN: enkel, zeer groot, ca. 4 cm breed; kroonbladen goudgeel (RHS-CC 6A), vrij sterk overlappend; kelk in vruchtstadium iets rood verkleurend; bloei rijk; bloeitijd eind mei tot begin oktober (hoofdbloei half juni tot half augustus).

ZIEKTES/PLAGEN: weinig gevoelig voor spint en meeldauw.

Dit is een prachtige, rijk bloeiende, gezonde lage gele bodembedekkende Potentilla. De cultivar valt op door de zeer grote goudgele bloemen. De cultivar is vergelijkbaar met 'Donard Gold' en 'Goldteppich'; voor verschillen zie aldaar. Van deze groep bloeit 'Dart's Golddigger' het langst door en is onder andere daarom in deze groep het hoogst gewaardeerd in de keuring.

o *P. fruticosa* 'Dart's Sunnyboy'

(Darthuizer Boomkwekerijen B.V., Leersum, 1992)

GROEIWIJZE: hoge, (breed) opgaande plant; ca.



77. *P. fruticosa* 'Dakota Sunrise'



78. *P. fruticosa* 'Dart's Golddigger'

90 cm hoog en 100 cm breed; vrij los vertakt, vrij slap.

BLADEREN: lichtgroen, vrij groot, ca. 2,2 cm breed; bladsteel 1 cm lang; deelblaadjes 7, middelbreed, ca. 1,7 x 0,6 cm.

BLOEMEN: enkel, middelgroot, ca. 3 cm breed; kroonbladen goudgeel (RHS-CC 6AB), niet overlappend; bloei vrij rijk; bloeitijd begin mei tot half september (hoofdbloei juni tot half augustus).

ZIEKTES/PLAGEN: iets gevoelig voor spint en meeldauw.

Hoge cultivar met goudgele, opvallend losse bloemen. Veel overeenkomst met 'Coronation Triumph', maar deze laatste is iets grover qua bloem en blad en de groeiwijze is juist iets minder hoog en iets minder los vertakt. In het sortiment hoge grootbloemige gele cultivars zijn er veel betere zoals 'Goldfinger' en 'Grandiflora'.

*s P. fruticosa* 'Daydawn'

(Slieve Donard, N.Ierland, 1968)

GROEIWIJZE: middelhoge, horizontaal tot breed opgaande plant; ca. 50 cm hoog en 80 cm breed; halfdicht vertakt, vrij stevig.

BLADEREN: groen, (vrij) klein, ca. 1,3 cm breed;

bladsteel 0,3 cm lang; deelblaadjes 4-6, smal, ca. 0,8 x 0,2 cm.

BLOEMEN: enkel, middelgroot, ca. 3 cm breed; kroonbladen lichtgeel (RHS-CC 12C), met roze tinten, sterk overlappend; bloei (vrij) rijk; bloeitijd half mei tot eind september (hoofdbloei juni tot half augustus).

ZIEKTES/PLAGEN: iets gevoelig voor spint en meeldauw.

Deze middelhoge cultivar valt vooral op door de aparte bloemkleur: lichtgeel met roze tinten. Verder is het blad (vrij) klein en fijn. De cultivar lijkt op 'Tom Conway', maar deze heeft een iets donkerder bloemkleur. Het is een mutant van 'Tangerine'. Vanwege de aparte bloemkleur een echte liefhebbersplant.

*o P. fruticosa* 'Donard Gold'

(Slieve Donard Nurseries, N.Ierland, voor 1955)

GROEIWIJZE: vrij lage, breed opgaande plant; ca. 40 cm hoog en 60 cm breed; dicht vertakt, stevig.

BLADEREN: (grijs)groen, vrij groot, ca. 2 cm breed; bladsteel 0,6 cm lang; deelblaadjes 5-7, vrij smal, ca. 1,6 x 0,5 cm.

BLOEMEN: enkel, groot, ca. 3,5 cm breed; kroon-



79. *P. fruticosa* 'Elfenbein'

bladen goudgeel (RHS-CC 6A), vrij sterk overlappend; kelk in vruchtstadium iets rood verkleurend; bloei rijk; bloeitijd eind mei tot eind september (hoofdbloei juni-juli).

ZIEKTES/PLAGEN: weinig gevoelig voor spint en meeldauw.

Vrij lage bodembedekkende grootbloemige goudgele cultivar. Overtroffen door de 'Dart's Golddigger' die iets grotere bloemen heeft, langer doorbloeit en iets groter en groeikrachtiger is.

**\*\* *P. fruticosa* 'Elfenbein'**

(VEG Dresden Tolkewitz, Duitsland, 1969)

GROEIWIJZE: middelhoge, horizontaal tot breed opgaande plant; ca. 50 cm hoog en 80 cm breed; halfdicht vertakt, vrij slap.

BLADEREN: grijsgroen, groot, ca. 2,5 cm breed; bladsteel 0,4 cm lang; deelblaadjes (3-)5, zeer breed, ca. 1,5 x 0,8 cm.

BLOEMEN: enkel, vrij groot, ca. 3,2 cm breed; kroonbladen roomwit tot wit (RHS-CC 11D-155B), iets overlappend; kelk in vruchtstadium iets rood verkleurend; bloei vrij rijk; bloeitijd half mei tot eind oktober (hoofdbloei juni).

ZIEKTES/PLAGEN: iets gevoelig voor spint en

meeldauw.

Mooie halfhoge breed uitgroeiende cultivar met vrij grote (room)witte bloemen. Qua groeiwijze en bloemkleur lijkt de plant nog het meest op 'Tilford Cream', maar deze heeft lichtgroen blad, is minder groeikrachtig en minder gezond. Ten opzichte van de lage witbloemige 'Manchu' is de plant grover qua groeiwijze, blad en bloemen. Zeer goede bodembedekker.

**o *P. fruticosa* 'Elizabeth'**

(Hilliers Nurseries, Ampfield, Engeland, ca. 1950)

syn. *P. arbuscula* HORT.; 'Sutter's Gold'

GROEIWIJZE: vrij lage, horizontaal tot breed opgaande plant; ca. 40 cm hoog en 80 cm breed; dicht vertakt, vrij stevig.

BLADEREN: grijsgroen, vrij klein, ca. 1,4 cm breed; bladsteel 0,4 cm lang; deelblaadjes 5(-)6, vrij breed, ca. 1 x 0,4 cm.

BLOEMEN: enkel, groot, ca. 3,5 cm breed; kroonbladen (licht)geel (RHS-CC 6C), vrij sterk overlappend; bloei zeer rijk; bloeitijd half mei tot begin november (hoofdbloei juni-agustus).

ZIEKTES/PLAGEN: gevoelig voor spint en meeldauw.

Een bekende rijkbloeiende en lang doorbloeiende cultivar. Helaas erg gevoelig voor spint en meeldauw. Inmiddels is de plant verbeterd door de gezondere 'Dakota Sunrise' en 'Longacre'. Voor verschillen, zie aldaar. Genoemd naar een dochter van Sir. Harold Hillier. Is vele jaren in de handel geweest als *P. arbuscula* (nu *P. fruticosa* var. *arbuscula*), waarvan 'Elizabeth' duidelijk invloed heeft.

*P. fruticosa* 'Farreri': ***P. fruticosa* 'Gold Drop'**  
*P. fruticosa* 'Farreri Select': ***P. fruticosa* 'Yellow Giant'**

o ***P. fruticosa* 'Flashlight'**

(A.A. Harkes, Hazerswoude, 1997)

GROEIWIJZE: vrij lage, breed opgaande plant; ca. 40 cm hoog en 50 cm breed; dicht vertakt, vrij stevig.

BLADEREN: groen, klein, ca. 1,2 cm breed; bladsteel 0,3 cm lang; deelblaadjes (3-)5, vrij smal, ca. 1 x 0,3 cm.

BLOEMEN: enkel, middelgroot, ca. 2,8 cm breed; kroonbladen (licht)geel (RHS-CC 6C), vrij sterk overlappend; kelk in vruchtstadium iets rood verkleurend; bloei (vrij) rijk; bloeitijd half mei tot eind oktober (hoofdbloei juni-juli).

ZIEKTES/PLAGEN: niet of nauwelijks gevoelig voor spint en meeldauw.

Vrij lage cultivar met klein blad en (licht)gele bloemen. Qua bloemkleur vergelijkbaar met bijvoorbeeld 'Maanelys' en 'Katherine Dykes', maar beiden zijn duidelijk groter. Voor gebruik als lage compacte gele *Potentilla* overtroffen door bijvoorbeeld 'Sommerflor'. De hoofdbloei is relatief kort, vandaar de naam 'Flashlight'.

o ***P. fruticosa* 'Floppy Disk'**

(Peter Catt, Liss Forest Nurseries, Engeland, ca. 1990)

GROEIWIJZE: lage, horizontaal tot liggende plant; ca. 30 cm hoog en 80 cm breed; halfdicht vertakt, vrij slap.

BLADEREN: groen, klein, ca. 1,2 cm breed; bladsteel 0,3 cm lang; deelblaadjes 5(-6), middelbreed, ca. 0,9 x 0,3 cm.

BLOEMEN: enkel tot half gevuld, (zeer) klein, ca. 2 cm breed; kroonbladen roze (RHS-CC 55B), met onregelmatig donkerder en lichterroze delen, sterk overlappend; bloei vrij arm; bloeitijd begin mei tot eind oktober (hoofdbloei juni).

ZIEKTES/PLAGEN: gevoelig voor spint en meeldauw.

Lage brede cultivar met enkele tot half gevulde (zeer) kleine roze bloemen, die weinig verkleuren in de zon. Helaas is de plant ziektegevoelig

en is de bloei niet erg rijk. Hierom wordt de plant ver overtroffen door de hogere en veel bloeirijkere 'Pink Beauty' en 'Kupinpa' (PINK PARADISE).

o ***P. fruticosa* 'Fredhem'**

(Herkomst onbekend; Polen?)

GROEIWIJZE: hoge, stijf opgaande plant; ca. 80 cm hoog en 50 cm breed; dicht vertakt, zeer stevig.

BLADEREN: groen, vrij groot, ca. 2,2 cm breed; bladsteel 2 cm lang; deelblaadjes 5-7, (vrij) smal, ca. 2,3 x 0,6 cm.

BLOEMEN: enkel, middelgroot, ca. 3 cm breed; kroonbladen geel (RHS-CC 6B), iets overlappend; bloei rijk; bloeitijd eind mei tot eind augustus (hoofdbloei juni-juli).

ZIEKTES/PLAGEN: niet of nauwelijks gevoelig voor spint en meeldauw.

Karakteristiek vanwege stijf opgaande groeiwijze en de gele bloemen. De cultivar lijkt het meest op 'Grandiflora', die hoger is en groter blad heeft. Beide cultivars hebben bloemen die iets lichtergeel zijn dan veel meer goudgele cultivars zoals 'Goldfinger' en 'Kobold'. 'Fredhem' is geen onaardige cultivar, maar in de keuring kwam 'Grandiflora' beter naar voren, onder andere vanwege de iets langere bloeitijd en de hogere groeiwijze.

o ***P. fruticosa* 'Glenroy Pinkie'**

(Ballalheannagh Gardens & Nurseries, Glen Roy, Isle of Man, Engeland)

GROEIWIJZE: middelhoge, breed opgaande plant; ca. 50 cm hoog en 60 cm breed; dicht vertakt, stevig.

BLADEREN: groen, middelgroot, ca. 1,7 cm breed; bladsteel 0,5 cm lang; deelblaadjes 5-7, middelbreed, ca. 1,2 x 0,4 cm.

BLOEMEN: enkel, middelgroot, ca. 3 cm breed; kroonbladen lichtroze (RHS-CC 56C), met donkerder vlekken/strepen; na langdurige zonnige periode bijna wit, sterk overlappend; bloei rijk; bloeitijd eind mei tot eind oktober (hoofdbloei juni-augustus).

ZIEKTES/PLAGEN: vrij gevoelig voor spint en meeldauw.

Middelhoge lichtroze bloeiende cultivar, waarvan de bloemen naar bleekroze tot bijna wit verkleuren na een zonnige periode. Met name deze verkleuring is ongewenst en bovendien is de cultivar ook vrij gevoelig voor spint en meeldauw. Daarom geen positieve waardering. In het sortiment lichtroze cultivars is 'Grace Darling' beter.

*P. fruticosa* 'Gold Carpet': *P. fruticosa* 'Goldteppich'

\* *P. fruticosa* 'Gold Drop'

(Besant, 1916)

syn. 'Farreri'; 'Goldkugel'

GROEIWIJZE: hoge, (breed) opgaande plant; ca. 80 cm hoog en 80 cm breed; halfdicht vertakt, stevig.

BLADEREN: lichtgroen, klein, ca. 1 cm breed; bladsteel 0,5 cm lang; deelblaadjes 7, smal, ca. 0,8 x 0,2 cm.

BLOEMEN: enkel, (zeer) klein, ca. 2 cm breed; kroonbladen goudgeel (RHS-CC 6A), iets overlappend; bloei rijk; bloeitijd half mei tot half oktober (hoofdbloei half juni tot half augustus).

ZIEKTES/PLAGEN: niet of nauwelijks gevoelig voor spint en meeldauw.

Deze hoge cultivar valt vooral op vanwege de



80. *P. fruticosa* 'Gold Drop'

zeer kleine goudgele bloemen en het kleine lichtgroene blad. Vergelijkbare cultivars zijn 'Klondike', 'Buttercup', 'Goldkissen' en 'Yellow Giant'. Hiervan zijn de eerste twee duidelijk lager dan 'Gold Drop'. Van de andere twee heeft 'Goldkissen' een compactere groeiwijze en 'Yellow Giant' grotere bloemen. De plant in eerste instantie benaamd als 'Farreri' en is afkomstig van zaad verzameld in 1914 in Zuidwest-Kansu (China). 'Klondike' komt uit hetzelfde zaaisel.

o *P. fruticosa* 'Golden Dwarf'

(Laddie de Jong, Marian Nurseries, Ierland, voor 1988)

GROEIWIJZE: lage, horizontaal tot breed opgaande plant; ca. 25 cm hoog en 50 cm breed; dicht vertakt, vrij stevig; een echte dwergvorm.

BLADEREN: (licht)groen, middelgroot, ca. 1,6 cm breed; bladsteel 0,7 cm lang; deelblaadjes 3-5, vrij breed, ca. 1,3 x 0,5 cm.

BLOEMEN: enkel, middelgroot, ca. 3 cm breed; kroonbladen goudgeel (RHS-CC 6A), vrij sterk overlappend; bloei vrij rijk; bloeitijd half mei tot half oktober (hoofdbloei half juni tot eind juli).

ZIEKTES/PLAGEN: weinig gevoelig voor spint en meeldauw.

Dwergvormige cultivar met een lage groeiwijze en middelgrote goudgele bloemen. Verder is opvallend het geringe aantal deelblaadjes per blad (3-5). Hoewel de plant qua groeiwijze uniek is, valt de sierwaarde wat tegen. Reden voor de keuringscommissie om geen positieve waardering te geven.

\*\*\* *P. fruticosa* 'Goldfinger'

(H Knol, Gorssel, Holland ca. 1970)

GROEIWIJZE: hoge, (breed) opgaande plant; ca. 80 cm hoog en 90 cm breed; halfdicht vertakt, vrij stevig.

BLADEREN: groen, vrij groot, ca. 2 cm breed; bladsteel 0,8 cm lang; deelblaadjes 7, vrij smal, ca. 1,6 x 0,5 cm.

BLOEMEN: enkel, middelgroot, ca. 3 cm breed; kroonbladen goudgeel (RHS-CC 6A), vrij sterk overlappend; bloei rijk; bloeitijd begin juni tot half oktober (hoofdbloei half juni tot eind augustus).

ZIEKTES/PLAGEN: weinig gevoelig voor spint en meeldauw.

Dit is zonder twijfel de mooiste hoge geelbloemige *Potentilla* op dit moment. Deze rijkbloeiende en gezonde cultivar, met prachtige goudgele bloemen en groot blad, wordt terecht veel gekweekt. Ten opzichte van de twee andere hoge, gele en grootbloemige cultivars in de proef, 'Grandiflora' en 'Fredhem', is de groei veel breder en minder compact. Bovendien zijn de bloemen van 'Goldfinger' meer goudgeel in plaats van geel.

\*\* *P. fruticosa* 'Goldkissen'

(J.J. Sörensen, Marzahne, Duitsland, voor 1977)

GROEIWIJZE: vrij hoge, opgaande plant; ca. 75 cm hoog en 70 cm breed; dicht vertakt, zeer stevig.

BLADEREN: lichtgroen, klein, ca. 1 cm breed; bladsteel 0,5 cm lang; deelblaadjes 5-7, (vrij) smal, ca. 0,7 x 0,2 cm.

BLOEMEN: enkel, klein, ca. 2,2 cm breed; kroonbladen goudgeel (RHS-CC 6AB), iets overlappend; bloei zeer rijk; bloeitijd half mei tot eind oktober (hoofdbloei juni-augustus).

ZIEKTES/PLAGEN: niet of nauwelijks gevoelig voor spint en meeldauw.



81. *P. fruticosa* 'Goldfinger'



82. *P. fruticosa* 'Goldkissen'

Vrij hoge dicht vertakte cultivar met klein lichtgroen blad en kleine goudgele bloemen. De plant is zeer bloeirijk, lang bloeiend en gezond en is door de keuringscommissie in de groep gele kleinbloemige cultivars als hoogste gewaardeerd. De cultivar is compacter dan bijvoorbeeld 'Buttercup', 'Gold Drop' en 'Yellow Giant' en iets hoger dan 'Klondike'; de laatste heeft ook grotere bloemen en donkerder blad.

*P. fruticosa* 'Goldkugel': *P. fruticosa* 'Gold Drop'

o *P. fruticosa* 'Goldstar'

(J. Hachmann, Barmstedt, Duitsland, 1976)  
syn. 'Goldstern'

GROEIWIJZE: middelhoge, breed opgaande plant; ca. 60 cm hoog en 80 cm breed; dicht vertakt, vrij stevig.

BLADEREN: grijsgroen, zeer groot, ca. 2,8 cm breed; bladsteel 0,8 cm lang; deelblaadjes 5(-7), smal, ca. 2,5 x 0,6 cm.

BLOEMEN: enkel, zeer groot, ca. 3,8 cm breed; kroonbladen goudgeel (RHS-CC 6A), sterk overlappend; bloei (vrij) rijk; bloeitijd eind mei tot begin oktober (hoofdbloei juni-augustus).

ZIEKTES/PLAGEN: vrij gevoelig voor spint en meeldauw.

Middelhoge cultivar met zeer grote goudgele bloemen en zeer groot blad, die lange tijd veel gekweekt is. Helaas is de cultivar vrij gevoelig voor spint en meeldauw. 'Goldstar' wordt inmiddels overtroffen door de gezondere 'Dart's Golddigger' (die iets lager en breder is), 'Rheinsberg' (kleinere bloemen en blad) en 'Sommerflor' (met kleinere bloemen en veel sterker rood verkleurende vruchtkelken). Het is een kruising tussen 'Goldteppich' en 'Hachmann's Gigant'.

*P. fruticosa* 'Goldstern': *P. fruticosa* 'Goldstar'

\* *P. fruticosa* 'Goldteppich'

(J. Hachmann, Barmstedt, Duitsland, 1969)  
syn. 'Gold Carpet'

GROEIWIJZE: Vrij lage, breed opgaande plant; ca. 45 cm hoog en 70 cm breed; halfdicht vertakt, vrij stevig.

BLADEREN: (grijs)groen, groot, ca. 2,5 cm breed; bladsteel 0,7 cm lang; deelblaadjes 5-7, vrij smal, ca. 2 x 0,6 cm.

BLOEMEN: enkel, middelgroot, ca. 3 cm breed; kroonbladen goudgeel (RHS-CC 6A), vrij sterk overlappend; kelk in vruchtstadium iets rood verkleurend; bloei (vrij) rijk; bloeitijd half mei tot eind september (hoofdbloei juni-juli).

ZIEKTES/PLAGEN: iets gevoelig voor spint en meeldauw.

Vrij lage breed groeiende cultivar met middelgrote goudgele bloemen. Veel gebruikt als bodembedekker. 'Goldteppich' lijkt in veel opzichten op 'Dart's Golddigger', maar heeft iets kleinere bloemen en bloeit iets vroeger. Vooral dit laatste heeft de keuringscommissie doen besluiten om 'Goldteppich' een ster te geven omdat het hiermee toch een aanvulling op de hoger gewaardeerde 'Dart's Golddigger'.

*P. fruticosa* 'Grace': *P. fruticosa* 'Pink Pearl'

\* *P. fruticosa* 'Grace Darling'

(Jack Drake, Inchriach, Schotland 1950)  
syn. 'Minpink' (PINK GIANT)?

GROEIWIJZE: hoge, breed opgaande plant; ca. 80 cm hoog en 100 cm breed; halfdicht vertakt, vrij stevig.

BLADEREN: (grijs)groen, (vrij) klein, ca. 1,3 cm breed; bladsteel 0,2 cm lang; deelblaadjes 5(-7), vrij smal, ca. 1 x 0,3 cm.

BLOEMEN: enkel, middelgroot, ca. 3 cm breed; kroonbladen lichtroze (RHS-CC 56C), vaak iets donkerderroze aan de basis; na langdurige zonnige periode bijna wit, vrij sterk overlappend; bloei vrij rijk; bloeitijd begin juni tot begin oktober (hoofdbloei half juni tot half september).

ZIEKTES/PLAGEN: iets gevoelig voor spint en meeldauw.

Hoge, breed opgaande cultivar met middelgrote lichtroze bloemen. De bloemen zijn redelijk kleurvast, maar kunnen na een lange zonnige periode lichter roze verkleuren, tot bijna wit. Van alle lichtroze cultivars is het de sterkste en meest kleurvaste. Weliswaar worden de echt roze cultivars zoals 'Pink Beauty' en 'Kupinpa' (PINK PARADISE) hoger gewaardeerd, maar toch heeft 'Grace Darling' toegevoegde waarde. 'Minpink'



83. *P. fruticosa* 'Goldteppich'

(PINK GIANT), die niet in de proef heeft gestaan, is waarschijnlijk identiek aan 'Grace Darling'; waarschijnlijk een omdoping dus.



84. *P. fruticosa* 'Grace Darling'

\* *P. fruticosa* 'Grandiflora'

(Herbarium exemplaar in Willdenow Herbarium, Duitsland, 1813)

GROEIWIJZE: zeer hoge, (stijf) opgaande plant; ca. 100 cm hoog en 70 cm breed; halfdicht vertakt, vrij stevig.

BLADEREN: (licht)groen, zeer groot, ca. 3 cm breed; bladsteel 1 cm lang; deelblaadjes 5-7, middelbreed, ca. 2 x 0,7 cm.

BLOEMEN: enkel, middelgroot, ca. 3 cm breed; kroonbladen geel (RHS-CC 6B), iets overlappend; bloei rijk; bloeitijd eind mei tot begin september (hoofdbloei half juni tot begin augustus).

ZIEKTES/PLAGEN: weinig gevoelig voor spint en meeldauw.

Mooie rijkbloeiende zeer hoge en stijf opgaande geelbloeiende cultivar. Het blad is zeer groot en de bloemkleur is iets lichter en minder goudgeel dan bijvoorbeeld 'Goldfinger'. Het is één van de hoogste cultivars van het sortiment *Potentilla*, hoger dan de vergelijkbare 'Fredhem'.

o *P. fruticosa* 'Hachmann's Gigant'

(J. Hachmann, Barmstedt, Duitsland, 1967)

GROEIWIJZE: middelhoge, breed opgaande plant; ca. 60 cm hoog en 75 cm breed; halfdicht vertakt, vrij stevig.

BLADEREN: groen, klein, ca. 1 cm breed; bladsteel 0,4 cm lang; deelblaadjes 5(-7), middelbreed, ca. 0,8 x 0,3 cm.

BLOEMEN: enkel, vrij groot, ca. 3,2 cm breed; kroonbladen goudgeel (RHS-CC 6A), vrij sterk overlappend; kelk in vruchtstadium iets rood verkleurend; bloei zeer rijk; bloeitijd half mei

tot eind oktober (hoofdbloei half juni tot eind augustus).

ZIEKTES/PLAGEN: vrij gevoelig voor spint en meeldauw.

Middelhoge cultivar met vrij grote goudgele bloemen. Vergelijkbaar met 'Goldstar' (met grotere bloemen), 'Sommerflor' (met sterke roodverkleuring van de vruchtkelk) en met 'Rheinsberg' (dichter vertakt). Helaas is de cultivar vrij ziektegevoelig en krijgt vooral daarom geen positieve waardering. Aanbevolen vervangers zijn 'Sommerflor' en 'Rheinsberg'.

\*\* *P. fruticosa* 'Hopley's Orange'

(Hopleys Plants Ltd., Much Hadham, Engeland)

GROEIWIJZE: middelhoge, horizontaal tot breed opgaande plant; ca. 50 cm hoog en 90 cm breed; dicht vertakt, vrij stevig.

BLADEREN: groen, (vrij) klein, ca. 1,3 cm breed; bladsteel 0,4 cm lang; deelblaadjes 5(-7), middelbreed, ca. 0,9 x 0,3 cm.

BLOEMEN: enkel, middelgroot, ca. 2,8 cm breed; kroonbladen oranje (RHS-CC 25B), na lange zonnige periode verkleurend naar oranjegeel, sterk overlappend; bloei (vrij) rijk; bloeitijd half



85. *P. fruticosa* 'Grandiflora'





86. *P. fruticosa* 'Hopley's Orange'

mei tot begin november (hoofdbloei juni-september).

ZIEKTES/PLAGEN: iets gevoelig voor spint en meeldauw.

Prachtige middelhoge cultivar met oranje bloemen. De bloemkleur is vrij stabiel, hoewel de bloemen na een lange zonnige periode wel wat lichter worden. De bloei is rijk en erg lang. Het is een zaailing van 'Red Ace'. Kreeg in Engeland een AGM.

*P. fruticosa* 'Interdig': *P. fruticosa* 'Dart's Golddigger'

**\* *P. fruticosa* 'Interma' (DART'S CREAM)**

(Darthuizer Boomkwekerijen B.V., Leersum, 1982)

GROEIWIJZE: vrij lage, horizontaal tot breed opgaande plant; ca. 40 cm hoog en 80 cm breed; dicht vertakt, vrij stevig.

BLADEREN: grijsgroen, (vrij) klein, ca. 1,3 cm breed; bladsteel 0,5 cm lang; deelblaadjes 3-5, vrij breed, ca. 1 x 0,4 cm.

BLOEMEN: enkel, groot, ca. 3,5 cm breed; kroonbladen crèmekleurig (RHS-CC 8CD), met gele basis, iets overlappend; kelk in vruchtstadium

iets rood verkleurend; bloei zeer rijk; bloeitijd eind mei tot half oktober (hoofdbloei juni-augustus).

ZIEKTES/PLAGEN: iets gevoelig voor spint en meeldauw.

Vrij lage breed groeiende cultivar met grote crèmekleurige bloemen. Karakteristiek zijn ook de grijsgroene bladeren met een gering aantal deelblaadjes (3-5). De vergelijkbare 'Cream Carpet' heeft kleinere bloemen en gemiddeld



87. *P. fruticosa* 'Interma' (DART'S CREAM)

meer deelblaadjes. De keuringscommissie geeft voorkeur aan 'Interma' (DART'S CREAM) boven 'Cream Carpet' vanwege de iets opvallender bloemen.

**\* *P. fruticosa* 'Janet'**

(Wilfrid, F. Simms, Engeland)

GROEIWIJZE: lage, horizontaal tot breed opgaande plant; ca. 30 cm hoog en 60 cm breed; halfdicht vertakt, vrij stevig.

BLADEREN: groen, middelgroot, ca. 1,5 cm breed; bladsteel 1 cm lang; deelblaadjes 5, middelbreed, ca. 1,2 x 0,4 cm.

BLOEMEN: enkel, middelgroot, ca. 2,8 cm breed; kroonbladen lichtgeel (RHS-CC 6D), met gele basis, vrij sterk overlappend; bloei rijk; bloeitijd half mei tot begin september (hoofdbloei juni tot half augustus).



88. *P. fruticosa* 'Janet'

ZIEKTES/PLAGEN: vrij gevoelig voor spint en meeldauw.

Lage cultivar met lichtgele bloemen. De cultivar is nog lager dan bijvoorbeeld de vergelijkbare 'Elizabeth' en 'Dakota Sunrise', die bovendien beide veel grijzer blad hebben. Qua combinatie van groeiwijze en bloemkleur uniek; helaas wel wat ziektegevoelig. Selectie uit zaaisel van Cannon Hall, Barnsley, Yorkshire. Genoemd naar de vrouw van de winner.

**\* *P. fruticosa* 'Katherine Dykes'**

(W.R. Dykes, Engeland, 1925)

GROEIWIJZE: hoge, (breed) opgaande plant; ca. 90 cm hoog en 100 cm breed; halfdicht vertakt, vrij stevig.

BLADEREN: (grijs)groen, vrij klein, ca. 1,4 cm breed; bladsteel 0,3 cm lang; deelblaadjes 5(-7), vrij breed, ca. 1 x 0,4 cm.

BLOEMEN: enkel, vrij klein, ca. 2,5 cm breed; kroonbladen (licht)geel (RHS-CC 6CD), met

goudgele basis, iets overlappend; bloei zeer rijk; bloeitijd half mei tot half oktober (hoofdbloei half juni tot eind augustus).

ZIEKTES/PLAGEN: weinig gevoelig voor spint en meeldauw.

Hoge cultivar met vrij kleine (licht)gele bloemen. De bloemkleur is duidelijk lichter dan veel goudgeelkleurige cultivars zoals 'Goldfinger' en 'Goldkissen', maar donkerder dan bijvoorbeeld 'Elizabeth'. Vergelijkbaar met 'Maanelys' (compacter en blad grijzer) en 'Sundance' (blad minder grijs en plant minder stevig). Staat te boek als zeer droogteresistent. De plant is genoemd naar de vrouw van de winner.

**\* *P. fruticosa* 'Klondike'**

(Gebr. Kruyt, Boskoop, ca. 1950)

GROEIWIJZE: middelhoge, (breed) opgaande plant; ca. 60 cm hoog en 60 cm breed; dicht vertakt, zeer stevig.

BLADEREN: groen, klein, ca. 1,2 cm breed; bladsteel 0,4 cm lang; deelblaadjes 5-7, vrij smal, ca. 1 x 0,3 cm.

BLOEMEN: enkel, middelgroot, ca. 3 cm breed; kroonbladen goudgeel (RHS-CC 6A), iets overlappend; bloei (vrij) rijk; bloeitijd begin juni tot eind oktober (hoofdbloei half juni tot eind augustus).



89. *P. fruticosa* 'Katherine Dykes'



90. *P. fruticosa* 'Kobold'

ZIEKTES/PLAGEN: weinig gevoelig voor spint en meeldauw.

Middelhoge cultivar met klein blad en middelgrote goudgele bloemen. Veel andere kleinbladige gele cultivars hebben lichtergroen blad en/of iets kleinere bloemen zoals 'Buttercup', 'Gold Drop' en 'Goldkissen'. Ook lijkt de plant wel wat op 'Yellow Giant', maar die is iets hoger en is minder compact en stevig.

*P. fruticosa* 'Knaphill Buttercup': *P. fruticosa* 'Buttercup'

\*\*\* *P. fruticosa* 'Kobold'

(K. Maralski, Oldenburg, Duitsland)

GROEIWIJZE: middelhoge, breed opgaande plant; ca. 60 cm hoog en 90 cm breed; zeer dicht vertakt, zeer stevig.

BLADEREN: groen, middelgroot, ca. 1,5 cm breed; bladsteel 0,5 cm lang; deelblaadjes 5(-7), (vrij) smal, ca. 1,5 x 0,4 cm.

BLOEMEN: enkel, middelgroot, ca. 3 cm breed; kroonbladen goudgeel (RHS-CC 6AB), vrij sterk overlappend; bloei zeer rijk; bloeitijd begin juni tot eind oktober (hoofdbloei half juni tot half september).

ZIEKTES/PLAGEN: weinig gevoelig voor spint en meeldauw.

Dit is de mooiste halfhoge geelbloeiende cultivar. 'Kobold' is zeer compact, zeer rijkbloeiend en gezond. Hiermee is de cultivar nog het best te vergelijken met 'Yellow Bird' (hoger en met half gevulde bloemen) en 'Rheinsberg' (iets minder compact en blad grijzer). Ook deze twee cultivars kregen een hoge waardering van de keuringscommissie.

\*\*\* *P. fruticosa* 'Kupinpa'<sup>PBR</sup> (PINK PARADISE)

(H.J.M. Kuijf, Uithoorn, 2009)

GROEIWIJZE: middelhoge, breed opgaande plant;



91. *P. fruticosa* 'Kobold'





92. *P. fruticosa* 'Kupinka' (PINK PARADISE)



93. *P. fruticosa* 'Limelight'

ca. 50 cm hoog en 70 cm breed; dicht vertakt, zeer stevig.

BLADEREN: groen, middelgroot, ca. 1,7 cm breed; bladsteel 0,5 cm lang; deelblaadjes 5, smal, ca. 1,2 x 0,3 cm.

BLOEMEN: half gevuld, middelgroot, ca. 3 cm breed; kroonbladen roze (RHS-CC 57C), na lange zonnige periode verkleurend naar lichtroze, sterk overlappend; bloei zeer rijk; bloeitijd begin juni tot half oktober (hoofdbloei half juni tot eind september).

ZIEKTES/PLAGEN: iets gevoelig voor spint en meeldauw.

Prachtige nieuwe cultivar met roze half gevulde bloemen. De bloei is zeer rijk, de hoofdbloei is erg lang en de bloemkleur is relatief stabiel. Hiermee is het een topper in het *Potentilla*-sortiment.

Gevonden als mutant in 'Pink Beauty' (LOVELY PINK). Ten opzichte van deze oudercultivar zijn de bloemen donkerder roze en meer gevuld.

*P. fruticosa* 'Lemon and Lime': *P. fruticosa* 'Limelight'

o *P. fruticosa* 'Leuchtfeuer'

(H.-J. Albrecht, Berlijn, Duitsland, 1982)

GROEIWIJZE: middelhoge, (breed) opgaande plant; ca. 60 cm hoog en 60 cm breed; halfdicht vertakt, vrij stevig.

BLADEREN: (grijs)groen, vrij groot, ca. 2 cm breed; bladsteel 0,5 cm lang; deelblaadjes 5(-7), (vrij) smal, ca. 1,7 x 0,5 cm.

BLOEMEN: enkel, vrij groot, ca. 3,2 cm breed; kroonbladen goudgeel (RHS-CC 6A), iets overlappend; kelk in vruchtstadium iets rood verkleurend; bloei (vrij) rijk; bloeitijd half mei tot begin oktober (hoofdbloei juni-augustus).

ZIEKTES/PLAGEN: iets gevoelig voor spint en meeldauw.

Middelhoge cultivar met vrij grote goudgele bloemen. Geen bijzondere verschijning in het grote sortiment geelbloemige. Qua gezondheid en bloeirijkheid overtroffen door 'Sommerflor'.

\*\*\* *P. fruticosa* 'Limelight'

(Liss Forest Nurseries, Hampshire, Engeland, 1985)

syn. 'Lemon and Lime'.

GROEIWIJZE: hoge, breed opgaande plant; ca. 80 cm hoog en 100 cm breed; dicht vertakt, zeer stevig.

BLADEREN: groen, middelgroot, ca. 1,5 cm breed; bladsteel 0,5 cm lang; deelblaadjes 5, breed, ca. 1 x 0,5 cm.

BLOEMEN: enkel, middelgroot, ca. 3 cm breed;

kroonbladen crèmekleurig (RHS-CC 8D), met gele basis, vrij sterk overlappend; bloei zeer rijk; bloeitijd half mei tot half oktober (hoofdbloei juni tot half augustus).

ZIEKTES/PLAGEN: niet of nauwelijks gevoelig voor spint en meeldauw.

Prachtige vrij hoge cultivar met crèmekleurige bloemen. De bloei is lang en zeer rijk en de plant is sterk en gezond. Hiermee behoort 'Limelight' zonder meer tot het topsortiment van *Potentilla*. Voor vergelijking met 'Primrose Beauty', zie aldaar. Gevonden als zaailing in tuin in Kent. Kreeg in Engeland een AGM.

\*\*\* *P. fruticosa* 'Living Daylight'

(H. Knol, Gorssel, 1986)

GROEIWIJZE: middelhoge, breed opgaande plant; ca. 50 cm hoog en 70 cm breed; halfdicht vertakt, vrij stevig.

BLADEREN: (donker)groen, klein, ca. 1,2 cm breed; bladsteel 0,3 cm lang; deelblaadjes 5(-7), vrij smal, ca. 1 x 0,3 cm.

BLOEMEN: enkel, klein, ca. 2,2 cm breed; kroonbladen (licht)geel (RHS-CC 5C), iets overlappend; bloei rijk; bloeitijd begin mei tot eind oktober (hoofdbloei juni-augustus).

ZIEKTES/PLAGEN: iets gevoelig voor spint en meeldauw.

Opvallende middelhoge rijkbloeiende cultivar met kleine (licht)gele bloemen en klein (donker) groen blad. De bloemkleur ligt in tussen goudgeel en lichtgeel, waarbij de bloemkleur mooi afsteekt tegen het donkergroene blad. Hiermee kreeg de cultivar de hoogste waardering en mag met recht een topper worden genoemd. De cultivar is enigszins vergelijkbaar met 'Longacre', maar deze is iets lager, iets minder gezond en heeft grijzer en groter blad en grotere bloemen.

\* *P. fruticosa* 'Longacre'

(Slieve Donard, N.Ierland, 1956)

syn. 'Longacre Variety'

GROEIWIJZE: vrij lage, horizontaal tot breed opgaande plant; ca. 40 cm hoog en 80 cm breed; halfdicht vertakt, vrij slap en overhangend.

BLADEREN: (grijs)groen, middelgroot, ca. 1,5 cm breed; bladsteel 0,4 cm lang; deelblaadjes 5, vrij breed, ca. 1,2 x 0,5 cm.

BLOEMEN: enkel, middelgroot, ca. 3 cm breed; kroonbladen (licht)geel (RHS-CC 6C), iets overlappend; bloei vrij rijk; bloeitijd half mei tot eind september (hoofdbloei juni tot half augustus).

ZIEKTES/PLAGEN: vrij gevoelig voor spint en meeldauw.

Mooie cultivar met lage groeiwijze en lichtgele bloemen. Hiermee is de cultivar het te vergelij-



94. *P. fruticosa* 'Living Daylight'

ken met 'Elizabeth' en 'Dakota Sunrise'. Ten opzichte van 'Elizabeth' is 'Longacre' een verbetering, onder andere qua gezondheid; hoewel 'Longacre' ook niet helemaal ziektevrij is. Verder zijn in vergelijking met zowel 'Elizabeth' als 'Dakota Sunrise' de takken minder stijf (meer overhangend), de bloemen iets kleiner en overlappen de kroonbladen iets minder. Gevonden in tuin in Longacre, N.Ierland.



95. *P. fruticosa* 'Longacre'

*P. fruticosa* 'Longacre Variety': *P. fruticosa* 'Longacre'

*P. fruticosa* LOVELY PINK: zie *P. fruticosa* 'Pink Beauty'

\*\* *P. fruticosa* 'Maanelys'

(Axel Olsen, Kolding, Denemarken, 1921)

syn. 'Moonlight'

GROEIWIJZE: hoge, (breed) opgaande plant; ca. 90 cm hoog en 100 cm breed; dicht vertakt, stevig.  
BLADEREN: grijsgroen, vrij groot, ca. 2 cm breed; bladsteel 1,5 cm lang; deelblaadjes 5, vrij breed, ca. 1,2 x 0,5 cm.

BLOEMEN: enkel, vrij klein, ca. 2,5 cm breed; kroonbladen (licht)geel (RHS-CC 6CD), met goudgele basis, iets overlappend; bloei zeer rijk; bloeitijd eind mei tot eind september (hoofdbloei juni-augustus).

ZIEKTES/PLAGEN: weinig gevoelig voor spint en meeldauw.

Mooie hoge compacte (licht)geel bloeiende cultivar met grijsgroen blad. Vergelijkbaar met 'Katherine Dykes', maar duidelijk compacter en het blad is iets grijzer en groter. Een oude cultivar die nog lang niet is afgeschreven.



96. *P. fruticosa* 'Maanelys'

**\*\* *P. fruticosa* 'Manchu'**

(Introductie waarschijnlijk door E H Wilson vanuit China rond 1910)

syn. 'Mandshurica'

GROEIWIJZE: vrij lage, horizontaal tot breed opgaande plant; ca. 40 cm hoog en 70 cm breed; halfdicht vertakt, vrij stevig; stengels donker paarsrode.

BLADEREN: grijsgroen-zilvergrijs, middelgroot, ca. 1,7 cm breed; bladsteel 0,5 cm lang; deelblaadjes 5, vrij breed, ca. 1,2 x 0,5 cm.

BLOEMEN: enkel, vrij klein, ca. 2,5 cm breed; kroonbladen wit (RHS-CC 155B), iets overlappend; kelk in vruchtstadium iets rood verkleurend; bloei vrij rijk; bloeitijd begin mei tot eind september (hoofdbloei juni-juli).

ZIEKTES/PLAGEN: gevoelig voor spint en meeldauw.

Mooie lage breed uitgroeiende cultivar met grijsgroen blad en kleine witte bloemen. De stengels zijn opvallend paarsrood. Helaas is de plant wel wat gevoelig. Het is de enige echt platgroeiende witbloemige cultivar, vandaar wel een positieve waardering.

*P. fruticosa* 'Mandshurica': *P. fruticosa* 'Manchu'



97. *P. fruticosa* 'Manchu'

*P. fruticosa* MANGO TANGO: zie *P. fruticosa* 'Uman'

\*\* *P. fruticosa* 'Marrob' (MARIAN RED ROBIN)  
(Laddie de Jong, Marian Nurseries, Ierland, 1990)

GROEIWIJZE: vrij lage, breed opgaande plant; ca. 40 cm hoog en 60 cm breed; halfdicht vertakt, vrij stevig.

BLADEREN: groen, (vrij) klein, ca. 1,3 cm breed; bladsteel 0,4 cm lang; deelblaadjes 5, vrij smal, ca. 1 x 0,3 cm.

BLOEMEN: enkel, middelgroot, ca. 2,8 cm breed; kroonbladen (licht)rood (RHS-CC 40B), na lange zonnige periode verkleurend naar oranje-rood (RHS-cc 32B), vrij sterk overlappend; bloei (vrij) rijk; bloeitijd half mei tot begin november (hoofdbloei half juni-september).

ZIEKTES/PLAGEN: weinig gevoelig voor spint en meeldauw.

Dit is de mooiste roodbloemige cultivar met een rijke en lange bloei en goede gezondheid. Bovendien is de rode bloemkleur vrij stabiel; beter dan bijvoorbeeld 'Red Ace' en 'Orangeade'. Alleen 'Red Lady' is nog roder en kleurvast, maar daarbij is de groei vaak wat zwakker. Kreeg in Engeland een AGM. De cultivar is

vanaf 2005 kwekersrechtelijk beschermd geweest in Europa, maar sinds 2011 is dit kwekersrecht beëindigd.

\*\* *P. fruticosa* 'McKay's White'

(Ken Altorfer, Mckay Nursery Co, Waterloo, Verenigde Staten)

GROEIWIJZE: vrij hoge, breed opgaande plant; ca. 70 cm hoog en 100 cm breed; dicht vertakt, vrij stevig.

BLADEREN: groen, (vrij) klein, ca. 1,3 cm breed; bladsteel 0,6 cm lang; deelblaadjes 5(-6), vrij smal, ca. 1 x 0,3 cm.

BLOEMEN: enkel, middelgroot, ca. 3 cm breed; kroonbladen (room)wit (RHS-CC 11D / 155B), iets overlappend; bloei zeer rijk; bloeitijd begin mei tot eind september (hoofdbloei juni-augustus).

ZIEKTES/PLAGEN: weinig gevoelig voor spint en meeldauw.

Mooie zeer rijkbloeiende vrij hoge witbloeiende cultivar. Ook de gezondheid is goed. De bloemkleur is soms wat roomwit in plaats van echt wit, waarin de cultivar verschilt van de zuiverwitte 'Abbotswood' en 'White Lady'. Het is een sport uit 'Katherine Dykes'



98. *P. fruticosa* 'Marrob' (MARIAN RED ROBIN)





99. *P. fruticosa* 'McKay's White'



100. *P. fruticosa* 'Medicine Wheel Mountain'

**\*\* *P. fruticosa* ‘Medicine Wheel Mountain’**  
(Roy Davidson, Seattle, Verenigde Staten, ca.1970)

syn. ‘Yellow Gem’; ‘Olympic Mountain’

GROEIWIJZE: zeer lage, horizontaal tot liggende plant; ca. 20 cm hoog en 80 cm breed; vrij los vertakt, slap.

BLADEREN: (grijs)groen, middelgroot, ca. 1,5 cm breed; bladsteel 0,3 cm lang; deelblaadjes 5, breed, ca. 1 x 0,5 cm.

BLOEMEN: enkel, middelgroot, ca. 2,8 cm breed; kroonbladen goudgeel (RHS-CC 6A), vrij sterk overlappend; bloei rijk; bloeitijd begin juni tot eind september (hoofdbloei half juni tot eind augustus).

ZIEKTES/PLAGEN: weinig gevoelig voor spint en meeldauw.

Unieke zeer platgroeïende cultivar met goudgele bloemen. Daarnaast is de plant ook gezond en behoorlijk groeikrachtig. Ideale eigenschappen voor een goede bodembedekker. Terecht een hoge waardering in de proef dus. Gevonden in Sioux territory van Utah (VS). De naam is ontleend aan het berggebied waar de plant is gevonden. Kreeg in Engeland een AGM.

*P. fruticosa* ‘Minpink’ (Pink Giant): zie *P. fruticosa* ‘Grace Darling’

*P. fruticosa* ‘Moonlight’: *P. fruticosa* ‘Maanelys’

**\* *P. fruticosa* ‘Mount Everest’**  
(Gebr. Kruyt, Boskoop, ca. 1950)

GROEIWIJZE: zeer hoge, opgaande plant; ca. 100 cm hoog en 90 cm breed; halfdicht vertakt, vrij stevig.

BLADEREN: groen, vrij groot, ca. 2 cm breed; bladsteel 0,6 cm lang; deelblaadjes 5(-6), vrij breed, ca. 1,5 x 0,6 cm.

BLOEMEN: enkel, vrij klein, ca. 2,5 cm breed; kroonbladen wit (RHS-CC 155B), iets overlappend; bloei vrij rijk; bloeitijd half mei tot half september (hoofdbloei juni).

ZIEKTES/PLAGEN: weinig gevoelig voor spint en meeldauw.

Een zeer hoge witbloemige cultivar. Het is een selectie uit de variabele var. *davurica* (syn. var. *veitchii*). Vooral planten die als var. *veitchii* in de handel zijn, blijken vaak ‘Mount Everest’ te zijn; dit bleek uit de Nederlandse en de Engelse cultivarproef. De twee cultivars waarmee ‘Mount Everest’ het meest overeenkomst vertoont zijn ‘Snowflake’ en ‘Sandved’. De eerste is lager en relatief breder en heeft iets grotere bloemen. ‘Sandved’ heeft vooral lichter groen



101. *P. fruticosa* ‘Mount Everest’

en iets kleiner blad en iets grotere bloemen. De keuringscommissie geeft van deze de voorkeur aan ‘Mount Everest’ boven ‘Snowflake’ en ‘Sandved’ omdat de eerste het meest gezond is.

*P. fruticosa* ‘Nana Argentea’: *P. fruticosa* ‘Beesii’

o *P. fruticosa* ‘New Dawn’

(Bridgemere Nurseries, Engeland, 1994)

GROEIWIJZE: middelhoge, breed opgaande plant; ca. 50 cm hoog en 60 cm breed; halfdicht vertakt, vrij stevig.

BLADEREN: groen, (vrij) klein, ca. 1,3 cm breed; bladsteel 0,3 cm lang; deelblaadjes 5(-7), vrij breed, ca. 1 x 0,4 cm.

BLOEMEN: enkel, vrij klein, ca. 2,5 cm breed; kroonbladen (licht)roze (RHS-CC 55D), vaak iets donkerderroze aan de basis; na langdurige zonnige periode bleekroze, sterk overlappend; bloei (vrij) rijk; bloeitijd eind mei tot eind oktober (hoofdbloei half juni tot half september).

ZIEKTES/PLAGEN: iets gevoelig voor spint en meeldauw.

Middelhoge cultivar met vrij kleine (licht)roze bloemen die enigszins verkleuren bij een zonnige periode. De bloemkleur is duidelijk donkerder dan die van lichtroze cultivars als ‘Blink’ (PRINCESS) en ‘Grace Darling’. Maar minder roze en ook minder stabiel qua kleur dan ‘Pink Beauty’ en ‘Kupinpa’ (PINK PARADISE). Door deze beter roze cultivars wordt ‘New Dawn’ dan ook ruim overtroffen.

o *P. fruticosa* ‘Oktoberonne’

(J.J. Sörensen, Marzahne, Duitsland, voor 1970)

GROEIWIJZE: vrij lage, horizontaal tot breed opgaande plant; ca. 40 cm hoog en 80 cm breed; halfdicht vertakt, vrij stevig.

BLADEREN: (grijs)groen, middelgroot, ca. 1,5 cm breed; bladsteel 0,3 cm lang; deelblaadjes 3(-5),

vrij breed, ca. 1,2 x 0,5 cm.

**BLOEMEN:** enkel, groot, ca. 3,5 cm breed; kroonbladen (licht)geel (RHS-CC 6C), vrij sterk overlappend; kelk in vruchtstadium iets rood verkleurend; bloei zeer rijk; bloeitijd half mei tot eind oktober (hoofdbloei juni-augustus).

**ZIEKTES/PLAGEN:** iets gevoelig voor spint en meeldauw.

Deze vrij lage (licht)gele cultivar lijkt in vrijwel alles op 'Dakota Sunrise', maar de plant is minder goed kweekbaar. Daarom gaat de voorkeur uit naar 'Dakota Sunrise'. Voor verder informatie, zie aldaar.

*P. fruticosa* 'Olympic Mountain': *P. fruticosa* 'Medicine Wheel Mountain'

#### \* *P. fruticosa* 'Orangeade'

(Peter Catt, Liss Forest, Engeland, ca. 1992)

**GROEIWIJZE:** middelhoge, breed opgaande plant; ca. 60 cm hoog en 80 cm breed; dicht vertakt, stevig.

**BLADEREN:** groen, middelgroot, ca. 1,5 cm breed; bladsteel 0,7 cm lang; deelblaadjes 5, (vrij) smal, ca. 1,1 x 0,3 cm.

**BLOEMEN:** enkel, middelgroot, ca. 2,8 cm breed; kroonbladen oranje-rood (RHS-CC 33B), door zon snel verkleurend naar geeloranje, sterk overlappend; bloei rijk; bloeitijd half mei tot begin november (hoofdbloei half juni tot eind september).

**ZIEKTES/PLAGEN:** weinig gevoelig voor spint en meeldauw.

Een middelhoge cultivar met middelgrote oranje-rode bloemen die door de zon snel verkleuren tot geeloranje. De cultivar lijkt in veel opzichten op de eveneens oranje-rode 'Red Ace', maar is wat instabieler qua bloemkleur. Wel is de groei juist weer wat krachtiger.



102. *P. fruticosa* 'Orangeade'

#### \*\**P. fruticosa* 'Pink Beauty' PBR

(LOVELY PINK)

(L. Lenz & C. Davidson, University of Manitoba, Canada, 1994)

**GROEIWIJZE:** middelhoge, (breed) opgaande plant; ca. 60 cm hoog en 60 cm breed; zeer dicht vertakt, zeer stevig.

**BLADEREN:** groen, middelgroot, ca. 1,5 cm breed; bladsteel 0,4 cm lang; deelblaadjes 5(-6), vrij smal, ca. 1 x 0,3 cm.

**BLOEMEN:** enkel tot half gevuld, vrij klein, ca. 2,5 cm breed; kroonbladen roze (RHS-CC 55B), na lange zonnige periode verkleurend naar lichtroze, iets overlappend; bloei zeer rijk; bloeitijd begin juni tot half oktober (hoofdbloei half juni tot eind september).

**ZIEKTES/PLAGEN:** weinig gevoelig voor spint en meeldauw.

Prachtige middelhoge compacte roze bloeiende cultivar. De bloei is rijk, de gezondheid goed en de enkel tot half gevulde bloemen zijn vrij stabiel qua kleur; ze verkleuren wat lichterroze na een lange zonnige periode, maar ze verbleken niet zoals veel (licht)roze bloeiende cultivars dat wel doen. Samen met 'Kupinpa' (PINK PARADISE) vormt 'Pink Beauty' de top van het sortiment rozebloemige *Potentilla*. Kreeg in Engeland een AGM.

*P. fruticosa* PINK PARADISE: zie *P. fruticosa* 'Kupinga'

#### o *P. fruticosa* 'Pink Pearl'

(Gevonden door Raymond Evison en geïntroduceerd door Blooms, Engeland)

syn. 'Grace'

**GROEIWIJZE:** middelhoge, breed opgaande plant; ca. 50 cm hoog en 60 cm breed; dicht vertakt, stevig.

**BLADEREN:** (licht)groen, middelgroot, ca. 1,5 cm breed; bladsteel 0,3 cm lang; deelblaadjes 5(-6), vrij breed, ca. 1 x 0,4 cm.

**BLOEMEN:** enkel, klein, ca. 2,2 cm breed; kroonbladen lichtroze tot licht oranje-rood (RHS-CC 56C / 33C), met donkerder vlekken/strepen; na langdurige zonnige periode vuilroze-wit, sterk overlappend; bloei (vrij) rijk; bloeitijd begin juni tot eind oktober (hoofdbloei half juni tot eind september).

**ZIEKTES/PLAGEN:** iets gevoelig voor spint en meeldauw.

Middelhoge cultivar met lichtroze tot lichtoranjerode bloemen. De bloemen zijn vaak wat vlekkerig en verkleuren vuilroze na een lange zonnige periode. In Nederland is de plant vooral in omloop als 'Grace'. In het sortiment lichtroze



**103. *P. fruticosa* 'Pink Beauty' (LOVELY PINK)**

Potentilla's geeft de keuringscommissie voorkeur aan 'Grace Darling', die krachtiger groeit en grotere bloemen heeft.

*P. fruticosa* 'Pink Queen': *P. fruticosa* 'Blink' (PRINCESS)

o *P. fruticosa* 'Pink Whisper'

(L. Lenz, University of Manitoba, Canada, 1988)

GROEIWIJZE: middelhoge, breed opgaande plant; ca. 50 cm hoog en 60 cm breed; halfdicht vertakt, vrij stevig.

BLADEREN: lichtgroen, klein, ca. 1,2 cm breed; bladsteel 0,3 cm lang; deelblaadjes 5(-6), middelbreed, ca. 0,9 x 0,3 cm.

BLOEMEN: enkel, soms iets gevuld, middelgroot, ca. 2,8 cm breed; kroonbladen lichtroze (RHS-CC 56C), na lange zonnige periode verkleurend naar vuilroze, vrij sterk overlappend; bloei vrij rijk; bloeitijd eind mei tot eind oktober (hoofdbloei half juni tot half september).

ZIEKTES/PLAGEN: weinig gevoelig voor spint en meeldauw.

Middelhoge cultivar met lichtroze bloemen en fijn lichtgroen blad. De bloemen zijn meestal enkel, soms iets gevuld en verkleuren vrij gauw naar vuilroze in de zon. Overtroffen door de echt roze bloeiende cultivars 'Kupinpa' (PINK

PARDADISE) en 'Pink Beauty' en in het sortiment lichtroze Potentilla's krijgt de krachtiger 'Grace Darling' de voorkeur van de keuringscommissie.

o *P. fruticosa* 'Pretty Polly'

(Peter Catt, Liss Forest, Engeland, ca. 1984)

GROEIWIJZE: lage, horizontaal tot breed opgaande plant; ca. 30 cm hoog en 50 cm breed; halfdicht vertakt, vrij stevig.

BLADEREN: (licht)groen, klein, ca. 1,2 cm breed; bladsteel 0,2 cm lang; deelblaadjes 5, zeer smal, ca. 0,9 x 0,2 cm.

BLOEMEN: enkel, soms iets gevuld, (zeer) klein, ca. 2 cm breed; kroonbladen lichtroze (RHS-CC 56C), vrij sterk overlappend; bloei vrij arm; bloeitijd begin juni tot half oktober (hoofdbloei half juni tot eind augustus).

ZIEKTES/PLAGEN: vrij gevoelig voor spint en meeldauw.

Lage brede plant met kleine lichtroze bloemen en klein blad met zeer smalle deelblaadjes. De lichtroze bloemkleur is vrij stabiel. Overtroffen door de echt roze bloeiende cultivars 'Kupinpa' (PINK PARDADISE) en 'Pink Beauty' en in het sortiment lichtroze Potentilla's krijgt de krachtiger 'Grace Darling' de voorkeur van de keuringscommissie. Het is een mutant uit 'Blink' (PRINCESS).

\* *P. fruticosa* 'Primrose Beauty'

(R. Cannegieter, Hattem, voor 1955)

GROEIWIJZE: hoge, (breed) opgaande plant; ca. 80 cm hoog en 80 cm breed; vrij los vertakt, vrij stevig.

BLADEREN: grijsgroen, (vrij) klein, ca. 1,3 cm breed; bladsteel 0,3 cm lang; deelblaadjes 5(-7), breed, ca. 0,8 x 0,4 cm.

BLOEMEN: enkel, middelgroot, ca. 3 cm breed; kroonbladen crèmekleurig (RHS-CC 8D), met gele basis, iets overlappend; bloei (vrij) rijk; bloeitijd half mei tot eind september (hoofdbloei juni-augustus).

ZIEKTES/PLAGEN: iets gevoelig voor spint en meeldauw.

Hoge cultivar met crèmekleurige bloemen en grijsgroen blad. Lijkt qua groei en bloemkleur op 'Limelight', maar heeft iets kleiner en veel grijzer blad. Weliswaar is 'Limelight' gezonder en bloeirijker, toch voegt 'Primrose Beauty' wel iets toe vanwege de grijze bladkleur. Kreeg in Engeland een AGM.



104. *P. fruticosa* 'Primrose Beauty'

*P. fruticosa* PRINCESS: zie *P. fruticosa* 'Blink'

s *P. fruticosa* 'Purdomii Alba'

(Herkomst nakijken)

GROEIWIJZE: hoge, opgaande plant; ca. 80 cm hoog en 70 cm breed; halfdicht vertakt, stevig; stengels opvallend donkerpaars.

BLADEREN: (licht)groen, middelgroot, ca. 1,7 cm breed; bladsteel 0,5 cm lang; deelblaadjes 5, zeer breed, ca. 1,2 x 0,7 cm.

BLOEMEN: enkel, klein, ca. 2,2 cm breed; kroonbladen wit, vrij sterk overlappend; bloei rijk; bloeitijd begin mei tot half september (hoofdbloei juni-juli).

ZIEKTES/PLAGEN: iets gevoelig voor spint en meeldauw.

Zeer karakteristiek hoog opgaande cultivar van-

wege de witte bloemen in combinatie met de opvallende donkerpaarse stengels en vanwege het blad met zeer brede deelblaadjes. Hiermee is 'Purdomii Alba' met geen enkele andere cultivar te verwarren. Vanwege de bijzondere eigenschappen waardevol en een echte liefhebbersplant.

*P. fruticosa* 'Raspberry Ripple': *P. fruticosa* 'Royal Flush'

\* *P. fruticosa* 'Red Ace'

(David Barker, Hopleys Plants, Engeland, 1973) syn. 'Bloace'

GROEIWIJZE: middelhoge, breed opgaande plant; ca. 50 cm hoog en 70 cm breed; dicht vertakt, stevig.

BLADEREN: groen, (vrij) klein, ca. 1,3 cm breed; bladsteel 0,3 cm lang; deelblaadjes 5(-7), vrij smal, ca. 1 x 0,3 cm.

BLOEMEN: enkel, middelgroot, ca. 3 cm breed; kroonbladen oranje-rood (RHS-CC 33B), na zonnige periode verkleurend naar geeloranje, vrij sterk overlappend; bloei zeer rijk; bloeitijd half mei tot begin november (hoofdbloei half juni-september).

ZIEKTES/PLAGEN: weinig gevoelig voor spint en meeldauw.

Middelhoge dicht vertakte cultivar met oranje-rode bloemen. De bloemen verkleuren vrij sterk in de zon, maar niet zo sterk als bijvoorbeeld 'Orangeade'. De bloemen zijn minder rood dan die van 'Marrob' (MARIAN RED ROBIN) en 'Red Lady', die beiden door de keuringscommissie



105. *P. fruticosa* 'Red Ace'

hoger gewaardeerd zijn. 'Red Ace' zorgde in de jaren '70 voor een kleurdoorbraak in het dan toe overwegend gele en witte *Potentilla*-sortiment.

\*\* *P. fruticosa* 'Red Lady' PBR

(P. Kolster JBzn., Boskoop, 2008)

GROEIWIJZE: vrij lage, breed opgaande plant; ca. 40 cm hoog en 60 cm breed; halfdicht vertakt, vrij stevig.

BLADEREN: (donker)groen, (vrij) klein, ca. 1,3 cm breed; bladsteel 0,3 cm lang; deelblaadjes 3-5, vrij smal, ca. 1 x 0,3 cm.

BLOEMEN: enkel, middelgroot, ca. 2,8 cm breed; kroonbladen rood (RHS-CC 46C), na lange zonnige periode verkleurend naar iets lichterrood, vrij sterk overlappend; bloei vrij arm; bloeitijd begin juni tot eind oktober (hoofdbloei half juli tot half september).

ZIEKTES/PLAGEN: gevoelig voor spint en meeldauw.

Mooie, vrij lage breed groeiende plant met zuiverrode bloemen. De bloemen zijn behoorlijk kleurvast; ze verkleuren hooguit naar iets lichterrood na een lange zonnige periode. 'Red Lady' is de meest rode cultivar van het Potentilla-sortiment. Helaas is de plant iets minder sterk en minder gezond dan "concurrent" 'Marrob' (MARIAN RED ROBIN), waaruit 'Red Lady' als zaailing is ontstaan. Reden voor de keuringscommissie om geen drie sterren te geven, maar twee.

### \*\* *P. fruticosa* 'Rheinsberg'

(H.-J. Albrecht, Berlijn, Duitsland, 1975)

GROEIWIJZE: middelhoge, breed opgaande plant; ca. 50 cm hoog en 70 cm breed; dicht vertakt, stevig.

BLADEREN: (grijs)groen, middelgroot, ca. 1,5 cm breed; bladsteel 0,5 cm lang; deelblaadjes 5(-7), (vrij) smal, ca. 1,5 x 0,4 cm.

BLOEMEN: enkel, middelgroot, ca. 3 cm breed; kroonbladen goudgeel (RHS-CC 6A), vrij sterk overlappend; bloei zeer rijk; bloeitijd eind mei tot eind oktober (hoofdbloei juni-augustus).

ZIEKTES/PLAGEN: weinig gevoelig voor spint en meeldauw.

Aantrekkelijke compacte goudgeelbloeiende cultivar, met een zeer rijke bloei en goede gezondheid. Verbetering van bijvoorbeeld 'Hachmann's Gigant' en 'Goldstar', onder andere vanwege de betere gezondheid. Voor verschillen, zie aldaar.

### o *P. fruticosa* 'Royal Flush'

(D. Barker, Engeland, voor 1980)

syn. 'Raspberry Ripple'

GROEIWIJZE: lage, horizontaal tot breed opgaande plant; ca. 25 cm hoog en 50 cm breed; halfdicht vertakt, vrij slap.



106. *P. fruticosa* 'Red Lady'



107. *P. fruticosa* 'Rheinsberg'

BLADEREN: groen, vrij klein, ca. 1,4 cm breed; bladsteel 0,3 cm lang; deelblaadjes 3-5, vrij smal, ca. 1 x 0,3 cm.

BLOEMEN: enkel, soms iets gevuld, klein, ca. 2,2 cm breed; kroonbladen roze, lichtroze verkleurend na een lange zonnige periode, sterk overlappend en soms iets gekruld; bloei arm; bloeitijd eind mei tot eind oktober (hoofdbloei juni).

ZIEKTES/PLAGEN: vrij gevoelig voor spint en meeldauw.

Lage brede plant met vrij klein blad en kleine roze bloemen. De bloemen zijn meestal enkel, soms iets gevuld. Helaas is de bloei arm en is de cultivar vrij ziektegevoelig. Overtroffen door de gezondere en rijker bloeiende cultivars 'Kupinpa' (PINK PARDADISE) en 'Pink Beauty'.

o *P. fruticosa* 'Sandved'

(Sandved Research Station, Sandved, Norway 1949)

syn. 'Sandvedana'

GROEIWIJZE: zeer hoge, opgaande plant; ca. 100 cm hoog en 90 cm breed; los vertakt, vrij stevig.

BLADEREN: lichtgroen, middelgroot, ca. 1,5 cm breed; bladsteel 0,6 cm lang; deelblaadjes 5-7, middelbreed, ca. 1,2 x 0,4 cm.

BLOEMEN: enkel, middelgroot, ca. 3 cm breed;

kroonbladen wit (RHS-CC 155B), vrij sterk overlappend; bloei vrij arm; bloeitijd half mei tot half september (hoofdbloei juni).

ZIEKTES/PLAGEN: gevoelig voor spint en meeldauw.

Zeer hoge witbloeiende cultivar met lichtgroen blad. Lijkt veel op 'Mount Everest', voor verschillen zie aldaar. Helaas bloeit de plant niet bijzonder rijk en is de ziektegevoeligheid hoog. Reden voor de keuringscommissie om geen positieve waardering te geven en 'Mount Everest' aan te bevelen als vervanger.

*P. fruticosa* 'Sandvedana': *P. fruticosa* 'Sandved'

s *P. fruticosa* 'Silvery Moon'

(G.J. Voskuilen, Boskoop, voor 1990)

GROEIWIJZE: lage, horizontaal tot liggende plant; ca. 25 cm hoog en 60 cm breed; halfdicht vertakt, vrij slap.

BLADEREN: wit- tot geelbont (grijsgroen met vrij opvallend geelwitte rand), klein, ca. 1,2 cm breed; bladsteel 0,4 cm lang; deelblaadjes (3-)5, vrij breed, ca. 1 x 0,4 cm.

BLOEMEN: enkel, middelgroot, ca. 3 cm breed; kroonbladen (licht)geel (RHS-CC 5C), niet overlappend; bloei vrij arm; bloeitijd eind mei tot half september (hoofdbloei juni tot half juli).

ZIEKTES/PLAGEN: vrij gevoelig voor spint en meeldauw.

Lage breed groeiende plant met grijzig geelbont blad en (licht)gele bloemen. Vooral het bonte blad is zeer karakteristiek en is ook stabiel bont dan dat van 'Chilo'. Helaas is de vrij ziektegevoelig en is de bloei vrij arm. Vanwege de unieke eigenschappen wel een echt liefhebbersplant.

o *P. fruticosa* 'Snowbird'

(L. Lenz, University of Manitoba, Canada, 1985)

GROEIWIJZE: vrij hoge, (breed) opgaande plant; ca. 70 cm hoog en 70 cm breed; dicht vertakt, zeer stevig.

BLADEREN: (licht)groen, middelgroot, ca. 1,6 cm breed; bladsteel 0,4 cm lang; deelblaadjes 5(-7), middelbreed, ca. 1,1 x 0,4 cm.

BLOEMEN: enkel tot half gevuld, klein, ca. 2,2 cm breed; kroonbladen wit (RHS-CC 155B), vrij sterk overlappend; bloei vrij rijk; bloeitijd half mei tot begin oktober (hoofdbloei juni).

ZIEKTES/PLAGEN: weinig gevoelig voor spint en meeldauw.

Vrij hoge dicht vertakte plant met kleine, enkele tot half gevulde, witte bloemen. Vergelijkbaar met 'Abbotswood', 'McKays White' en 'White



**108. *P. fruticosa* 'Sommerflor'**

Lady', die allemaal enkelbloemig zijn. Minder groeikrachtig en bloeirijk dan 'McKay's White' en 'White Lady', daarom geen positieve waardering.

o ***P. fruticosa* 'Snowflake'**

(K. Wezelenburg & Zn., Boskoop, 1956)

GROEIWIJZE: hoge, (breed) opgaande plant; ca. 80 cm hoog en 80 cm breed; los vertakt, vrij stevig.

BLADEREN: (licht)groen, vrij groot, ca. 2 cm breed; bladsteel 0,5 cm lang; deelblaadjes 5(-6), middelbreed, ca. 1,5 x 0,5 cm.

BLOEMEN: enkel, soms iets gevuld, middelgroot, ca. 3 cm breed; kroonbladen wit (RHS-CC 155B), vrij sterk overlappend; bloei vrij arm; bloeitijd half mei tot half september (hoofdbloei juni-juli).

ZIEKTES/PLAGEN: gevoelig voor spint en meeldauw.

Hoge witbloeiende plant. Vergelijkbaar met 'Mount Everest' en 'Sandved', maar iets lager. Overtroffen door 'Mount Everest' die vooral gezonder is. De cultivar is geselecteerd uit zaad verzameld in West China (Gansu en Shanxi). 'Farrer's White', 'Hersii' en 'Albicans', die allen niet in de proef stonden, komen uit hetzelfde zaaisel.

\*\*\* ***P. fruticosa* 'Sommerflor'**

(J. Hachmann, Duitsland, 1976)

syn. 'Summer Flower'

GROEIWIJZE: middelhoge, (breed) opgaande plant; ca. 50 cm hoog en 50 cm breed; dicht vertakt, vrij stevig.

BLADEREN: (grijs)groen, middelgroot, ca. 1,6 cm breed; bladsteel 0,6 cm lang; deelblaadjes 5(-7), vrij breed, ca. 1,5 x 0,6 cm.

BLOEMEN: enkel, middelgroot, ca. 3 cm breed; kroonbladen goudgeel (RHS-CC 6A), vrij sterk overlappend; kelk in vruchtstadium vrij sterk rood verkleurend; bloei (vrij) rijk; bloeitijd eind mei tot eind oktober (hoofdbloei juni-juli).

ZIEKTES/PLAGEN: weinig gevoelig voor spint en meeldauw.

Prachtige middelhoge rijkbloeiende plant met goudgele bloemen. Na uitbloei verkleuren de vruchtkelken opvallend rood, wat een mooi contrast geeft met de nieuwe gele bloemen. Dit maakt 'Sommerflor' tot een dynamische en opvallende plant in het grote geelbloemige *Potentilla*-sortiment.

Het is een kruising tussen 'Goldfinger' en 'Goldteppich'. Kreeg in Engeland een AGM.

o ***P. fruticosa* 'Sophie's Blush'**

(Philip Wood, Baronscourt, Abercorn's Estate,



N.Ierland)

GROEIWIJZE: vrij lage, breed opgaande plant; ca. 40 cm hoog en 60 cm breed; vrij los vertakt, vrij slap.

BLADEREN: groen, middelgroot, ca. 1,5 cm breed; bladsteel 0,4 cm lang; deelblaadjes 5-7, vrij breed, ca. 1 x 0,4 cm.

BLOEMEN: enkel, vrij klein, ca. 2,5 cm breed; kroonbladen wit met zwak roze tint, na lange zonnige periode helemaal wit, vrij sterk overlappend; bloei vrij rijk; bloeitijd begin mei tot begin oktober (hoofdbloei juni-juli).

ZIEKTES/PLAGEN: vrij gevoelig voor spint en meeldauw.

Vrij lage plant met witte bloemen die vooral bij donker weer een roze tint krijgen. Geen sterke groeier en de vrij ziektegevoelig, daarom geen positieve waardering. Als vervanger wordt 'Grace Darling' aangeraden. Genoemd naar de dochter van de graaf en gravin van Abercorn.

#### o *P. fruticosa* 'Sulphurascens'

(Oude selectie uit Yunnan)

GROEIWIJZE: middelhoge, (breed) opgaande plant; ca. 60 cm hoog en 60 cm breed; halfdicht vertakt, vrij stevig.

BLADEREN: lichtgroen, middelgroot, ca. 1,6 cm breed; bladsteel 0,4 cm lang; deelblaadjes 3(-5), breed, ca. 1,2 x 0,6 cm.

BLOEMEN: enkel, middelgroot, ca. 2,8 cm breed; kroonbladen wit, iets overlappend; kelk in vruchtstadium iets rood verkleurend; bloei vrij rijk; bloeitijd begin mei tot half september (hoofdbloei eind mei tot eind juni).

ZIEKTES/PLAGEN: gevoelig voor spint en meeldauw.

Middelhoge plant met lichtgroen blad en witte bloemen. Karakteristiek vanwege de brede deelblaadjes (invloed var. *arbuscula*). Vanwege de vrij zwakke groei en ziektegevoeligheid geen hoogvlieger. Het is een kruising tussen var. *arbuscula* en var. *davurica*. Waarschijnlijk zijn er meerdere klonen uit deze kruising in omloop gebracht onder dezelfde naam. Daarom wordt door sommige bronnen de naam

Sulphurascens Group gebruikt. In eerste instantie beschreven als soorthybride: *P. ×sulphurascens*.

*P. fruticosa* 'Summer Flower': *P. fruticosa* 'Sommerflor'

#### o *P. fruticosa* 'Sundance'

(L. Lenz, University of Manitoba, Canada, 1978)

GROEIWIJZE: zeer hoge, opgaande plant; ca. 100 cm hoog en 80 cm breed; halfdicht vertakt, vrij

stevig.

BLADEREN: (licht)groen, klein, ca. 1 cm breed; bladsteel 0,4 cm lang; deelblaadjes 5-7, middelbreed, ca. 0,8 x 0,3 cm.

BLOEMEN: enkel, vrij klein, ca. 2,5 cm breed; kroonbladen (licht)geel (RHS-CC 6CD), met goudgele basis, iets overlappend; bloei (vrij) rijk; bloeitijd begin mei tot eind september (hoofdbloei juni-agustus).

ZIEKTES/PLAGEN: iets gevoelig voor spint en meeldauw.

Zeer hoge plant met kleine blad en vrij kleine (licht)gele bloemen. De cultivar lijkt het meest op 'Katherine Dykes'; voor verschillen zie aldaar. Door deze cultivar wordt 'Sundance' ook overtroffen, onder andere in bloeirijkheid en gezondheid.

#### \* *P. fruticosa* 'Sunset'

(M.J. McGill, Ambleside, Cumbria, Engeland)

GROEIWIJZE: middelhoge, horizontaal tot breed opgaande plant; ca. 50 cm hoog en 90 cm breed; halfdicht vertakt, vrij slap.

BLADEREN: groen, middelgroot, ca. 1,5 cm breed; bladsteel 0,5 cm lang; deelblaadjes 5(-7), middelbreed, ca. 1,1 x 0,4 cm.

BLOEMEN: enkel, soms half gevuld (vooral in juni), middelgroot, ca. 3 cm breed; kroonbladen (geel)oranje (RHS-CC 23B), door zon snel verkleurend naar oranjegeel, sterk overlappend; bloei vrij rijk; bloeitijd eind mei tot half oktober (hoofdbloei half juni tot half september).

ZIEKTES/PLAGEN: gevoelig voor spint en meeldauw.

Middelhoge plant met geeloranje bloemen die snel naar geel verkleuren in de zon. Het is een mutant uit 'Tangerine'. De bloemen zijn iets donkerder dan die van 'Tangerine'. Qua bloemkleur wel uniek en wat sprekender dan 'Tangerine', daarom een positieve waardering. Opvallend is ook dat de bloemen in het begin van het bloeiseizoen (juni) soms half gevuld zijn.



109. *P. fruticosa* 'Sunset'

*P. fruticosa* 'Sutter's Gold': *P. fruticosa* 'Elizabeth'

o *P. fruticosa* 'Tangerine'

(Slieve Donard, Noord-Ierland, 1955)

GROEIWIJZE: middelhoge, horizontaal tot breed opgaande plant; ca. 50 cm hoog en 90 cm breed; halfdicht vertakt, vrij stevig.

BLADEREN: groen, (vrij) klein, ca. 1,3 cm breed; bladsteel 0,3 cm lang; deelblaadjes 5(-7), middelbreed, ca. 1,1 x 0,4 cm.

BLOEMEN: enkel, middelgroot, ca. 2,8 cm breed; kroonbladen geeloranje (RHS-CC 15B), door zon snel verkleurend naar (oranje)geel, vrij sterk overlappend; bloei (vrij) rijk; bloeitijd begin juni tot half oktober (hoofdbloei half juni tot half september).

ZIEKTES/PLAGEN: gevoelig voor spint en meeldauw.

Oude cultivar die in veel opzichten lijkt op de hiervoor genoemde 'Sunset'. In de jaren '50 bijzonder vanwege de oranjeachtige bloemkleur in het tot dan toe overwegend gele *Potentilla*-sortiment. Tegenwoordig echter overtroffen door veel stabielere oranje en gezondere cultivars zoals 'Hopley's Orange' en 'Uman' (MANGO TANGO). Ook de in 'Tangerine' ontstane mutant 'Sunset' heeft een sterkere oranje bloemkleur. De plant is na diverse keren doorzaaien geselecteerd uit zaad verzameld door Reginald Farrer in de jaren 1920.

o *P. fruticosa* 'Tilford Cream'

(Kelvin Lawrence, Tilford, Surrey, Engeland, ca. 1978)

GROEIWIJZE: vrij lage, horizontaal tot breed opgaande plant; ca. 45 cm hoog en 70 cm breed; dicht vertakt, stevig.

BLADEREN: lichtgroen, vrij klein, ca. 1,4 cm breed; bladsteel 0,5 cm lang; deelblaadjes 5, middelbreed, ca. 0,8 x 0,3 cm.

BLOEMEN: enkel, middelgroot, ca. 3 cm breed; kroonbladen roomwit (RHS-CC 11D), vrij sterk overlappend; bloei (vrij) rijk; bloeitijd half mei tot half oktober (hoofdbloei half juni tot half juli).

ZIEKTES/PLAGEN: gevoelig voor spint en meeldauw.

Vrij lage breed groeiende plant met lichtgroen blad en roomwitte bloemen.

Qua bloemkleur vergelijkbaar met 'Elfenbein' die veel grijzer blad heeft, krachtiger groeit en gezonder is en daarmee de voorkeur krijgt van de keuringscommissie. Nadeel van 'Tilford Cream' is ook dat de bloemen hun afgestorven lelijke kroonbladen lang vasthouden.

o *P. fruticosa* 'Tom Conway'

(Conway family, Henfield, Engeland)

GROEIWIJZE: vrij lage, horizontaal tot breed opgaande plant; ca. 40 cm hoog en 70 cm breed; halfdicht vertakt, vrij stevig.

BLADEREN: (licht)groen, vrij klein, ca. 1,4 cm breed; bladsteel 0,2 cm lang; deelblaadjes 5(-7), smal, ca. 1,2 x 0,3 cm.

BLOEMEN: enkel, middelgroot, ca. 3 cm breed; kroonbladen geel met roze voet en rand (RHS-CC 12C / 55B), na lange zonnige periode vrijwel helemaal geel, vrij sterk overlappend; bloei vrij rijk; bloeitijd half mei tot begin oktober (hoofdbloei juni).

ZIEKTES/PLAGEN: vrij gevoelig voor spint en meeldauw.

Vrij lage breed groeiende plant met vrij klein blad en geel met roze bloemen, die na een zonnige periode helemaal geel verkleuren. Wel een bijzondere bloemkleur, maar niet echt mooi volgens de keuringscommissie. Ook de ziektegevoeligheid is nadelig. Qua bloemkleur vergelijkbaar met 'Daydawn' die een "s" kreeg. Waarschijnlijk een mutant van 'Sunset'. Genoemd naar oorlogsveteraan Tom Conway.

\*\*\* *P. fruticosa* 'Uman' <sup>PBR</sup> (MANGO TANGO)

(L. Lenz, University of Manitoba, Canada, 2003)

GROEIWIJZE: middelhoge, breed opgaande plant; ca. 50 cm hoog en 60 cm breed; zeer dicht vertakt, zeer stevig.

BLADEREN: (licht)groen, middelgroot, ca. 1,7 cm breed; bladsteel 0,3 cm lang; deelblaadjes 5, middelbreed, ca. 1,5 x 0,5 cm.

BLOEMEN: enkel, vrij klein, ca. 2,5 cm breed; kroonbladen geeloranje (RHS-CC 23B), na lange zonnige periode verkleurend naar oranjegeel, sterk overlappend; bloei zeer rijk; bloeitijd eind mei tot begin november (hoofdbloei juni-september).

ZIEKTES/PLAGEN: weinig gevoelig voor spint en meeldauw.

Sensationele nieuwe zeer rijkbloeiende cultivar met een zeer compacte groeiwijze en geeloranje bloemen. De bloemen verkleuren na een lange zonnige periode naar oranjegeel, maar ook deze kleur blijft aantrekkelijk. Dit in combinatie met een goede gezondheid maken 'Uman' (MANGO TANGO) tot de beste oranjebloemige cultivar op dit moment.

\* *P. fruticosa* 'Vilmoriniana'

(Selectie van zaad uit het wild uit N. China in 1905)

GROEIWIJZE: hoge, opgaande plant; ca. 90 cm hoog en 70 cm breed; halfdicht vertakt, stevig.



110. *P. fruticosa* 'Uman' (MANGO TANGO)

BLADEREN: opvallend zilvergrijs, vrij groot, ca. 2,2 cm breed; bladsteel 0,8 cm lang; deelblaadjes 5, breed, ca. 1,5 x 0,7 cm.

BLOEMEN: enkel, vrij groot, ca. 3,2 cm breed; kroonbladen roomwit (RHS-CC 11D), met gele basis, iets overlappend; bloei vrij arm; bloeitijd begin juni tot half oktober (hoofdbloei juni).

ZIEKTES/PLAGEN: weinig gevoelig voor spint en meeldauw.

Hoge plant met opvallend zilvergrijs blad en roomwitte bloemen. Vooral als bladplant erg aantrekkelijk en met geen enkele andere cultivar te verwarren. Alleen 'Primrose Beauty' komt een beetje in de buurt, maar deze heeft minder opvallend zilvergrijs en kleiner blad en wordt minder hoog.

**\*\* *P. fruticosa* 'White Lady'**

(P. Kolster JBzn., Boskoop, 2009)

GROEIWIJZE: hoge, (breed) opgaande plant; ca. 80 cm hoog en 90 cm breed; halfdicht vertakt, vrij stevig.

BLADEREN: groen, middelgroot, ca. 1,5 cm breed; bladsteel 0,4 cm lang; deelblaadjes 5, vrij breed, ca. 1 x 0,4 cm.

BLOEMEN: enkel, middelgroot, ca. 3 cm breed; kroonbladen wit (RHS-CC 155B), vrij sterk overlappend; bloei vrij rijk; bloeitijd begin mei tot eind september (hoofdbloei juni-augustus).

ZIEKTES/PLAGEN: iets gevoelig voor spint en meeldauw.

Mooie hoge zuiverwitte cultivar. Vergelijkbaar met 'McKays White' maar deze heeft roomwitte bloemen en iets kleiner blad. Beide cultivars hebben voor- en nadelen. Van 'White Lady' is het contrast tussen blad en zuiverwitte bloemen mooier, maar 'McKays White' bloeit iets rijker. Daarom hebben beide cultivars waarde en krijgen beide cultivars twee sterren.

**o *P. fruticosa* 'White Rain'**

(Jack Drake, Inschriach, Schotland 1969)

GROEIWIJZE: vrij hoge, (breed) opgaande plant; ca. 70 cm hoog en 80 cm breed; halfdicht ver-



111. *P. fruticosa* 'Vilmoriniana'



112. *P. fruticosa* 'White Lady'



113. *P. fruticosa* 'Yellow Bird'

takt, vrij stevig.

BLADEREN: groen, vrij groot, ca. 2 cm breed; bladsteel 0,5 cm lang; deelblaadjes 5(-7), breed, ca. 1,2 x 0,6 cm.

BLOEMEN: enkel, middelgroot, ca. 3 cm breed; kroonbladen wit (RHS-CC 155B), niet overlappend; bloei rijk; bloeitijd half mei tot half september (hoofdbloei juni).

ZIEKTES/PLAGEN: weinig gevoelig voor spint en meeldauw.

Vrij hoge plant met witte bloemen. Karakteristiek aan deze cultivar zijn verder het vrij grote blad met brede deelblaadjes en de niet overlappende kroonbladen. Hiermee verschilt de plant van 'Abbotswood' die daarbij ook donkerder stengels heeft, maar er verder wel op lijkt. Het is geen onaardige cultivar, maar ten opzichte van de veel bekendere 'Abbotswood' voegt deze niets toe, vandaar geen positieve beoordeling.

### \*\*\* *P. fruticosa* 'Yellow Bird'

(L. Lenz, University of Manitoba, Canada, 1988)  
GROEIWIJZE: hoge, (breed) opgaande plant; ca. 80 cm hoog en 80 cm breed; dicht vertakt, zeer stevig.

BLADEREN: (licht)groen, middelgroot, ca. 1,7 cm breed; bladsteel 0,6 cm lang; deelblaadjes 5-7, vrij breed, ca. 1,2 x 0,5 cm.

BLOEMEN: enkel tot half gevuld, vrij klein, ca. 2,5 cm breed; kroonbladen goudgeel (RHS-CC 6AB), sterk overlappend; bloei zeer rijk; bloeitijd half mei tot eind september (hoofdbloei juni-augustus).

ZIEKTES/PLAGEN: niet of nauwelijks gevoelig voor spint en meeldauw.

Een prachtige zeer rijkbloeiende cultivar met gele bloemen die enkel tot half gevuld zijn. De plant is hoog, maar zeer dicht vertakt en niet ziektegevoelig. Naast 'Sommerflor', 'Kobold' en 'Goldfinger' behoort 'Yellow Bird' tot het topsortiment van de geelbloemige. Vanwege de hoge en compacte groeiwijze in combinatie met de enkele tot half gevulde bloemen is de cultivar goed te onderscheiden van anderen. Kreeg in Engeland een AGM.

*P. fruticosa* 'Yellow Gem': *P. fruticosa* 'Medicine Wheel Mountain'

### o *P. fruticosa* 'Yellow Giant'

(W. Haalboom, Driebergen, 1964)  
syn. 'Farreri Select'

GROEIWIJZE: vrij hoge, (breed) opgaande plant; ca. 70 cm hoog en 80 cm breed; halfdicht vertakt, vrij stevig.

BLADEREN: (licht)groen, klein, ca. 1,2 cm breed;

bladsteel 0,4 cm lang; deelblaadjes 5(-7), vrij smal, ca. 1 x 0,3 cm.

BLOEMEN: enkel, middelgroot, ca. 3 cm breed; kroonbladen goudgeel (RHS-CC 6AB), vrij sterk overlappend; bloei rijk; bloeitijd eind mei eind oktober (hoofdbloei juni-september).

ZIEKTES/PLAGEN: weinig gevoelig voor spint en meeldauw.

Vrij hoge plant met klein blad en goudgele bloemen. De cultivar heeft grotere bloemen dan andere kleinbladige *Potentilla*'s zoals 'Goldkissen' en 'Buttercup'. Voor verschillen met 'Klondike', zie aldaar. 'Yellow Giant' kreeg geen positieve waardering omdat deze qua plantvorm wordt overtroffen door 'Klondike' en 'Buttercup'.

## Niet beoordeelde cultivars

### *P. fruticosa* 'Abbotswood Silver'

(Verenigde Staten, voor 1988, via Peter Catt in Europa geïntroduceerd)

De groeiwijze van 'Abbotswood Silver' is vrijwel gelijk aan die van 'Abbotswood'; het verschil is dat de bladeren een witte rand hebben. De bloei is eveneens gelijk aan 'Abbotswood'. Volgens Kolster & Kromhout (2000) is het bont is niet overtuigend; er ontstaat een vale, onbestemde kleurindruk.

### *P. fruticosa* 'Apricot Whisper'

(L. Lenz, Winnipeg, Manitoba, Canada, 1988)  
Halfronde, compacte struik. Bladeren lichtgroen, middelgroot. Bloemen licht abrikooskleurig, in de zomer naar geel verkleurend. Voegt volgens Kolster & Kromhout (2000) weinig toe aan het bekende sortiment.

### *P. fruticosa* 'Beanii'

(L. Späth, Berlijn, Duitsland, voor 1910)  
syn. *P. fruticosa* 'Friedrichsenii Leucantha'  
Hoog opgaande groeiwijze met groene bladeren en kleine, witte bloemen.

### *P. fruticosa* 'Bewerly Surprise'

(A. Sigston-Thompson, Engeland, 1980)  
Breed opgaande tot spreidende struik. Blad middelgroot, groen, met 5-6(-7) deelblaadjes. Bloemen zacht geel tot abrikooskleurig, matig groot, lang doorbloeiend. Sport uit 'Tangerine'. Volgens Kolster & Kromhout (2000) erg spintgevoelig en daarom wordt afgeraden deze cultivar te gebruiken.

***P. fruticosa* ‘Burren Gold’**

(Wilf Simms, Engeland, 1994)

Bossige plant die op later leeftijd wat opener en breder wordt. Bloemen goudgeel met een iets donkerder centrum. Bloeit lang, van mei tot september. Blad donkerblauwgroen, groot; 5(-7) lancetvormige deelblaadjes. Lage, compacte selectie uit wilde populatie van “The Burren” (Ierland). Lijkt op ‘Teesmaid’, maar kleiner.

***P. fruticosa* ‘Cascade’**

(Hopleys Plants, Engeland, ca. 1985)

Lage groeiwijze. Blad klein, met 5 deelblaadjes. Bloemen bleekgeel tot crèmekleurig, gewoonlijk met bleekoranje centrum. Bloeitijd van juni tot oktober. Toevalszaailing.

***P. fruticosa* ‘Chelsea Star’**

(Hopleys Plants, Engeland, ca. 1989)

Bossige opgaande plant. Blad klein, met 5-7 smalle deelblaadjes. Bloemen goudgeel, zeer klein; kroonbladen niet overlappend. Bloeitijd mei tot september. Plant geïntroduceerd op de Chelsea Flower Show in 1989. Lijkt op ‘Gold Drop’, maar bloeit vroeger en de bloemen meer stervormig doordat de kroonbladen niet overlappen. AGM (2002).

***P. fruticosa* ‘Dakota Goldrush’**

(North Dakota State University, Verenigde Staten)

Opgaande struik met stevige takken, als ‘Jackman’. Bladeren helder groen, groot. Bloemen diepgeel, opvallend doorbloeiend. Lijkt veel op ‘Jackman’, doch met groene kelkbladen. De bloemen vallen goed op, speciaal in tweede helft van de zomer.

***P. fruticosa* ‘Dakota Sunspot’**

(North Dakota State University, Verenigde Staten)

Compacte, dichte struik. Bladeren vrij klein, groen. Bloemen diepgoudgeel, groot (3 cm), rijkbloeiend. Lijkt veel op ‘Hurstbourne’ maar kleiner en met grotere bloemen. Bloeit tot de nachtvorst.

***P. fruticosa* ‘Dart’s First Lady’**

(Darthuizer Boomkwekerijen BV., Leersum, 1990)

Bossige, compacte struik met vrij klein, groen blad en geel met iets rode, middelgrote bloemen. Geselecteerd uit ‘Bewerley Surprise’; verbeterd door ‘Funny Face’.

***P. fruticosa* ‘Dart’s Nugget’**

(Darthuizer Boomkwekerijen BV., Leersum, 1970)

Brede, hoog opgaande groeiwijze. Bladeren licht grijsgroen. Bloemen diepgeel, zeer groot, rijkbloeiend en doorbloeiend tot aan de nachtvorsten.

***P. fruticosa* ‘Eastleigh Cream’**

(Eastleigh Nursery van Hilliers Nurseries, Engeland, 1969)

Breed opgaande struik met paarsrode stengels. Bloemen crèmekleurig met geelachtig centrum. Kroonbladen niet overlappend. Bloeitijd juni tot oktober. Blad dof groen met 5 of 6 deelblaadjes. Een kruising tussen ‘Gold Drop’ en ‘Sulphurascens’.

*P. fruticosa* ‘Friedrichsenii Leucantha’: ***P. fruticosa* ‘Beanii’**

***P. fruticosa* ‘Funny Face’**

(Darthuizer Boomkwekerijen BV., Leersum, 1994)

Brede, bossige struik met vrij klein, groen blad en een geel met rood, in elkaar overvloeiende bloemkleur. Vooral deze bloemkleur is opvallend anders dan wat tot nu toe bekend is. Geselecteerd uit een zaaisel van ‘Red Ace’.

***P. fruticosa* ‘Glenroy Flattie’**

(Ballalheannagh Gardens Nurseries, Glenroy, Isle of Man, Engeland)

Plant horizontaal groeiend. Bloemend heldergeel; bloeitijd van juli tot oktober. Blad groen met 5 deelblaadjes. Gevonden als toevalszaailing.

***P. fruticosa* ‘Glenroy Seashell’**

(Ballalheannagh Gardens Nurseries, Glenroy, Isle of Man, Engeland)

Grote groeiachtige, breed spreidende plant. Blad middelgroot tot groot, groen met 5(-6) deelblaadjes. Bloemen cremekleurig, met roze tot witte bloes; verkleurend naar wit. Bloeitijd van juli tot oktober. Lijkt erg op ‘Glenroy Pinkie’, maar de plant is groeiachtiger en de bloemen verkleuren gemakkelijker.

***P. fruticosa* ‘Gold Parade’**

(Privetuin, Burton op Trent, Engeland)

Bossige opgaande plant. Blad groen tot grijsgroen, groot, met 5(-7) deelblaadjes. Bloemen goudgeel, zeer groot; bloeitijd van juli tot september. Lijkt veel op ‘Goldfinger’.

***P. fruticosa* ‘Golden Spreader’**

(Ontwikkeld in Orkney door A. Bremmer en introductie door Blooms, Engeland)

Groeiwijze liggend; bodembedekkend. Blad groen, met 5(-7) deelblaadjes. Bloemen geel; bloeitijd juni-september. Zeer winterhard. Lijkt veel ‘Yellow Carpet’, maar bloeit later, is iets minder plat en heeft wat helderder groen blad.

***P. fruticosa* ‘Goscote’**

(Derek Cox, Goscote Nurseries, Engeland, 1974)

Bossige laag groeiende plant met roodbruine stengels. Blad dof grijsgroen, met opvallende steunblaadjes; er zijn 5-7 brede deelblaadjes. Zaailing van ‘Elizabeth’. Lijkt enigszins op ‘Sommerflor’ maar verschilt o.a. vanwege de opvallende steunblaadjes.

***P. fruticosa* ‘Groneland’**

(Hongarije)

Bossige plant; stengels bleekrood. Blad helder-groen met 5(-7) deelblaadjes. Bloemen wit met iets geelachtig centrum; kroonbladen iets overlappend. Bloeitijd van mei tot september. Soms in de handel ‘Greenland’. AGM (2002).

***P. fruticosa* ‘Hazel’**

(Paul Gorman, Cannon Hall, Barnsley, Engeland, 1995)

Hoge opgaande plant met dikke bruine stengels. Blad groen, groot, met 5 deelblaadjes. Bloemen goudgeel, met donkerder oranjegeel centrum; kroonbladen iets overlappend. Bloeitijd van mei tot september. Genoemd naar de vrouw van de winner. Nauw verwant aan ‘Jackman’.

***P. fruticosa* ‘Hersii’**

(Joseph Hers; selectie uit zaaisel van zaad verzameld in Gansu en Shanxi, West China)

Plant bossig; stengels roodbruin. Blad dof grijs-groen, middelgroot tot groot, relatief zeer breed. Bloemen wit, middelgroot tot klein; kroonbladen iets overlappend. Bloeitijd van juli tot september.

***P. fruticosa* ‘Hopleys Little Joker’**

(Hopleys Plants Ltd., Much Hadham, Engeland, 1985)

Struikje tot 80 cm hoog met groen blad en zacht-oranje bloemen.

***P. fruticosa* ‘Hopleys Pink’**

(Hopleys Plants, Engeland)

Bossige plant. Blad zilvergrijs-groen, met 5-7 vrij brede deelblaadjes. Bloemen wit met roze tint. Bloeitijd juli-oktober. Lijkt veel op ‘Pink

Pearl’, maar de deelblaadjes zijn breder.

***P. fruticosa* ‘Hunter’s Moon’**

(Jack Drake, Inschriach, Schotland, ca 1959)

Bossige opgaande plant met bruine stengels. Blad donkergroen met 5 brede deelblaadjes. Bloemen heldergeel met iets groene tint, met goudgeel centrum; kroonbladen iets overlappend. Bloeitijd mei-september. Gevonden als zaailing in Highdown Gardens, Worthing, Sussex, Engeland. Wellicht verwant aan var. *arbuscula*.

***P. fruticosa* ‘Hurstbourne’**

(RBG Kew, Surrey, Engeland, voor 1934)

Vrij laag groeiend heestertje met groen blad en helder gele, kleine bloemen.

***P. fruticosa* ‘Jackman’**

(G. Jackman & Sons, Engeland, ca. 1940)

(syn. *P. fruticosa* ‘Jackman’s Variety’)

Zeer hoog groeiende struik met opgaande takken. Bladeren donker grijsgroen, zeer grof, met 5-7 deelblaadjes. Bloemen diepgeel, groot. Waarschijnlijk een zaailing van ‘Grandiflora’. ‘Jackman’ verschilt van ‘Grandiflora’ vanwege de iets grotere bloemen en de meer opgaande groeiwijze. ‘Jackman’ heeft volgens Kolster & Kromhout (2000) als nadeel dat de kelkbladen sterk bruin verkleuren en niet afvallen. Hierdoor ontstaat een rommelig beeld. ‘Maanelys’ kent dit verschijnsel niet. Blijkaar zag RHS dit niet als nadeel, want deze gaf in 2002 een AGM.

*P. fruticosa* ‘Jackman’s Variety’: ***P. fruticosa* ‘Jackman’**

***P. fruticosa* ‘Jolina’**

(H-J. Albrecht, Berlin, Duitsland, 1977)

Groeiwijze breed, dicht en laag. Bladeren grijs-groen, tamelijk grof. Bloemen diepgeel, groot. Bloeitijd van juli tot september. ‘Jolina’ heft ten opzichte van ‘Dart’s Golddigger’ groter blad en een lagere groeiwijze. Sommige bronnen beweren dat het hier toch om dezelfde plant gaat (bv. W. Simms, UK)

***P. fruticosa* ‘Judith’**

(Engeland, ?)

Miller (2002) kent deze plant alleen maar van Cannon Hall, Barnsley, Engeland. Breed groeiende bossige plant. Blad dof- tot bleekgroen, met 5 deelblaadjes. Bloemen wit tot crèmekleurig met lichte groentint..

***P. fruticosa* 'King Cup'**

(Herkomst onbekend)

Grote opgaande plant. Bloemen heldergeel. Van juni tot oktober. Lijkt erg veel op 'Goldfinger', maar is iets minder dicht vertakt. AGM (2002).

***P. fruticosa* 'Kingdon Ward'**

(Selectie uit zaad verzameld door Kingdon Ward in Tibet in 1925)

Bossige plant met dikke stengels. Blad grijs-groen, sterk behaard, met 5 deelblaadjes. Bloemen geel, met iets overlappende kroonbladen. Overeenkomst met 'Beesii', meer met grotere bloemen.

***P. fruticosa* 'Macpenny's Cream'**

(Macpennys Nursery, Christchurch, Engeland, ca. 1985)

Bossige tot open groeiwijze; stengels roodbruin. Blad heldergroen, groot, met 5-7 deelblaadjes. Bloemen wit tot cremekleurig, met klein bleekgeel centrum; kroonbladen iets overlappend. Bloeitijd juni tot oktober. Toevalsaailling.

***P. fruticosa* 'Mallows Pink'**

(Dr Barker, Hopleys, Engeland)

Bossige plant. Blad groen, middelgroot tot groot, met 5 deelblaadjes. Bloemen wit met bleekroze tint, middelgroot tot groot. Bloeitijd juni-oktober. Gevonden als toevalsaailling in de tuin van de winner. Lijkt op 'Glenroy Pinkie', maar met sterkere roze tint. Heeft ten opzichte van de meeste andere rozebloemige cultivars grotere bloemen.

***P. fruticosa* 'Milkmaid'**

(Hillier Nurseries, Ampfield, Engeland, 1960)

Kleine struik met opstaande, uitbuigende takken. Bladeren groen, met 3 tot 5 blaadjes. Bloemen crèmewit, plat, 2-5 cm breed, hangend in slappe trosjes.

***P. fruticosa* 'Maybe'**

(Cannon Hall, Bamsley, Engeland, 1996)

Bossige opgaande groeiwijze. Blad heldergroen, middelgroot tot groot, met 5 deelblaadjes. Bloemen heldergeel, met donkerder centrum. Bloeitijd vrij vroeg, mei-oktober. Zou qua blad beter zijn dan 'Katherine Dykes'.

***P. fruticosa* 'Ochroleuca'**

(L. Späth, Berlijn, Duitsland, voor 1902)

Hoog opgaande struik met groene bladeren en lichtgele, kleine bloemen.

***P. fruticosa* 'Orange Star'**

(Allan Robinson, Robinsons Hardy Plants ca. 1970)

syn. *P. fruticosa* 'Orange Stripe'.

Bossige plant met bleek roodbruine stengels. Blad groen, klein, met 5-7 smalle deelblaadjes. Bloemen heldergeel met oranje rand en/of tint, verkleurend naar bleekgeel, middelgroot tot klein, soms semi-gevuld. Bloeitijd juni-oktober. Zaailling van 'Tangerine'.

*P. fruticosa* 'Orange Stripe': ***P. fruticosa* 'Orange Star'**

***P. fruticosa* 'Pastel Pink'**

(?; voor het eerst genoemd door Hopleys Plants in 1990)

Bossige, kleine plant met relatief dikke roodbruine stengels. Blad grijsgroen tot zilvergrijs, met 5-7 deelblaadjes. Bloemen wit met lichte tint bleekroze, verkleurend naar wit. Bloeitijd juni-oktober.

***P. fruticosa* 'Penny White'**

(Alf Alford, Hilliers Nursery, Engeland, ca. 1965)

Grote bossige plant met roodbruine stengels. Blad dof groen, met 5 zeer brede deelblaadjes. Bloemen wit, klein; kroonbladen iets overlappend. Zeer bloeirijk. Bloeitijd mei-oktober. Selectie uit zaaisel van zaad verzameld in Gansu en Shanxi, West China. AGM (2002).

***P. fruticosa* 'Perryhill'**

(Perryhill Nurseries, Hartfield, Engeland, voor 1980)

Bossige plant. Blad grijsgroen, met 5(-7) brede deelblaadjes. Bloemen geel, komvormig, middelgroot tot groot; kroonbladen overlappen elkaar iets. Bloeitijd juli-september. Toevalsaailling, te vergelijken met 'Elizabeth'.

*P. fruticosa* 'Pink Dawn': ***P. fruticosa* 'Pink Glow'**

***P. fruticosa* 'Pink Glow'**

(Jack Drake, Inshriach, Schotland)

syn. *P. fruticosa* 'Pink Dawn'

Klein, bossig en breed spreidend. Blad dof groengrijs, met (6-)7 vrij brede deelblaadjes. Bloemen bleekgeel met roze tint, verkleurend naar bleekgeel. Bloeitijd juni-augustus. Bleek in RHS-trial behoorlijk meeldauwgevoelig.

*P. fruticosa* 'Purdomii': ***P. fruticosa* 'William Purdom'**



***P. fruticosa* ‘Rhodocalyx’**

(Verzameld in het wild, W.China)

Opgaande groeiwijze met dunne roodachtige takken. Bladeren groen. Bloemen wit, knikkend en iets cupvormig. De kelk is rood. Dit is een vorm van var. *davurica*, soms als var. *rhodocalyx* in de handel. De plant is van wilde origine; waarschijnlijk is er maar één kloon in omloop.

***P. fruticosa* ‘Rigida’**

(Proefstation voor de Boomkwekerij, Boskoop)  
Lage struik met opstaande takjes. Bladeren groen, matglanzend van boven, glanzend aan onderzijde, 3-talig. Bloemen botergeel, redelijk groot. Bloeit zeer laat maar niet rijk. Selectie van het Proefstation te Boskoop uit botanische soort uit Nepal, Himalaya.

***P. fruticosa* ‘Silver Schilling’**

(Tony Schilling, Engeland, na 1983)

Groeiachtige bossige plant. Blad opvallend zilvergrijs, middelgroot tot klein, met 5-7 deelblaadjes. Bloemen goudgeel met iets overlappende kroonbladen. Bloeitijd juni tot oktober. Geselecteerd uit zaad dat is verzameld door Schilling in Nepal in 1983. Verwant aan var. *arbuscula*.

***P. fruticosa* ‘Springwood Cream’**

(Springwood Nurseries, Almondsbury, Bristol, Engeland)

Bossige plant. Blad groen, met 5-7 zeer smalle deelblaadjes. Bloemen wit tot crèmekleurig. Bloeitijd juni tot September. Toevalzaailing van ‘Tilford Cream’.

***P. fruticosa* ‘Subalbicans’**

(Joseph Hers; selectie uit zaaisel van zaad verzameld in Gansu en Shanxi, West China)

Bossige middelgrote tot grote opgaande plant met open groeiwijze. Blad groen met 5 brede deelblaadjes. Bloemen wit, met iets overlappende kroonbladen. Bloeitijd juni-september. Komt waarschijnlijk uit hetzelfde zaaisel als ‘Hersii’ en ‘Snowflake’. Ten opzichte van deze twee cultivars heeft ‘Subalbicans’ grotere bloemen en iets meer overlappende kroonbladen.

***P. fruticosa* ‘Sunbird’**

(Lew’s Lakeshore Nursery, Salem, Verenigde Staten, 1994)

Gedrongen, opgaande groeiwijze met groene bladeren en kleine tot vrij grote, helder gele bloemen.

***P. fruticosa* ‘Sungold’**

(onbekende herkomst)

Bossige plant. Blad heldergroen, klein, met (5-)7 vrij smalle deelblaadjes. Bloemen heldergeel tot goudgeel; kroonbladen iets tot vrij duidelijk overlappend. Lijkt nog het meest op ‘Gold Drop’.

***P. fruticosa* ‘Teesdale Silver’**

(Wilf Simms, Engeland, 1996)

Grote opgaande plant. Blad blauwgroen, groot, met 6-7 lange en smalle deelblaadjes. Bloemen goudgeel, met losstaande kroonbladen. Geselecteerd vanwege de bladkleur en gevonden in het wild in de Teesdale-regio in Engeland.

***P. fruticosa* ‘Teesmaid’**

(Wilf Simms, Engeland, 1996)

Grote stijf opgaande plant. Blad blauwgroen, zeer groot, met 6-7 zeer lange en smalle deelblaadjes. Bloemen geel, met losstaande kroonbladen. Bloeitijd juni-september. Komt uit hetzelfde gebied als ‘Teesdale Silver’. Ten opzichte van deze laatste cultivar heeft ‘Teesmaid’ grotere bloemen en groter en groener blad.

***P. fruticosa* ‘Tridhem’**

(H. Bostrom, Tridhem, Denemarken)

Forse, opgaande struik met licht grijsgroen blad en lichtgele bloemen.

***P. fruticosa* ‘Waltonensis’: *P. fruticosa* ‘Walton Park’**

***P. fruticosa* ‘Walton Park’**

(geïntroduceerd voor 1955)

syn. *P. fruticosa* ‘Waltonensis’

Bossige plant. Blad donkergroen, met (3-)5 deelblaadjes. Bloemen goudgeel, met iets overlappende kroonbladen. Bloeitijd juli-augustus.

***P. fruticosa* ‘Wessex Silver’**

(Wessex Propagators, Engeland, 1986)

Bossige grote, breed opgaande plant. De stengels zijn sterk behaard. Blad zilvergrijs, met 5(-7) deelblaadjes. Bloemen bleekgeel met een iets donkerder centrum, verkleurend naar crèmekleurig. Bloeitijd mei-september. De plant is een zaailing van ‘Primrose Beauty’ en is gevonden door Wilf Simms. Ten opzichte van ‘Dart’s Cream’ is de groeiwijze meer opgaand en de bloemen zijn iets bleker, verkleurend naar crèmekleurig.

***P. fruticosa* ‘Whirligig’**

(Alf Alford, Hilliers Nursery, Engeland, 1969)  
Grote opgaande plant. Blad dofgroen, zeer groot, met 5 brede en iets gedraaide deelblaadjes. Bloemen heldergeel, verkleurend naar bleekgeel, met gedraaide kroonbladen die los van elkaar staan. Bloeitijd juni-september.

***P. fruticosa* ‘White Beauty’**

(herkomst onbekend)  
Bossige plant, middelgroot tot groot. Blad heldergroen, wit. Bloemen wit, groot, met losstaande kroonbladen. Bloeitijd juli-september.

***P. fruticosa* ‘Wickwar Trailer’**

(George Osmond, Wickwar Nurseries, Gloucestershire, Engeland)  
Liggende plant, minder breed dan ‘Medicine Wheel Mountain’. Blad groen, met 3-5 vrij brede deelblaadjes. Bloemen goudgeel, iets komvormig. Bloeitijd juni-augustus.

***P. fruticosa* ‘William Purdom’**

(William Purdom, 1911)  
(syn. *P. fruticosa* ‘Purdomii’)  
Hoge, breed opgaande struik. Blad klein, lichtgroen, met 5 deelblaadjes. Bloemen klein, bleek-

geel, met iets donkerder centrum. Bloeitijd mei-september. Volgens Kolster & Kromhout (2000) heeft deze cultivar weinig sierwaarde en blijkt vooral op arme en droge locaties goed te gedijen. Door de winner gevonden in Shensi (China).

***P. fruticosa* ‘Wychbold White’**

(Webbs, Wychbold, Engeland)  
Grote opgaande plant. Blad dofgroen, groot, met 5-6 deelblaadjes. Bloemen groot, wit; bloeitijd juni-september.

***P. fruticosa* ‘Yellow Gem’**

(Botanical Garden of University of British Columbia, Vancouver, Canada)  
Liggende plant; stengels rozerood. Blad grijs-groen, met 5-7 deelblaadjes. Bloemen zeer groot, heldergeel tot goudgeel, iets bleekgeel verkleurend; kroonbladen iets gefrommeld. Bloeitijd juni-oktober. Lijkt op ‘Medicine Wheel Mountain’, maar verschilt vooral vanwege de iets gefrommelde kroonblaadjes.

**Tabel:** Overzichtstabel van de positief gewaardeerde *Potentilla*'s

Cultivar	Hoog x Breed (cm)	Bladkleur	Bloem- diam.(cm)	Bloemkleur	Gezond heid	Opmerkingen
* ‘Abbotswood’	70 x 90	groen	3	wit	+ -	
S ‘Beesii’	50 x 50	zilvergrijs	2,5	goudgeel	+++	mooie bladplant
* ‘Dakota Sunrise’	40 x 80	(grijs)groen	3,5	(licht)geel	+	verbetering ‘Elizabeth’
** ‘Dart’s Golddigger’	45 x 70	(grijs)groen	4	goudgeel	++	beste gele bodembedekker
S ‘Daydawn’	50 x 80	groen	3	geel-roze	+	aparte bloemkleur
** ‘Elfenbein’	50 x 80	grijsgroen	3,2	(room)wit	+	groot blad; bodembedekker
* ‘Gold Drop’	80 x 80	lichtgroen	2	goudgeel	+++	klein blad
*** ‘Goldfinger’	80 x 90	groen	3	goudgeel	++	mooiste hoge gele
** ‘Goldkissen’	75 x 70	lichtgroen	2,2	goudgeel	+++	klein blad
* ‘Goldteppich’	50 x 70	(grijs)groen	3	goudgeel	+	groot blad
* ‘Grace Darling’	80 x 100	(grijs)groen	3	lichtroze	+	mooiste lichtroze
* ‘Grandiflora’	100 x 70	(licht)groen	3	geel	++	hoge stijve groeiwijze
** ‘Hopley’s Orange’	50 x 90	groen	2,8	oranje	+	meest oranje cultivar
* ‘Interma’ (DART’S CREAM)	40 x 80	grijsgroen	3,5	crèmekleurig	+	verbetering ‘Cream Carpet’
* ‘Janet’	30 x 60	groen	2,8	lichtgeel	+ -	compacte groei
* ‘Katherine Dykes’	90 x 100	(grijs)groen	2,5	(licht)geel	++	droogteresistent
* ‘Klondike’	60 x 60	groen	3	goudgeel	++	klein blad
*** ‘Kobold’	60 x 90	groen	3	goudgeel	++	zeer compacte groei
*** ‘Kupinpa’ (PINK PARADISE)	50 x 70	groen	3	roze	+	bloemen half gevuld

Cultivar	Hoog x Breed (cm)	Bladkleur	Bloem- diam.(cm)	Bloemkleur	Gezond heid	Opmerkingen
*** 'Limelight'	80 x 100	groen	3	witgeel	+++	sterk en rijkbloeiend
*** 'Living Daylight'	50 x 70	(donker)groen	2,2	(licht)geel	+	klein blad
* 'Longacre'	40 x 80	(grijs)groen	3	(licht)geel	+ -	verbetering 'Elizabeth'
** 'Maanelys'	90 x 100	grijsgroen	2,5	(licht)geel	++	compacte groei
** 'Manchu'	40 x 70	(zilver)grijs	2,5	wit	-	roodachtige stengels
** 'Marrob'	40 x 60	groen	2,8	(licht)rood	++	beste rode
(MARIAN RED ROBIN)						
** 'McKay's White'	70 x 100	groen	3	(room)wit	++	rijkbloeiend; niet zuiverwit
** 'Medicine Wheel Mountain'	20 x 80	(grijs)groen	2,8	goudgeel	++	platte groeiwijze
* 'Mount Everest'	100 x 90	groen	2,5	wit	++	mooiste hoge witte
* 'Orangeade'	60 x 80	groen	2,8	roodoranje	++	bloemkleur instabiel
** 'Pink Beauty'	60 x 60	groen	2,5	roze	++	bloemen enkel tot half gevuld
(LOVELY PINK)						
* 'Primrose Beauty'	80 x 80	grijsgroen	3	witgeel	+	grijsbladige 'Limelight'
S 'Purdomii Alba'	80 x 70	groen	2,2	wit	+ -	zeer donkere stengels
* 'Red Ace'	50 x 70	groen	3	oranjerood	++	bloemkleur vrij instabiel
** 'Red Lady'	40 x 60	(donker)groen	2,8	rood	-	meest rode cultivar
** 'Rheinsberg'	50 x 70	(grijs)groen	3	goudgeel	++	compacte groei
S 'Silvery Moon'	25 x 60	wit- tot geelbont	3	(licht)geel	+ -	klein blad
*** 'Sommerflor'	50 x 50	(grijs)groen	3	goudgeel	++	vruchtkelken rood
* 'Sunset'	50 x 90	groen	3	geeloranje	-	verbetering van 'Tangerine'
*** 'Uman'	50 x 60	(licht)groen	2,5	geeloranje	++	zeer compacte groei
(MANGO TANGO)						
* 'Vilmoriniana'	90 x 70	zilver(grijs)	3,2	roomwit	++	zeer mooie bladplant
** 'White Lady'	80 x 90	groen	3	wit	+	witter dan 'McKays White'
*** 'Yellow Bird'	80 x 80	(licht)groen	2,5	goudgeel	+++	bloemen enkel tot half gevuld

### Met dank aan

Wout Kromhout en Piet Kolster hebben met hun rapport in *Dendroflora 37* een belangrijke basis gelegd. Daarnaast is vooral *Potentilla*-kenner Piet Kolster nauw betrokken geweest bij het onderzoek. Hij verzamelde vrijwel de gehele collectie en hij deelde veel van zijn praktische kennis.

Het onderzoek werd gefinancierd door het Productschap Tuinbouw.

### Bronnen

BREARLEY, C. (1987): The shrubby *Potentillas* – *The Plantsman* 9: 90-109.

CULLEN, J. ET AL. (1995): *The European Garden Flora Vol. IV* – Cambridge University Press, 602 p.

ERIKSSON, T. ET AL. (2003): The phylogeny of Rosoideae (Rosaceae) based on sequences of the internal transcribed spacers (ITS) of nuclear ribosomal DNA and the trnL/F region of chloroplast DNA - *Int. J. Pl. Sci.* 164, p. 197–211.

FLORA OF CHINA (2012): *Potentilla* in online

database van “Flora of China”: [www.efloras.org](http://www.efloras.org) (Maart 2012)

GRIN (2012): Germplasm Resources Information Network (GRIN) – *Dasiphora* in online Database: [www.ars-grin.gov](http://www.ars-grin.gov). (Maart 2012).

HOFFMAN, M.H.A. (2010): *Naamlijst van houtige gewassen – Praktijkonderzoek Plant & Omgeving*, 8<sup>ste</sup> druk, 934 p.

JONG, DR. P.C. DE & KROMHOUT, W. (2004): *Darthuizer Vademecum* – 5de editie, 367 p.

KOLSTER, P. & KROMHOUT, W. (2000): *Potentilla fruticosa*, een overzicht van het sortiment – *Dendroflora 37*, p. 41-59

LAAR, H.J. VAN (1982): *Potentilla fruticosa* – *Dendroflora 19*, p. 29-44

MILLER, D. (2002): *Shrubby Potentilla* – Brochure RHS Wisley, 19 p.

### Ir. M.H.A. (Marco) Hoffman

Wetenschappelijk onderzoeker sortiment / taxonomie bij Praktijkonderzoek Plant & Omgeving (PPO Bomen), Lisse



### Summary

*Potentilla fruticosa* L. (Shrubby Cinquefoil) is an easy plant to grow, with a long flowering season, often from late spring to late summer or autumn. Besides the natural yellow or white flowers new cultivars have been released with red, pink and orange flowers. Also the health has been improved. This has given a large impulse to this crop. At the moment about 150 cultivars are known. About 80 of those have been tested at two locations. The 80 cultivars chosen were new ones, supplemented with standard cultivars and good reference cultivars. The plants have been described and rated for utility value by PPO. The KVBC judged them by awarding stars. 42 Cultivars received a positive rating: 17 had one star, 13 had two stars and 8 had three stars. Four cultivars received an "s", meaning suitable for special purposes. After the Dutch trial, also in England and Germany trials have been conducted, independently of each other. The results of these trials have also been indicated in this article. Besides the full descriptions and ratings of the 80 cultivars, this article also presents a list of additional cultivars with short descriptions. These were based on literature research.