



Aan de hand van voorbeelden uit hun dagelijkse praktijk schrijven drie dierenartsen over diergezondheid in de vleesveehouderij. Om en om beschrijven John Campe, Piet De Meuter en René Bemers maandelijks vastgestelde ziektebeelden, uitgevoerde behandelingen en/of mogelijke preventiemaatregelen.

Een verwonde tong kan snel helen

Kwetsuur aan de tong


Een vleesveehouder uit mijn praktijk had zijn koeien begin vorige week uitgeweid op een gehuurde weide. Het was dus voor het eerst dat deze veehouder hier dieren liet lopen. De weide was onverzorgd achtergelaten.

Drie dagen na het uitweiden had de veehouder bij een controleronde een van zijn zoogkoeien terug uit de weide gehaald. Omdat de koe opvallend veel bloed aan de muil had, nam hij meteen met mij contact op.


Bij nader onderzoek van de koe was meteen te zien dat het dier zich verwond had aan de tong. Op de een of andere manier had het dier aan een stuk prikkeldraad gelikt. Het stuk prikkeldraad was zo rond de tong gesnoerd, waardoor een groot stuk van de tong was afgescheurd. Het afgescheurde deel hing nog met een klein vliesje vast.

In het geval van een verse wond kan geprobeerd worden het afgescheurde stuk te hechten. Het afgescheurde deel van de tong was in dit geval niet meer te redden. Het dier werd daarop op haar zij gelegd en met behulp van een plaatselijke verdoving besloot ik de achterblijvende wond te hechten. Met behulp van de nodige pijnstillers en ontstekingsremmers kon het dier aan haar herstelperiode beginnen.

Na afloop van de operatie kon het dier de eerste dag nog niet eten van de pijn. Na enkele dagen begon het dier langzamerhand toch weer meer voer op te nemen en inmiddels is de wond volledig hersteld. Door het ontbreken van het stuk tong kan het dier nu niet meer uitgeweid worden. Het dier kan wel nog afgemest worden.



De encyclopedie **operatie aan de tong**



De tong is een spierweefsel dat sterk doorbloed is. Een wond aan de tong kan daarom een opvallend bloedverlies veroorzaken maar ook weer snel genezen.

Het opereren van een tong is geen gangbare ingreep. Af en toe gebeurt een ingreep aan de tong om pinken te verhinderen nog aan elkaar te zuigen. Door een operatie aan de tongbasis wordt in dat geval de tongspier in vorm

aangepast. De tong kan in dat geval geen gleuf meer maken om te zuigen, maar is dan bovenaan rond. Het dier kan dan wel nog eten, maar niet meer zuigen.

Bij een operatie aan de tong wordt het dier op haar zij gelegd, de tong wordt met een knelband vastgelegd en met behulp van een plaatselijke verdoving kan de ingreep plaatsvinden. Een operatie veroorzaakt een opvallend bloedverlies, maar de tong geneest snel. Na een dag kan het dier meestal alweer voer opnemen.

Verwonden van de tong kan alleen door preventie vermeden worden. Bij het uitweiden is het dus belangrijk dat de weide schoon is, dat er geen vreemde voorwerpen rondslingeren en dat contact met scherpe voorwerpen is uitgesloten.