

## Parasieten bij rundvee: 10 tips

Samen met u werkt de GD rond de zomer extra hard aan de bestrijding van parasieten als (long)wormen en leverbot. Preventie en behandeling zijn niet eenvoudig. Onnodig behandelen kan ten koste gaan van de weerstandsofbouw en kan resistentie van de wormen in de hand werken. Een beweidschema, mest-, bloed- en/of tankmelkonderzoek en een behandelplan, kunnen veel problemen voorkomen. Hierbij 10 tips in de strijd tegen parasieten:

1. Schaar het jongveekoppel niet te vroeg in het jaar uit, maar maai de percelen eerst.
2. Doe mestonderzoek na 6 - 8 weken weiden en stel alleen indien nodig een behandeling in.
3. Dieren kunnen een worminfectie hebben zonder dat ze last hebben van diarree.
4. Bij vleesvee dat op een standweide gehouden wordt: volwassen dieren ontwormen vóórdat ze de weide in gaan.
5. Een gericht advies voor het veilig weiden van jongvee krijgt u door op onze website de 'wormsleutel' in te vullen.

Zie: [www.gddeventer.com/rund](http://www.gddeventer.com/rund) -> diergezondheid -> dierziekten -> maagdarmswormen.

6. Tegen longworm kunt u preventief vaccineren vóórdat de koppel de wei in gaat. Ook bij nieuw aangevoerde dieren of bij de start van het weiden na permanent opstallen kan vaccinatie zinvol zijn.
7. Neem bij het optreden van klachten als hoesten, onvoldoende groei en productiedaling altijd contact op met uw dierenarts.
8. Zorg dat de dieren leverbot-vrij de weide ingaan.
9. Breng de risicovolle percelen op uw bedrijf in kaart (leverbotkartering).
10. Zorg voor goede afwatering (drainage) of afrastering van mogelijk risicovolle natte stukken land.

In de onlangs verschenen nieuwsbrief 'Worminfecties bij rundvee' (zie [www.gddeventer.com/rund](http://www.gddeventer.com/rund)) vindt u meer tips en praktische informatie over longwormen, maagdarmswormen en leverbot.



*Een gericht advies voor het bestrijden van infecties met maagdarms- en longwormen bij jongvee krijgt u door het invullen van de 'wormsleutel' (zie tip 5).*