


Cauliflorie

[416.17]

Th. C. OUDEMANS

Op de Algemene Ledenvergadering in oktober te De Steeg, gaf ik enkele zo geheten mededelingen uit wetenschap en praktijk, waarbij als bijzonderheid een geval van cauliflorie aan *Larix laricina* K. Koch kon worden gedemonstreerd, waarbij ik de navolgende toelichting heb gegeven. Op verzoek laat ik deze hier volgen.

Van de in het oostelijk gedeelte van Noord-Amerika groeiende en aldaar grote bossen vormende *Larix laricina* K. Koch werd toen de hier gegeven foto getoond van de top van een op Schovenhorst staand jong exemplaar, waarbij het merkwaardige is dat zich een gedeelte der kegels langs de stam bevindt en aldaar volkomen tot ontwikkeling is gekomen. Dit is een geval van „cauliflorie”, hetgeen volgens prof. Hellinga bij enkele tropische loof- en naaldhoutsoorten voorkomt. Noch bij hem, noch bij mij was dit bij in Nederland groeiende coniferen bekend. Prof. Venema deelde desgevraagd mede: „Wat de cauliflorie betreft, daarover is in de literatuur maar weinig bekend. Ik vond de volgende opgave: P. Jaccard: „Ueber Fruchtbildung und



Larix laricina K. Koch

