

in mindere mate — ook in de Corsicaansche dennenbosschen, als gevolg van de dichte kronen, spoediger dan in grovedennenbosschen ontstaat, alsmede aan de vermelde bodemhegemonie van de *Carex arenaria*. Deze plant woekert in hoofdzaak in de gevormde humuslaag en de bovenste bodemlagen en zuigt met meterslange strengen, waaruit steeds weer nieuwe plantjes ontstaan, den grond uit.

Bovenvermelde resultaten hebben er toe geleid proeven te nemen met gewaterde bolsterturf en hoewel hiermede reeds bevredigende resultaten zijn bereikt, is de tijd van proefneming nog te kort om daarover een definitief oordeel uit te spreken.

Zooals de stand van onze kennis van den boschbouw op de Waddeneilanden thans is, kan ik samenvattend concludeeren, dat voor het verkrijgen van loofhout- of sterk met loofhoutgemengde bosschen de twee zekerste werkwijzen zijn: direct bij den aanleg naar rationeele mengingen te streven en, waar het reeds bestaande zuivere *Pinusbosschen* van 4—12 jaar betreft, tusschenbeplantingen op gewaterde bolsterturf uit te voeren.

(Wordt vervolgd).

---

## UIT DE DAGBLADEN.

Algemeen Handelsblad, 23 Juli 1934.

### BEBOSSCHINGSPLAN OP GROOTE SCHAAL.

*Ter bestrijding der droogte.*

NEW YORK, 21 Juli (Reuter.) Om een herhaling der ontzettende „droogte” te voorkomen, zal men, naar de minister van landbouw Wallace mededeelt, een groot bebosschingsprogram tot een bedrag van 75 mill. dollar uitvoeren, waarmee men terstond zal beginnen. Er zal een boschgordel worden aangelegd van de Canadeesche grens door Noorden Zuid-Dakota, Nebraska, Kansas, Oklahoma en Texas tot aan de Mexicaansche grens.

---