



Figuur 1 Totale opbrengst +35mm (relatief) in functie van de sortering marktbaar +50mm van de beproefde frietaardappelen - Bron: LCA 2011

vastkokende aardappelrassen voor de versmarkt. Nicola werd als standaardras genomen. Ook Cilena is een veel geëeld ras. Het werd als tweede referentieras opgenomen in Tongeren.

In Tongeren waren de onderwatergewichten aan de lage kant terwijl ze in Tongeren eerder hoog waren. Gemiddeld haalden alle rassen de minimumnorm, behalve Erika, doordat dit ras ook in Tongeren maar nipt

de norm haalden. Dit ras had ook het hoogste percentage droppers (3%). De blauwgroene behouding heel wat hoger in Tongeren dan in Dentergem.

Tabel 3 geeft de relatieve opbrengsten (30 mm en tussen 30 en 60 mm weer in vergelijking met het referentieras Nicola. Alexa, gevolgd door Artemis en Alexandra voeren het peloton aan. Artemis liet zich wel in negatieve zin opmerken met een enorm laag percentage verkoopbare opbrengst (52%). ■

Dit artikel is een bewerking van het artikel: 'Opbrengst en kwaliteit van halfvroeg en late rassen' van Veerle De Blauwer, Inagro (PCA); Annie Demeyere, ADLO; Patrick Vermeulen, VTI Poperinge; Dirk Martens, LTC Waasland & Dieter Cauffman, PIBO Tongeren. De volledige resultaten, inclusief een bespreking van de prestaties van elk ras apart, vind je op het afgesloten ledengedeelte van de Boerenbondwebsite, www.boerenbond.be/mt.