

# PRUIMESPINSELMOT

## Levenswijze

De geelachtig grijsgroene rupsen van deze spinselmot verblijven in groepjes bij elkaar in spinsels op de bomen. Deze spinsels zijn veel groter dan die van de appelspinselmot en soms is de gehele boom er mee bedekt. In het begin van de zomer verpoppen de rupsen en de cocons hangen, afzonderlijk van elkaar in het spinsel, dat tegen velerlei gevaren bescherming biedt. Later in de zomer komen de vlinders uit, waarna de wijfjes op de takken eitjes afzetten. Deze eitjes liggen als dakpannen over elkaar en worden, na gelegd te zijn, door het vlindertje met een snel verhardende wasachtige afscheiding bedekt. De in de herfst uitkomende rupsen overwinteren onder dat beschermende laagje.



### Pruimespinselmot

1) Spinselmot, werkelijke grootte; 2) oudere rupsen, vretend aan een blad; 3) poppen in spinsel; 4) afgezette eitjes; 5) spinsel met jonge rupsen op scheut van pruimeboom; 6) volwassen rups, werkelijke grootte.

### Pruimemotje

7) Vlinder, vergroot; 8) rups, vergroot; 9) aangetaste pruimen met gomachtige druppels bij de boorgang; 10) rups in vrucht.

## Schadebeeld

De vruchtzetting wordt nadelig beïnvloed, omdat de uitlopende knoppen en bladeren tot voedsel voor de rupsen dienen. Bij ernstige aantasting kunnen de pruimebomen geheel kaal worden gevreten.

## Bestrijding

U kunt tegen de pruimespinselmot spuiten maar beter is om zoveel mogelijk spinsels weg te halen als deze verschijnen.

