

# Allium kan bloeien in zomer, voor- of najaar

**De meeste Alliumsoorten zijn voorjaarsbloeiers. Enkele die in het voorjaar worden geplant, bloeien in de zomer en het najaar. Tot het geslacht horen soorten die uitermate geschikt zijn voor verwildering, lage en hoge soorten en planten die in groepen bij elkaar moeten worden gezet.**

## Folkert Aleva

De Allium is vooral bekend uit de keuken. Tot het geslacht behoren ook de eetbare soorten ui, prei, bieslook en knoflook. Zowel de nutsplanten als de voor sier toe te passen soorten kenmerken zich door de uiegeur die vrijkomt bij kneuzing. Het geslacht behoort tot de familie der Liliaceae en telt 500 tot 600 soorten. Deze komen voor over het gehele noordelijk halfrond, in Afrika en Azië.

De bloemkleur varieert van wit, diverse tinten roze naar rood, paars en blauw. Maar er zijn ook soorten met geel-groene tot heldergele bloemen. De bloeiwijze bestaat uit veelbloemige, ronde schermen — bij voorbeeld *Allium christophii* — of hoofdjes met hangende bloempjes, zoals bij *Allium narcissiflorum*. De bloeitijd is van het voorjaar tot in de herfst.

## Late bloeiers planten in het voorjaar

De meeste Alliumsoorten hebben een bol, maar sommige — bij voorbeeld *Allium cyathophorum* — hebben een wortelstok. De bladeren kunnen smal, lijnvormig of breed lancetvormig zijn. Meestal zijn ze glad, soms behaard. Een nadeel is dat de bladeren al tijdens de bloei afsterven.

De beste tijd om de bollen uit te planten is in de periode half september tot half november. De zomer- en herfstbloeiers kunnen in het voorjaar in de grond worden gezet. Soms wordt geadviseerd om dan potplanten te gebruiken. De grote bollen worden dan zo'n 10 centimeter diep geplant, met een plantafstand van 10-15 centimeter. Bij kleinere bollen of wortelstokken kan worden volstaan met een plantdiepte van 5 centimeter en een onderlinge afstand van 5 tot 10 centimeter.

Als het loof is afgestorven, kan de kluit bollen worden gerooid. Deze kunnen, indien ze uit elkaar zijn gehaald, worden

bewaard om het volgend seizoen weer uit te planten. Sommige soorten maken broedbolletjes in de bloem, op deze wijze vermeerderd de plant zichzelf. Alliumsoorten met een wortelstok kunnen worden gescheurd in het voorjaar. Ook zaaien is mogelijk. Het duurt dan twee tot drie jaar voordat men nieuwe bloeiende planten heeft.

## Op schaduwrijke plaatsen

Alliumsoorten lenen zich voor diverse toepassingsdoeleinden, al naar gelang hun specifieke eigenschappen. Onder bomen en struiken, in een humusrijke wat vochtige grond of aan de bosrand zijn goed *Allium triquetrum*, *Allium ursinum* en *Allium moly* te gebruiken. *Allium triquetrum* wordt 20 tot 30 centimeter hoog, bloeit met witte bloemen, die een groene middennerf hebben. De bloeitijd is april-mei. Deze soort is eventueel geschikt voor verwildering, maar is vorstgevoelig. Afdekken in de winter is noodzakelijk.

*Allium ursinum* is de bekende inheemse daslook. De plant wordt 40 centimeter hoog. De bloeiwijze is een rijkbloemig, wit scherm, die in mei-juni verschijnt.

Deze Allium verspreidt een sterke uiegeur waarop niet iedereen is gesteld. Op voedselrijke gronden kan de daslook een plaag worden en andere planten verdringen. De *Allium ursinum* is te combineren met bij voorbeeld *Symphytum grandiflorum*. De in het wild voorkomende plant is in Nederland beschermd.


## In de volle zon

Een goed gedraineerde grond en een standplaats in de volle zon vragen de soorten *Allium karataviense*, *Allium oreophilum*, *Allium christophii* en *Allium giganteum*. Deze soorten kunnen worden gecombineerd met *Iris germanica*-hybriden, *Papaver orientalis*-hybriden en hoge *Sedum*soorten.


*Allium karataviense* wordt 20 centimeter hoog. Het blad is tongvormig en glimmend grijs. De bloem verkleurt van lichtroze naar bijna wit; de plant bloeit in april-mei. Ook de vruchten hebben sierwaarde.

*Allium oreophilum* wordt 20 tot 30 centimeter hoog. De bloeitijd is april-mei, de bloemen zijn donkerroze.

De hogere soorten zijn: *Allium christophii* en *Allium giganteum*. Eerstgenoem-



*Allium giganteum* is een typische zomerbloeier en is een van de hoogste soorten



*Allium sphaerocephalon* is een bekende snijbloem. Bij deze soort is ook de bloematengel van bladeren voorzien

de wordt 60 centimeter hoog. De bloemen staan met wel 80 stuks in een bol bijeen die een doorsnede van 15 centimeter kan hebben. De kleur is blauw-violet. Na de bloei, in juni-juli, verlept deze bloeiwijze niet. Het blad van deze soort is behaard.

*Allium giganteum* is eveneens een typische zomerbloeiër. De plant wordt 150 centimeter hoog, de bloeiwijze heeft een

doorsnede van circa 20 centimeter. De bloei is in juni-juli en de kleur is paars-rose. In de winter moet *Allium giganteum* worden beschermd.

### In grote groepen

Er zijn echter ook andere soorten die minder kieskeurig zijn wat hun groeiplaats betreft. Zij moeten bij voorkeur in

grote groepen worden geplant om goed tot hun recht te kunnen komen.

*Allium cirrhosum* is één hiervan. De hoogte bedraagt 60 centimeter. De bloei valt in de maanden juli en augustus.

Deze soort is geschikt voor verwildering, maar kan een plaag vormen.

Eveneens geschikt voor verwildering is *Allium moly*. De bloemkleur is geel. De bloempjes staan met 40 stuks bij elkaar maar vormen geen bol. De bloeitijd valt in mei-juni.

*Allium caeruleum* wordt maar 30 centimeter hoog en bloeit met helderblauwe bloemen in juni-juli.

*Allium flavum* bloeit, zoals de soortnaam aangeeft geel. De bloei vindt plaats in mei-juni. De hoogte wordt 60 centimeter. De bloempjes hangen enigszins. De soort zaait zichzelf gemakkelijk uit.

*Allium narcissiflorum* wordt maar 20 tot 40 centimeter hoog. De kleur van de bloempjes is lila-rose; de bloeitijd: juni-juli. De bloemen zijn klokvormig en staan met twee tot tien stuks bijeen. Eerst hangen zij en later richten zij zich op.

### Overige soortjes

*Allium neapolitanum* kenmerkt zich door een driekantige steel, die zo'n 30 centimeter hoog wordt. Daarop staan de bloempjes met 15 tot 30 stuks bij elkaar. De bloeitijd is april. Deze soort is niet geheel winterhard en moet worden beschermd.

Van de *Allium pulchellum* staan de bloemen op 60 centimeter lange stelen. De bloempjes hangen en zijn in het begin rood-paars van kleur. De bloei vindt plaats in juli-augustus.

*Allium roseum* heeft behaarde bladeren. De bloeistengels worden eveneens 60 centimeter hoog. De bloemen staan in een bolvormige bloeiwijze en zijn klok- en stervormig. De kleur is roze-rood en de bloeitijd valt in juni-juli.

Tot slot de bekende *Allium sphaerocephalon*. Als bijzonderheid van deze soort is te melden dat ook de bloeistengel van bladeren is voorzien. Deze stengel wordt ongeveer 80 centimeter hoog. De bloemen zijn klokvormig en paars van kleur.

**Het sortiment *Allium* biedt volop mogelijkheden voor toepassing; reden om de soortjes te proberen. Wat betreft de bloeitijd kunnen we de soorten onderscheiden in voorjaars- en zomer/herfstbloeiërs. De laatstgenoemde soorten moeten in het voorjaar worden geplant.**



De meeste *Allium*soorten verlangen een zonnige standplaats. *Allium moly* met gele bloempjes is daarentegen in groepen onder bodem en struiken toe te passen