

DR. H. C. D. DE WIT **het genus *Cryptocoryne* 6**

Cryptocoryne en *Lagenandra* (2de gedeelte)

Een andere soort *Lagenandra* ontving ik in 1957, door tussenkomst van de heer Liet, Airfish, Amsterdam. Het was een fraaie plant, die bloem en vrucht droeg en zeer veel kleiner was dan *L. ovata*. Hier volgt de beschrijving (zie ook fig. 1). Een stevige, sterk vertakte wortelstok draagt dikke witte wortels en rozetten van vrij stijve, enigszins leerachtige, langwerpige, 10-15 cm lange en tot 5 cm brede bladeren. Bladsteel stevig, met brede schede. Bladschijf met lang toegespitste top en afgeronde voet, de rand smal lichtgrijs gebied, golvend.

Spatha rechtop, weinig gedraaid en stomp tot sterk gedraaid en spits (vgl. fig. 1 a en 1 t), 5-7 cm lang, fluwelig glad en dof groen tot purper van buiten, donker glanzend purper van binnen. Meeldraden 50-100 (fig. 1 b, c, d, e). Vruchtbeginsels ± 40 , in 4-5 spiralen, met 1-4 (fig. 1 k) op de bodem ingeplante eitjes (fig. 1 m). Verzamelvrucht bolvormig (fig. 1 n), met 1 of 2 zaden per hok (fig. 1 p). Zaad ribbelig (fig. 1 r). Hier leverde de determinatie geen moeilijkheden op: *Lagenandra thwaitesii* Engler.

Lagenandra thwaitesii Engl. Opname vervaardigd in de Kas Laboratorium Plantensystematiek en -geografie, Wageningen. Juni 1958





