

gezondheid

Ramlammeren aan de voerbak.
Aanvankelijk gaf de jonge schapenhouder te veel krachtvoer.



Lammeren afmesten

Een jonge beginnende schapenhouder verloor meerdere lammeren tijdens het afmesten voor het islamitisch offerfeest vorig jaar november. Enkele rammen konden nog gered worden, maar al met al moest Kenny flink leergeld betalen.

TEKST: DR. NORBERT STEURBAUT (DIERENARTS IN NEDERHASSELT, BELGIË), ILLUSTRATIE: ELS VAN DEN BERG

De afmestperiode was al begonnen toen ik eind september werd opgeroepen vanwege sterfte onder de eerste groep aangekochte rammen van Kenny. Opvallend aan het dode ramlam was dat zijn oogslimvlies spierwit zag en hij geen diarree had. Zijn wol was dor en hij oogde zeer mager. Ook de andere rammen van dezelfde herkomst waren mager, enkele vertoonden bleke oogslimvliezen. Maar hun eetlust was zeer goed. Dit koppel had duidelijk een Haemonchus-infectie. De hele groep werd ontwormd met Cydectin 0,1%. Het lichaamsgewicht werd ruim geschat voor de juiste dosis van 1 ml/5 kg LG. De wachttijd is veertien dagen voor afleveren. Alle overige rammen werden bij aankoop en aankomst ontwormd en dit tot drie weken voor het slachten. Het sterfteprobleem door wormen stopte.

Toch moest Kenny opnieuw een sterfgeval melden. Een prima zware Blauwe Texelaarram lag plotseling dood. Sectie wees uit dat hij getroffen was door 'het bloed' (enterotoxaemie). Dit koppel rammen was inderdaad niet gevaccineerd met Covexin, Bravoxin, Miloxan of Heptavac. Dit is dikwijls een financiële keuze, toch kan men beter wel vaccineren want de dood van een goed lam kost veel meer dan de enting.

De problemen waren nog niet voorbij. Door het geven van te veel krachtvoer kwam het regelmatig tot pensverzuuring (pensacidose). Gelukkig kon de voedingsfout vlug onderkend en aangepakt worden.

Slechts één ram kreeg last van urinestenen. Door het aanhangsel aan de penis af te knippen kon hij opnieuw urineren. De verstopping van de urinebuis was ontstaan door een rantsoen dat te veel graan (gerst) bevatte.

Verder leidde het bij elkaar zetten van diverse rammen tot hevige vechtpartijen. Enkele dieren kregen hierdoor evenwichtsproblemen. Door een betere selectie en inperken van de bewegingsruimte bleef de schade beperkt.

Af en toe vond Kenny een ram op zijn rug, zelfs op stal. Gelukkig niet dood. Regelmatige inspectie was dus geen overbodige luxe. Eén ram heb ik snel laten inslapen. Hij had in ernstige mate gewrichtsontsteking met zeer hoge koorts. De linkerknie voelde zeer warm aan en was sterk opgezet. Ook een ander gewricht (voorknie) toonde een duidelijke verdikking en voelde warm aan. Behandeling had geen zin. Bij de autopsie werd na het insnijden van de gewrichten de geelgroene etter waargenomen. Gelukkig kwam het niet tot een uitbraak van zere bekjes of erge rotkreupelproblemen.

Kenny moest een reeks problemen het hoofd bieden en leerde snel. Hij had meerdere partijen dieren gekocht, waarvan hij de voorgeschiedenis niet kende. Preventief enten en goed ontwormen voorkomen sterfte. De dood van één ram kost meer dan de nodige behandelingen. Uiteraard voorkomt een uitgebalanceerd rantsoen veel voedingsgerelateerde aandoeningen. <<