

Mogelijke strategieën in de aanpak van paratuberculose in de melkgeitenhouderij

# Lancering Paratbc Wijzer

## Managementmaatregelen om het besmettingsmoment te voorkomen en/of uit te stellen (ongeacht mate van aanwezigheid)

Gesloten bedrijfsvoering.  
 Lammeren schoon opvangen.  
 Gescheiden opfok, eventueel op andere locatie.

Kunstijs, koeienbiest (van paratbc verantwoorde bedrijven), geitenbiest. Alleen biest eerstejaars geiten. Biest pasteuriseren/testen/fractioneren/invriezen. Handschoenen aan bij biest-verstrekking lammeren.

Hygiëne maatregelen specifiek bij lammeren:

- Looplijnen (schone weg-vuile weg):

- Jong → oud
- Kruislijnen vermijden
- Kinderen/huisdieren

- Kleding (laarzen, overall)
- Groepsindeling/leeftijdsscheiding
- Sanitair/schoonmaak apart
- Ongedierte-/gevoegtelbestrijding
- Melken naar leeftijd
- Hygiënecheck

Dekbokken 'doorschuifplan'; jonge bokken bij lammeren laten dekken, bokgroepen naar leeftijd scheiden (eerste- en verdere dekkingen) en niet in de lammerstal huisvesten.


Schoon, droog voer verstrekken. Voorkom mest in waterbakken en voergang. Restvoer niet aan lammeren voeren.

Bij hoge besmetting: nieuw koppel opstarten.

<sup>1</sup> Vraag bij aankoop altijd naar de mate van aanwezigheid van paratbc.

<sup>2</sup> Vaccineer de lammeren éénmalig zo vroeg mogelijk (zie bijsluitervaccin).

<sup>3</sup> Het resultaat is afhankelijk van de gebruikte test en de bijbehorende betrouwbaarheid.



Op 12 september 2013 werd tijdens de Nationale Melkgeitenhouderijdag de Paratbc Wijzer gelanceerd: een handige hulpmiddel van de melkgeitenhouder voor de melkgeitenhouder in de strijd tegen paratbc.

De Paratbc Wijzer is één van de resultaten van het project "Paratuberculose in de melkgeitenhouderij". Binnen dit project zijn op twintig bedrijven aanvankelijk van vijftig geiten per bedrijf bloed-, melk- en mestmonsters verzameld en onderzocht met de beschikbare paratbc-testen voor runderen. Duidelijk werd dat deze testen ook geschikt zijn voor gebruik bij geiten. Er waren bedrijven waarbij na onderzoek geen aanwijzingen gevonden zijn voor paratbc, bedrijven met een lichte tot matige besmetting en een enkel bedrijf met een aanzienlijke besmetting. De deelnemende melkgeitenhouders hebben

in studiegroepen veel werk verzet en gezamenlijk een voorzet gemaakt voor de Paratbc Wijzer.

## Doe er uw voordeel mee

Het inschatten van de mate van aanwezigheid van paratbc op uw bedrijf is een gevoelskwestie; er zijn geen getallen of vaste methoden aan verbonden. Melkgeitenhouders die willen weten of paratbc in het koppel voorkomt, hoeven alleen een deel van de verdachte dieren te testen. Voor wie wil weten hoévél paratbc er onder het koppel voorkomt is een aselechte steekproef een betere methode. Bedenk wel dat de uitkomst een onderschatting is van de werkelijkheid. Onafhankelijk van de mate van aanwezigheid van paratbc kunnen verschillende maatregelen genomen en/of strikter nageleefd worden om besmetting te voorkomen en/of uit te stellen. De Paratbc Wijzer geeft daar diverse mogelijke strategieën voor. Managementmaatregelen vormen de kern, maar daarnaast is er een aantal adviezen ten aanzien van het graslandmanagement, het testen en afvoeren van dieren.