

WERKING BLADSCHIMMEL- WAARSCHUWINGSDIENST

Ook dit seizoen is de bladschimmelwaarschuwingsdienst weer actief. Deze waarschuwingsdienst van IRS, agrarische dienst van Suiker Unie, gewasbeschermingsmiddelenhandel en adviesorganisaties geeft een waarschuwing zodra bladschimmels in een bepaalde regio in suikerbieten zijn gevonden. Het betreft een waarschuwing om de percelen te gaan controleren of er een bestrijding nodig is. De eerste bladschimmelvlekjes op uw eigen perceel zijn de aanleiding voor een bespuiting met fungiciden.

De bladschimmelwaarschuwingsdienst geeft een waarschuwing wanneer op twee percelen in een bepaalde regio bladschimmels zijn gevonden. Deze vondsten worden geverifieerd door IRS-Diagnostiek. Daarna gaat een waarschuwing uit voor het betreffende gebied. De telers krijgen dan een sms met de waarschuwing dat in hun regio bladschimmels in suikerbieten zijn gevonden. Dit is een waarschuwing en oproep om de percelen te controleren. In veel gevallen is het te vroeg om direct na het ontvangen van de sms op de spuit te stappen. Pas als er bij een gewascontrole een aantasting wordt gevonden, is het advies om een bestrijding uit te voeren.

Bestrijding bladschimmels

De eerste behandeling tegen bladschimmels moet plaatsvinden bij het verschijnen

van de eerste aantasting (de eerste gevonden vlekjes op het perceel) door cerco-spora, stemphylium, ramularia, roest of meeldauw. Controleer de bieten daarom regelmatig (wekelijks) vanaf half juni of na een waarschuwing van de bladschimmelwaarschuwingsdienst.

Preventief spuiten heeft geen zin, brengt onnodige kosten met zich mee en is zelfs gevaarlijk in verband met resistentievorming. Later spuiten dan de eerste aantasting leidt al snel tot onvoldoende beheersing en daardoor tot schade. Ook in verband met resistentievorming is te laat spuiten gevaarlijk.

Werking middelen

De toegepaste middelen werken drie tot vier weken op geraakt blad. Bladeren of gedeeltes van bladeren die niet geraakt zijn of gevormd worden na een bespuiting zijn onbeschermd. Dit betekent dat wan-



Aantasting door bladschimmels kost opbrengst in alle rassen. Voer bij de eerste aantasting op uw perceel een fungicidenbespuiting uit om geen opbrengst verloren te laten gaan.



De regio's in de bladschimmelwaarschuwingsdienst. Dit kaartje wordt na elke waarschuwing bijgewerkt op www.irs.nl/bladschimmel. Wanneer er een bladschimmelwaarschuwing voor een gebied is uitgegaan wordt deze regio rood gemarkeerd. Klikken op de regio geeft een tekstballon met meer informatie.

neer er veel nieuw loof wordt gevormd er na een bespuiting sneller (na 1 à 2 weken) opnieuw moet worden gecontroleerd op uitbreiding of nieuwe aantasting door bladschimmels. Dit geldt vooral na bespuitingen vóór de maximale hoeveelheid loof van de bieten is gevormd (loof maximum eerste helft augustus).

Meer informatie over bladschimmels, middelen en de actuele waarschuwingen van de bladschimmelwaarschuwingsdienst vindt u op www.irs.nl/bladschimmel.

Bram Hanse