

Hoe hou ik mijn bedrijf weekhuidmijt-vrij?

START PROPER

Ontsmet indien mogelijk het veld: mijten kunnen van een geïnfecteerde bodem naar de planten klimmen.

Chloorhoudende producten? Vergeet de wachttijd niet!

BLAAS MIJTEN NIET IN HET ROND

Bij afblazen op de transportband kunnen mijten van de planten geblazen worden. **Denk goed na over de positie van de compressor en vang het afval bij voorkeur op.** Om infectie via besmet gereedschap te minimaliseren neem je risicopartijen als laatste onder handen.

BEKIJK GEVOELIGE CULTIVARS EERST

Cultivars kunnen verschillen in gevoeligheid voor weekhuidmijten. Spoor infectie snel op door de gevoeligste cultivars extra in het oog te houden.

GEBRUIK EEN MICROSCOOP

Weekhuidmijten zijn **niet zichtbaar met het blote oog**. Neem regelmatig stalen van topstekken en bekijk deze onder de microscoop of vraag hulp aan je teeltbegeleider, PCS of ILVO-Diagnosecentrum voor Planten.


RAAK ZE ALLEMAAL

Warm of koud, nat of droog ... Je vindt steeds ongeveer de helft van de mijten terug op de topstekken, de rest zit dieper in het gewas. Spuit daarom **zo diep mogelijk** in het gewas.

Zware aantasting? Verwijder eerst de topstekken (insnijden zonder hergebruik stekken) vooraleer je behandelt.

BEHANDEL NIET (ENKEL) LOKAAL

Wanneer je schade op een plant ziet, zitten de meeste mijten al **verspreid over de omringende planten** (= na-ijlend schadebeeld). Behandel ruim (> 3m) rondom de infectiebron.



LAAT MIJTEN NIET VALLEN

Verplaats geïnfecteerde planten in een zak of bak want mijten kunnen makkelijk van de plant vallen.

ZET MIJTEN IN DE KOU

Zet jij je planten voor de forcerie-fase in de 3°C-frigo? Controleer dan eens of de werkelijke temperatuur 3°C of kouder is, zo profiteer je ervan dat **veel weekhuidmijten bewaring onder 3°C niet overleven**.

Opgelet! In de stekdoos is het al snel 0,5°C warmer en daalt de temperatuur trager dan bij planten op een kar.




KIJK OP DE JUISTE PLAATS

De beste plaats om weekhuidmijten te detecteren zijn de **topstekken** (bij jong gewas en groene knop-stadium) en de **bloemknop zodra deze begint te schuiven**.

Loze botjes door weekhuidmijt? Nee, zelfs wanneer de plant geïnfecteerd is tijdens knopaanleg zitten er geen mijten in de gesloten knoppen. Deze knoppen ontwikkelen iets trager maar volkomen normaal!

Zo groot (of klein) is een weekhuidmijt onder de microscoop met 40x vergroting. →



BEHANDEL OP HET JUISTE OGENBLIK

Contactmiddelen zet je enkel efficiënt in **wanneer de plaag aanwezig is**. Zelfs groene planten met zichtbare schade kunnen nog succesvol behandeld worden.

Opgelet! Middelen die door licht worden afgebroken pas je het best 's avonds toe.

GEEF RESISTENTIE GEEN KANS

Doorbreek chemische bestrijding: in de zomer kan de **roofmijt *Amblyseius swirskii*** succesvol weekhuidmijt onder controle houden.

Je teeltbegeleider of PCS kunnen je adviseren bij de noodzakelijke aanpassing van het spuitschema.

Wil je meer details of bijkomend advies i.v.m. bovenstaande tips? Contacteer ons via info@pcsierteelt.be of 09 353 94 94