



COCCIDIOSE: JUISTE BEHANDELING BEPERKT SCHADE

COCCIDIOSE

Zichtbare symptomen:

Na één tot drie maanden.


Verbetering na behandeling:

Na drie tot vijf dagen.

Therapiecontrole:

Met mestonderzoek na veertien dagen.

- E.bovis-E.zuernii
- E.alabamensis-E.zuernii-E.bovis
- E.alabamensis-E.bovis
- E.alabamensis-E.zuernii



Coccidiose wordt meestal veroorzaakt door een menginfectie van eimeriasoorten. Bovenstaande mengvormen kwamen het vaakst voor bij coccidiose-infecties tussen 2007 en 2011.

HYGIËNE

Heeft u veel problemen met coccidiose op uw bedrijf? Denk dan vooral aan de hygiëne. De kalveren worden besmet via de omgeving of besmet voer. Maak de hokjes waar de kalveren in zitten dus schoon en laat ze opdrogen voordat u ze met een stoomcleaner nogmaals reinigt. Daarnaast zouden kalveren het voer in het hok kunnen trekken, dus kunt u beter werken met een lekbak.

In de vorige twee edities van de *GD Herkauwer* zijn de gevolgen van coccidiose besproken. Dat preventie en behandeling lonen werd hierin al duidelijk. In dit laatste deel bespreken we hoe u de ziekte het best behandelt.

Het kan best lastig zijn om te zien of een kalf last heeft van coccidiose, maar wees erop bedacht. Het dier zit niet lekker in zijn vel (minder kleur en glans), heeft soms diarree, perst op de mest of er zit bloed in de mest. De symptomen laten zich meestal al na één tot drie maanden leeftijd zien. Wanneer u coccidiose vermoedt, dan kunt u in overleg met uw dierenarts mestonderzoek laten doen.

Vroegtijdig behandelen

Doe dat zo snel mogelijk, want vroegtijdig behandelen is essentieel. Wees alert op de symptomen en begin met een behandeling direct nadat deze zichtbaar zijn. Als de ziekte blijft sluimeren kan er ernstige en mogelijk blijvende darmschade ontstaan. Het dier reageert dan bovendien niet goed meer op een behandeling, en dat betekent een langer en heftiger ziekteverloop en dus een langere behandeling en daardoor bijvoorbeeld groeiverlies.

Bespreek een behandeling altijd met uw dierenarts. Hij of zij kan goedwerkende diergeneesmiddelen voorschrijven voor een eenmalige behandeling. Toedienen kunt u zelf, en na drie tot vijf dagen zou u verbetering moeten zien. Om zeker te weten dat de behandeling effect heeft gehad kan het verstandig zijn na veertien dagen nogmaals mestonderzoek te laten doen.