

EEN OP TIEN KRULSTAARTEN STUKGEBETEN

- **Praktijkonderzoek met niet-gecoupeerde varkens**

Een op de tien vleesvarkens krijgt bijtewonden als boeren de krulstaarten niet meer couperen. Dat blijkt uit praktijkonderzoek van Marion Kluivers op VIC Sterksel.

Staartbijten is een aloude probleem in de varkenshouderij. Om het te beperken, worden de staarten verwijderd. Vanwege de maatschappelijke roep om meer dierenwelzijn zoeken de boerenorganisaties naar mogelijkheden om daar op termijn mee te stoppen.

Kluivers volgde gedurende twee jaar 1428 biggen die niet waren gecoupeerd. Ze ging na of de varkens

verwondingen aan hun staart kregen. Dat bleek gemiddeld bij 10 procent van de dieren het geval. Goed management kan het staartbijten in de praktijk verminderen, merkte Kluivers. In stallen met veel 'speelgoed', zoals stukken hout, touw, een jute zak en ruwvoer, richten de varkens zich op dat materiaal en bijten ze elkaar minder. Ook extra voerbakken in de stal helpen, omdat je dan voorkomt dat een varken de andere varkens wegjaagt bij de voerbak door ze in hun staart te bijten.

Een verrassend inzicht was dat biggen van drie tot vier weken soms al met staartknabbelen beginnen. Varkenshouders kunnen hierop anticiperen door al afleidingsmateriaal in het kraamhok te plaatsen. **RS**

