



ELK BEDRIJF IS UNIEK, OOK ALS HET OM MASTITIS GAAT

Gezonde uiers geven meer melk. Toch heeft elk melkvee-bedrijf er helaas wel eens mee te maken: uierontsteking. Soms duidelijk zichtbaar, met afwijkingen aan de uier of de melk, en soms onzichtbaar, maar wel met een (blijvend) hoog celgetal. Wilt u mastitisproblemen op uw bedrijf aanpakken en in de toekomst voorkomen, dan is het belangrijk om te weten met welke verwekker u te maken hebt. Oftewel: welke kiemen gaat u bestrijden? En past het antibioticum, als u dat al gebruikt, daar dan wel bij?

Mastitis ontstaat niet zomaar; er zijn altijd één of meerdere mastitisverwekkers in het spel. Welke kiemen er aanwezig zijn en hoeveel van elk, verschilt van bedrijf tot bedrijf. En ook de antibioticagevoeligheid van deze kiemen is op elk bedrijf anders. Hoe komt u er nu achter met welke kiem u te maken heeft, en welk antibioticum het meest effectief zal zijn?

Mastitisverwekkers bepalen

Met Uiergezondheid Tankmelk kunt u uw tankmelk zes of tien keer per jaar op zeven belangrijke veroorzakers van uierontsteking laten onderzoeken: *Streptococcus uberis*, *Klebsiella*, coliformen, *Staphylococcus aureus*, *Streptococcus agalactiae*, *Streptococcus dysgalactiae* en omgevingsstreptokokken. De uitslag vertelt u precies welke mastitisverwekkers wel of geen rol spelen op uw bedrijf en geeft u duidelijke handvatten om op uw bedrijf tot een lager tankcelgetal en structureel minder (klinische en subklinische) mastitis te komen.

Juiste behandeling kiezen

Aanvullend kunt u twee keer per jaar bij GD laten onderzoeken voor welke antibiotica de gevonden mastitisverwekkers gevoelig zijn. De uitslag vertelt u voor alle in Nederland verkrijgbare antibiotica per gevonden kiem of de gevoeligheid goed, matig of slecht is. Dit geeft u waardevolle input voor uw bedrijfsbehandelplan en helpt u om, samen met uw dierenarts, het juiste middel te kiezen voor behandeling en bestrijding van mastitis op úw bedrijf.

Antibioticagevoeligheid kan veranderen

Elk bedrijf is uniek, en de situatie op uw bedrijf kan elk half jaar anders zijn. Het gebruik van antibiotica bij de koeien op uw bedrijf kan ertoe leiden dat de gevoeligheid van mastitisverwekkers verandert. Praktijkonderzoek van GD heeft uitgewezen dat de antibioticagevoeligheid voor een periode van ongeveer zes maanden constant blijft. Om er dus zeker van te zijn dat u een actueel en scherp beeld heeft van de antibioticagevoeligheid op uw bedrijf is het raadzaam om dit twee maal per jaar te laten onderzoeken. Zo kunt u gericht en specifiek behandelen, waarmee u de kans op effectieve genezing vergroot en herhalingsgevallen voorkomt.



MEER LEZEN OVER DE UIERGEZONDHEIDSAANPAK OP

WWW.GDDIERGEZONDHEID.NL/UGA