

Incarnaat- klaver



6 | 5

Incarnaatklaver (*Trifolium incarnatum*) wordt vooral toegepast in groenbemester mengsels en wordt daarnaast geteeld als voedergras (veelal in combinatie met raaigras). Na de bloei verdwijnt deze klaver.

Grondsoorten

Niet geschikt voor kalkrijke gronden.

Zaaien

Niet onder dekvrucht, in open land van begin mei tot eind september. Zaaizaadhoeveelheid: van 15 tot 20 kg per hectare. Zaaidiepte: 1 tot 2 cm.

Beworteling

Kan tot 70 cm diep wortelen.

Droge stof opbrengst

De totale droge stof productie lijkt vergelijkbaar met die van rode klaver: 4300 kg per hectare (2700 kg bovengronds en

1600 kg ondergronds). Effectieve organische stof: 1100 kg per hectare.

Vorstgevoeligheid

Is in rozetvorm niet vorstgevoelig en kan dan overwinteren.

Stikstofbemesting

Door stikstofbinding is stikstofbemesting is niet nodig.

Onkruidbestrijding

Is zeer concurrentiekrachtig waardoor onkruidbestrijding niet nodig is.

Bijzonderheden

Groeit ook onder koudere en nattere omstandigheden en heeft vergeleken met veel andere vlinderbloemigen een hogere C/N-verhouding waardoor de afbraak langzamer verloopt.

Aaltjes, bodemschimmels & bodemplagen

Aaltjes

Geen informatie bekend.

Bodemschimmels

Geen informatie bekend.

Bodemplagen

Is bij opkomst gevoelig voor slakken.



www.aaltjesschema.nl