

Keuze

3 | Keuze



WAGENINGEN
UNIVERSITY & RESEARCH



BETER
BODEMBEHEER



GROEN
Landbouwkennis | Natuur | Water | Energie | Innovatie | Netwerk



Europese Unie
Europees Fonds voor
Regionale Ontwikkeling



Provincie
Noord-Holland



GreenPort
NoordHollandNoord



Keuze groenbemesters

Kies de groenbemester die bij het perceel past! Groenbemesters bieden veel voordelen, maar helaas zijn er geen allround 'wonder'soorten of -mengsels van soorten die alle voordelen combineren. De 'ideale' groenbemester kan voor elk perceel een andere zijn. De centrale vraag is; wat zijn de zwakke punten van een perceel? Wanneer duidelijk is wat er aan het perceel verbeterd moet worden kan daar de passende groenbemester bij worden gekozen. Om tot een goede keuze te komen is het dus belangrijk eerst vast te stellen met welk doel de groenbemester geteeld gaat worden. De doelen die in dit hoofdstuk aan de orde komen zijn: organische stof, structuur, gewasgezondheid en biodiversiteit. Met het gekozen hoofddoel voor ogen wordt er een aantal soorten geselecteerd. De volgende stap is dan om na te gaan wat de keuze betekent voor de mineralen en de inpassing binnen het bouwplan. Natuurlijk is de teelt van de juiste groenbemester maar één van de gereedschappen om de kwaliteit van een perceel te verbeteren. De keuze van de groenbemester is een onderdeel van de totaal-aanpak van een perceel en is geen losse maatregel. In dit handboek wordt de groenbemester de hoofdrol gegund. Per doel zijn, voor zover beschikbaar, de kengetallen verzameld die behulpzaam kunnen zijn bij het maken van de juiste keuze. Voor de grassen en kruisbloemigen zijn er van veel kenmerken voldoende gegevens om de tabellen verantwoord te vullen. Helaas is dit voor de meeste andere groenbemesters nog niet het geval.

Organische stof

Of het nu gewasgezondheid, biodiversiteit of mineralen betreft, organische stof speelt steeds een belangrijke rol. Daarom is het bereiken of handhaven van een goed organische stof gehalte op een perceel een doel op zich. Voor het op peil houden of verhogen van het organische stof niveau van de grond is een groenbemester nodig die zoveel mogelijk effectieve organische stof produceert. Wortels zijn daarbij effectiever dan bovengrondse massa; wortels leveren zo'n 35% effectieve organische stof, bovengrondse massa 20%. Gewassen die veel effectieve organische stof kunnen leveren zijn o.a. soedangras, raaigrassen en Tagetes (allen mits op tijd gezaaid). Mengsels benutten de beschikbare ruimte boven-

en ondergronds efficiënt waardoor er veel massa kan worden geproduceerd. Minder grote bronnen van effectieve organische stof zijn o.a. gele mosterd, facelia, wikke en spurrie.

In tabel 3.1 zijn gemiddelde waarden weergegeven, gebaseerd op oude metingen waarbij voor een aantal nieuwe groenbemesters de informatie ontbreekt.

De spreiding in de aanvoer van effectieve organische stof wordt mede bepaald door het zaaitijdstip en de groeiomstandigheden in het najaar. De spreiding in de cijfers is daardoor zeer groot.

Tabel 3.1 | Droge stof productie en effectieve organische stof (EOS) per groenbemester bij een geslaagd gewas.

Groenbemester	d.s.productie gewas (kg/ha)			EOS (kg/ha)
	boven-gronds	onder-gronds	totaal	
Bladrammenas	3100	800	3900	875
Gele mosterd	3100	800	3900	875
Bladkool	3000	1000	4000	850
Zwaardherik	2000			535
Ethiopische mosterd	4000			
Engels raaigras	2200	2000	4200	1150
Italiaans raaigras	2500	1700	4200	1100
Westerwolds raaigras	2400	1700	4100	1050
Rietzwenkgras	2000	2000	4000	1050
Winterrogge ¹	1000	600	1600	850
Japanse haver ¹	1600			850
Soedangras	10000			
Triticale				
Witte klaver	2000	1300	3300	850
Rode klaver	2700	1600	4300	1100
Alexandrijnse klaver	2200	600	2800	600
Perzische klaver	2600	800	3400	800
Voederwikke	2500	500	3000	650
Incarnaat klaver	2700	1600	4300	1100
Afrikaantje	6000			1050
Facelia	2300	700	3000	650
Raketblad	5000	500	5500	850
Spurrie	2600	300	2900	650

¹winterrogge en Japanse haver bij late inzaai
Lege vakjes: geen gegevens beschikbaar

Structuur

In de periode tussen de hoofdteelten kunnen groenbemesters de bodem beschermen tegen verslemping en erosie. Resten van groenbemesters, die in de toplaag aanwezig zijn, bieden in het voorjaar ook weer bescherming als het nieuwe gewas gezaaid of gepoot is. Er bestaan echter verschillen tussen de groenbemesters. Oppervlakkig en intensief wortelende groenbemesters zoals grassen, houden de bodem goed vast. Diep wortelende groenbemesters bevorderen de infiltratiecapaciteit van de bodem en kunnen verdichte lagen helpen voorkomen. Wortel- en bladresten hebben invloed op de structuurstabiliteit en de doorlatendheid. Wanneer een groenbemester met een uitgebreid wortelstelsel niet dieper dan zo'n 15 cm wordt ondergeploegd of er wordt niet kerend gewerkt, dan houden de wortels de

bodemdeeltjes nog een tijd bij elkaar. Dit voorkomt verslemping en bovendien verstuift een goed doorwortelde grond minder snel. Groenbemesters die de bovengrond intensief doorwortelen (zoals grassen) hebben dan de voorkeur. Wanneer het van belang is dat de groenbemester gedurende de winter groen blijft, speelt de vorstgevoeligheid een belangrijke rol. Facelia, Japanse haver, gele mosterd, afrikaantjes, en voederwikke zijn gevoelig tot zeer gevoelig voor (nacht)vorst, terwijl bladkool, witte klaver en vooral veel grasachtige groenbemesters minder tot heel weinig gevoelig voor vorst zijn. Anderzijds kan een hoge vorstgevoeligheid ook gunstig zijn om het gewas gemakkelijk onder te ploegen en om de kans op opslag in volgende jaren te verminderen.

Tabel 3.2 | Eigenschappen van groenbemesters van belang bij het beschermen of verbeteren van de structuur.

Groenbemester	grondbedekking en gewasmasa	vorstgevoeligheid	beworteling		structuur verbeteraar	erosie preventie
			diepte	intensiteit		
Bladrammenas	●	●	●	●	●	●
Gele mosterd	●	●	●	●	●	●
Bladkool	●	●	●	●	●	●
Zwaardherik	●	●	●	●	●	●
Ethiopische mosterd	●	●	●	●	●	●
Engels raaigras	●	○	●	●	●	●
Italiaans raaigras	●	○	●	●	●	●
Westerwolds raaigras	●	○	●	●	●	●
Rietzwenkgras	○	○	●	●	●	●
Winterrogge	●	○	●	●	●	●
Japanse haver	●	●	●	●	●	●
Soedangras	●	●	●	●	●	●
Triticale	●	○	●	●	●	●
Witte klaver	●	○	●	●	●	●
Rode klaver	●	●	●	●	●	●
Alexandrijnse klaver	●	●	●	●	●	●
Perzische klaver	●	●	●	●	●	●
Voederwikke	●	●	●	●	●	●
Incarnaat klaver	●	○	●	●	●	●
Afrikaantje	●	●	●	●	●	●
Facelia	●	●	●	●	●	●
Raketblad	○	●	●	●	●	●
Spurrie	●	●	○	○	●	●
	○ Slecht ● Matig ● Goed ● Zeer Goed ● Excellent	○ Niet ● Weinig ● Matig ● Gevoelig ● Zeer	○ Ondiep ● Vrij ondiep ● Vrij diep ● Diep ● Zeer diep	○ Slecht ● Matig ● Goed ● Zeer Goed ● Excellent	○ Slecht ● Matig ● Goed ● Zeer Goed ● Excellent	○ Slecht ● Matig ● Goed ● Zeer Goed ● Excellent

Op tijdelijk onbeteeld land kan onkruid zich massaal ontwikkelen. Een snelle bedekking van de bodem door een groenbemester kan dit tegengaan. Vooral kruisbloemige groenbemers en Italiaans en Westerwolds raaigras kunnen zich snel ontwikkelen en hebben daarmee een sterk onkruid onderdrukkend vermogen. (zie tabel 3.2 voor grondbedekking en gewasmassa)

Groenbemers kunnen op twee manieren onkruidpopulaties beïnvloeden: enerzijds door competitie om licht, water en nutriënten, en anderzijds door het uitscheiden van giftige stoffen tijdens de groei of na inwerken (allelopathie) waardoor kieming of groei van zaailingen van andere planten wordt onderdrukt. Gericht gebruik maken van allelopathie is in de praktijk nog lastig.

Het is belangrijk dat groenbemers snel na zaai al een hoge mate van het licht wegvangen om onkruiden te beconcurreren. Dit geldt met name voor hoge onkruidsoorten als melganzevoet (*Chenopodium album*) en minder voor laagblijvende soorten als vogelmuur (*Stellaria media*) en straatgras (*Poa annua*). Groenbemers met een snelle initiële groei en veel bladoppervlak (zoals bijvoorbeeld bladrammenas en Japanse haver) hebben dan de voorkeur. Op percelen waar met name veel hoge onkruiden zoals melganzevoet te verwachten zijn, loont het om de zaaidichtheid te verhogen om zo een dichte, competitieve stand te creëren. Op percelen die niet voor de winter worden geploegd, is ook de vorstgevoeligheid van belang voor de onkruidonderdrukking (tabel 3.2). Hoe langer de groenbemester op het veld blijft staan, des te beter de onkruidonderdrukking.

Na het gebruik van sommige bodemherbiciden in het cultuurgewas moet er een tijdje worden gewacht voordat er een groenbemester ingezaaid kan worden. In het najaar toegepast geven deze middelen meestal geen problemen meer bij voorjaarszaai. Na de winter toegepast kunnen enkele middelen de keuze van de in te zaaien groenbemester (sterk) beperken. Middelen met een lange werking kunnen zelfs na toepassing in het voorjaar na de oogst van het cultuurgewas nog werkzaam zijn en schade doen aan sommige groenbemestingsgewassen.

Aaltjesbeheersing

De groep van plantparasitaire aaltjes bestaat uit een bonte verzameling van soorten die in vorm en levenswijze totaal kunnen verschillen. De groenbemester die de éne aaltjessoort bestrijdt kan het probleem met een andere aaltjessoort juist verergeren. Op basis van hun levenswijze en de symptomen die ze veroorzaken, worden plantparasitaire aaltjes ingedeeld in:

- Cysteaaltjes
- Wortelknobbelaaltjes
- Wortellesieaaltjes
- Vrijlevende wortelaaltjes
- Stengelaaltjes
- Bladaaltjes

Cysteaaltjes en stengelaaltjes komen op alle grondsoorten voor. Over het algemeen geldt hoe lichter de grond des te meer aaltjessoorten kunnen voorkomen. Binnen elke aaltjesgroep komen meerdere aaltjessoorten voor. Van de 1200 aaltjessoorten in Nederland zijn er een kleine honderd die in de land- en tuinbouw een rol spelen. Hier worden enkele opvallende relaties met groenbemers genoemd. In de hoofdstukken waarin de

groenbemers afzonderlijk worden besproken worden meer details gegeven.

Cysteaaltjes

Cysteaaltjes hebben beperkte waardplantenreeksen en vertonen in verhouding een geringe natuurlijke sterfte wanneer er geen waardplant wordt geteeld.

In principe zijn alle kruisbloemigen net als de ganzevoetachtigen waardplant voor alle soorten bietencysteaaltjes. In gele mosterd en bladrammenas zijn kwekers er echter in geslaagd resistente rassen te ontwikkelen. Door de teelt van deze resistente rassen gedurende een vol seizoen ("groene braak") kan een bestrijdingseffect tot 80% worden gerealiseerd. Zaai in de herfstbraak vanaf augustus, zal afhankelijk van het weer in het najaar, 0 tot 30 % extra doding bovenop de natuurlijke sterfte opleveren.

Raketblad kan als bestrijder van het aardappelcysteaaltje worden ingezet. Deze van oorsprong tropische groenbemester produceert stoffen waardoor de larven uit de cyste gelokt worden. De larven kunnen de wortels infecteren, maar er vindt geen vermeerdering op raketblad plaats.

Wortelknobbelaaltjes

Deze aaltjesgroep heeft in tegenstelling tot de cysteaaltjes juist een vrij brede waardplantenreeks. De teelt van veel gewassen en groenbemers leidt daardoor vaak tot een toename van de populatie. Daar staat tegenover dat de populatie door natuurlijke sterfte in perioden zonder gewas ("zwarte braak") kan dalen met 80% of meer.

Bij een besmetting met het noordelijk wortelknobbelaaltje (*Meloidogyne hapla*) bieden grasachtigen de oplossing. Zowel granen en grassen als cultuurgewas, als ook grasgroenbemers doen de besmetting met dit wortelknobbelaaltje sterk afnemen omdat ze geen waardplant voor deze aaltjessoort zijn. Bij het graswortelknobbelaaltjes (*Meloidogyne naasi*) is het omgekeerd, omdat deze aaltjessoort zich bijna uitsluitend op granen en grassen vermeerderd en niet op de meeste breedbladige gewassen (biet en ui kunnen dit aaltje echter nog wel enigszins vermeerderen en er ook veel schade van ondervinden).

De probleemsoorten in deze aaltjesgroep zijn de quarantaine soorten *Meloidogyne chitwoodi* en *Meloidogyne fallax*. Van bladrammenas was al bekend dat het een slechte waardplant is en daarmee het minst slechte alternatief voor zwarte braak. Inmiddels zijn er een groot aantal bladrammenas rassen op de markt met hoge niveaus van resistentie tegen *M. chitwoodi*.

Wortellesieaaltjes

Met de inzet van afrikaantjes (*Tagetes patula*) is deze groep van Pratylenchus soorten actief te bestrijden (zie paragraaf 7.1). Inmiddels is gebleken dat na één geslaagde teelt van *Tagetes patula* het meerdere jaren duurt voordat de aantallen wortellesieaaltjes weer op een schadelijk niveau zijn.

Vrijlevende wortelaaltjes

Bij de groep van de trichodoriden (*Trichodorus* en *Paratrichodorus* soorten) zijn vier soorten te onderkennen die veel gewasschade kunnen veroorzaken: *Paratrichodorus teres*, *Paratrichodorus pachydermus*, *Trichodorus similis* en *Trichodorus primitivus*. Van meerdere groenbemers is de waardplantstatus voor

een of meerdere van de vier trichodoriden niet bekend. Tot op heden zijn er geen groenbemers beschikbaar die deze aaltjessoorten actief bestrijden (actieve bestrijding wil zeggen dat de besmetting door de teelt veel meer daalt dan bij zwarte braak of de teelt van een niet-waardplant). Wat betreft *P. teres* zijn bladrammenas en gele mosterd de beste keuze omdat beide een slechte waardplant voor dit aaltje zijn. Voor *Trichodorus primitivus* is dat om dezelfde reden facelia. Voor *Trichodorus similis* en *Paratrichodorus pachydermus* lijkt bladrammenas de minst slechte keus. Trichodoride aaltjes kunnen tabaksratelvirus (TRV) overbrengen van de ene plant naar de andere. Bladrammenas en voederwikke zijn geen waardplant voor dit virus, waardoor het virus zich niet kan vermeerderen. Bij de teelt van bladrammenas of voederwikke loopt de besmetting van tabakratelvirus dan ook sterk terug.

Stengelaaltjes

Stengelaaltjes (*Ditylenchus dipsaci*) kunnen zich eveneens op veel gewassen en groenbemers vermeerderen. Helaas is van veel groenbemers geen (goede) informatie beschikbaar over vermeerdering van stengelaaltjes. Er zijn tot op heden geen groenbemers waarmee stengelaaltjes actief bestreden kunnen worden. De beste optie in het geval van stengelaaltjes is daarom triticale (geen waardplant voor stengelaaltjes) en Italiaans en Engels raaigras (beide een slechte waardplant voor stengelaaltjes).

Het aaltjesschema geeft voor elke gewas- aaltjes combinatie in stippen aan hoe de vermeerdering van het betreffende aaltje op het gewas is, en met kleuren hoe de schadegevoeligheid van dat gewas voor dat aaltje is.

De waardplantgeschiktheid is de mate waarin een aaltje zich op een gewas kan vermeerderen. Aaltjes die meerdere generaties per jaar op een gewas voortbrengen, kunnen in één seizoen van lage dichtheden tot maximale dichtheden toenemen. Hoe hoog die maximale dichtheid is, hangt af van het gewas.

De absolute aantallen verschillen sterk per aaltjessoort. De waardplantgeschiktheid is daarom opgedeeld in de volgende vermeerderingsklassen:

Waardplantstatus	
?	onbekend
? i	enige informatie
R	rasafhankelijk
S	serotype afhankelijk
- -	actieve bestrijding
-	geen waard
•	slechte waard
••	matige waard
•••	goede waard

Wanneer er op een perceel een aaltjesbesmetting aanwezig is, kan het www.aaltjesschema.nl bij de keuze behulpzaam zijn.

Op de site www.aaltjesschema.nl kan via het invoeren van een teeltplan een uitsnede gemaakt worden uit het totale aaltjesschema. Elk vakje in dit schema is een doorverwijzing (hyperlink) naar achtergrondinformatie en fotomateriaal.



Met schadegevoeligheid wordt aangegeven in welke mate het gewas schade ondervindt van de betreffende aaltjessoort. Schade wordt veroorzaakt door de combinatie van schadegevoeligheid van het gewas en het aantal aaltjes bij aanvang van de teelt (besmettingsniveau). De schade kan slaan op alleen verlies in fysieke opbrengst maar kan ook betrekking hebben op kwaliteit of het onmogelijk worden van een teelt omdat het aaltje in dat gewas een quarantaine organisme is.

Met de volgende kleuren wordt de schadegevoeligheid weergegeven:

schade (% opbrengstverlies)	
■ (wit)	onbekend
■ (groen)	geen
■ (geel)	weinig (5-15)
■ (oranje)	matig (15 - 33)
■ (paars)	veel (> 33)

Tabel 3.3 | aaltjesschema voor groenbemesters

Groenbemester	Aaltjes en tabaksrattelvirus(TRV)													
	<i>G. rostochiensis</i> en <i>G. pallida</i> (aardappelcysteaaltjes)	<i>Heterodera schachtii</i> (wit bietencysteaaltje)	<i>Heterodera betae</i> (geel bietencysteaaltje)	<i>Meloidogyne chitwoodi</i> (maïswortelknobbelaaltje)	<i>Meloidogyne fallax</i> (bedrieglijk maïswortelknobbelaaltje)	<i>Meloidogyne hapla</i> (Noordelijk wortelknobbelaaltje)	<i>Meloidogyne naasi</i> (graswortelknobbelaaltje)	<i>Pratylenchus penetrans</i> (wortelzieaaltje)	<i>Ditylenchus dipsaci</i> (stengelaaletje)	<i>Paratrichodorus pachydermus</i>	<i>Paratrichodorus teres</i>	<i>Trichodorus primitivus</i>	<i>Trichodorus similis</i>	tabaksrattelvirus (TRV)
Bladrammenas	-	-- R ¹ - R ²	- R	- R	•• R	••	-	••• ¹ •• ²	?	••	•	•••	••	-
Gele mosterd	-	-- R ¹ - R ²	- R	••	••	•	-	••• ¹ •• ²	?	•••	•	•••	•••	•••
Bladkool	-	? i	•••	?	?	?	?	•••	?	?	?	?	?	? i
Zwaardherik	? i	? i	? i	• i	? i	? i	?	••• i	?	?	?	?	?	?
Ethiopische mosterd	?	? i	? i	• i	?	?	?	••• i	?	?	?	?	?	?
Engels raaigras	-	-	-	•	•••	-	•••	•• ¹ •• ²	•	•••	•••	•••	•••	••
Italiaans raaigras	-	-	-	•••	•••	-	•••	•••	•	•••	•••	•••	•••	••• S
Westerwolds raaigras	-	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?
Rietzwenkgras	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?
Winterrogge	-	-	-	•••	••	-	••	••• ¹ •• ²	••	•••	•••	?	•••	••
Japanse haver	-	-	-	•••	? i	?	•	-	?	?	?	?	?	?
Soedangras	-	-	-	?	•	?	?	•••	?	?	?	?	?	?
Triticale	-	-	-	••	•	-	•••	••	-	?	?	?	?	?
Witte klaver	-	-	?	•• R i	•• R i	•• R i	?	•••	•••	?	•••	?	?	••• S i
Rode klaver	-	-	?	?	?	?	?	? i	•••	?	?	?	?	?
Alexandrijnse klaver	-	?	••	•••	•••	•••	?	? i	?	?	? i	?	?	•••
Perzische klaver	-	-	•••	•••	•••	•••	?	? i	?	?	•	?	?	••• i
Voederwikke	-	-	••	• R	•••	•••	?	? i	?	?	? i	•••	?	-
Incarnaat klaver														
Afrikaantje	-	-	-	-	-	- i	-	--	?	? i	? i	? i	? i	••• S
Facelia	-	-	-	•	•	••	-	•••	?	••	?	•	?	•••
Raketblad	-- i	?	?	••	?	?	?	•	?	••	••	••	••	•••
Spurrie	-	?	?	?	?	••	?	?	?	?	?	?	?	?

¹ zomerteelt ² herfstteelt
<http://www.aaltjesschema.nl/>

Tabel 3.4 | bodemschimmel schema

Groenbemester	Bodemschimmels										
	<i>Alternaria porri</i> (purpervlekkenziekte in ui en prei)	<i>Aphanomyces cochlioides</i> (afdraaiers en wortelrot in suikerbiet)	<i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. cepae (bolrot of fusariumrot in ui)	<i>Phoma apiicola</i> (wortelrot in o.a. peen en knolselderij)	<i>Phoma betae</i> (plantwegval en rot in suikerbiet)	<i>Plasmidiophora brassicae</i> (knolvoet in kool en koolzaad)	<i>Pythium violae</i> ("cavity spot" in peen)	<i>Rhizoctonia solani</i> AG2-2 (o.a. wortelrot in biet, rot in peen)	<i>Rhizoctonia solani</i> AG3 (lakschurft in aardappel)	<i>Sclerotinia sclerotiorum</i> (rattenkeutelziekte in o.a. aardappel)	<i>Verticillium dahliae</i> (verwelkingsziekte in o.a. aardappel)
Bladrammenas	-	-	?	-	-	-	?	•	-	•••	?
Gele mosterd	-	-	?	-	-	•••	?	••	-	•••	?
Bladkool	-	-	?	-	-	•••	?	•	-	•••	?
Zwaardherik	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?
Ethiopische mosterd	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?
Engels raaigras	-	-	?	-	-	-	••	•••	-	-	?
Italiaans raaigras	-	-	?	-	-	-	••	•••	-	-	?
Westerwolds raaigras	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?
Rietzwenkgras	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?
Winterrogge	-	-	?	-	-	-	•	?	-	-	•
Japanse haver	-	-	•••	-	-	-	?	?	-	-	?
Soedangras	?	?	•••	?	?	?	?	?	?	?	?
Triticale	-	-	?	-	-	-	?	?	-	-	•
Witte klaver	-	-	?	-	-	-	-	•••	-	?	••
Rode klaver	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?
Alexandrijnse klaver	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?
Perzische klaver	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?
Voederwikke	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?
Incarnaat klaver	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?
Afrikaantje	-	-	?	-	-	-	?	•••	-	?	?
Facelia	-	-	?	-	-	-	?	••	-	?	?
Raketblad	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?
Spurrie	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?

<http://edepot.wur.nl/377663>

Waardplantstatus

- ? onbekend
- ? i enige informatie
- R rasafhankelijk
- S serotype afhankelijk
- actieve bestrijding
- geen waard
- slechte waard
- matige waard
- goede waard

schade (% opbrengstverlies)

- onbekend
- geen
- weinig (5-15)
- matig (15 - 33)
- veel (> 33)

Beheersing ziekten en plagen

Net als bij de aaltjes, hangt de groenbemesterkeuze in geval van bodemschimmels en/of bodemplagen zeer sterk samen met de volgvruucht. Wanneer de teelt na de groenbemester ongevoelig is voor schade door de schadeverwekkers dan is het geen probleem een groenbemester te kiezen die hoge dichtheden nalaat.



Tabel 3.5 | bodemplagen schema

Groenbemester	Bodemplagen incl. slakken									
	<i>Onychiurus armatus</i> (springstaarten)	<i>Atomaria linearis</i> (bietenkever)	<i>Agriotes lineatus</i> (ritnaalden)	<i>Pegomya betae</i> (bietenvlieg)	<i>Delia platura</i> (bonenvlieg)	<i>Delia radicum</i> (koolvlieg)	<i>Delia antiqua</i> (uienvlieg)	<i>Psila rosae</i> (wortelvlieg)	<i>Tipula paludosa</i> (emelt)	<i>Deroceras reticulatum</i> (gevlekte akkerslak)
Bladrammenas	-	-	?	-	••	•	-	-	•	•••
Gele mosterd	•	-	-	-	••	•	-	-	•	•
Bladkool	•	•	-	-	••	•	-	-	•••	•
Zwaardherik	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?
Ethiopische mosterd	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?
Engels raaigras	•••	-	••	-	?	-	-	-	•••	••
Italiaans raaigras	•••	-	••	-	?	-	-	-	•••	••
Westerwolds raaigras	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?
Rietzwenkgras	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?
Winterrogge	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?
Japanse haver	•	-	••	-	••	-	-	-	?	?
Soedangras	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?
Triticale	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?
Witte klaver	•••	?	-	-	••	-	-	-	•	•••
Rode klaver	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?
Alexandrijnse klaver	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?
Perzische klaver	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?
Voederwikke	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?
Incarnaat klaver	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?
Afrikaantje	*	-	?	-	?	-	-	-	•	?
Facelia	*	?	?	-	?	-	-	-	•••	•
Raketblad	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?
Spurrie	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?

<http://edepot.wur.nl/294276>

Waardplantstatus	schade (% opbrengstverlies)
? onbekend	onbekend
? i enige informatie	geen
R rasafhankelijk	weinig (5-15)
S serotype afhankelijk	matig (15 - 33)
-- actieve bestrijding	veel (> 33)
- geen waard	
• slechte waard	
•• matige waard	
••• goede waard	

Biodiversiteit

Groenbemesters leveren een bijdrage aan biodiversiteit. Bloeiende gewassen kunnen interessant zijn voor bijen en andere bestuivers. Ook kunnen ze dienen als schuilplaats voor vogels en andere dieren.



Tabel 3.6 | Waarde van groenbemesters voor bestuivers (bijen en hommels)

Groenbemester	Honingbijen	Hommels	Wilde bijen	Eindscore
Bladrammenas	●	●	○	●
Gele mosterd	●	●	●	●
Bladkool	●	●	●	●
Zwaardherik	●			●
Ethiopische mosterd				
Engels raaigras	○	○	○	○
Italiaans raaigras	○	○	○	○
Westerwolds raaigras	○	○	○	○
Rietzwenkgras	○	○	○	○
Winterrogge	○	○	○	○
Japanse haver	○	○	○	○
Soedangras	○	○	○	○
Triticale	○	○	○	○
Witte klaver	●	●	●	●
Rode klaver	●	●	●	●
Alexandrijnse klaver				
Perzische klaver	●	●	●	●
Voederwikke	○	●	●	●
Incarnaat klaver				
Afrikaantje	●	●	○	●
Facelia	●	○	○	●
Raketblad	○	○	○	○
Spurrie	○	○	○	○

Lege vakjes: geen gegevens beschikbaar

- Slecht
- ◐ Matig
- ◑ Goed
- Zeer Goed
- Excellent

Mineralen

Na de oogst van een aantal gewassen kan er nog veel stikstof in de bodem voorkomen. Het vroegtijdig stoppen van de stikstofopname door het gewas ruim voor de oogst (zoals bij mais, aardappel en ui), het oogsten van gewassen op een moment dat de plant veel voedingsstoffen nodig heeft (bladgewassen als spinazie en sla), het toedienen van dierlijke mest en de mineralisatie van oogstresten (zoals erwten en boon) kunnen oorzaken zijn van hoge stikstofgehalten. Groenbemesters kunnen een (groot) deel van de stikstof vastleggen, waardoor de uitspoeling van stikstof (in de vorm van nitraat) tijdens de winter en het voorjaar wordt beperkt. Groenbemesters verschillen sterk in de mate van N-opname en N-conservering en daarmee in de geschiktheid als "N-vanggewas". Bij de teelt van mais en aardappel (vanaf 2021) op zandgrond en löss is de teelt van een stikstofvanggewas verplicht. Zie voor dit onderwerp Hoofdstuk 9. N-vanggewassen. De drogestofproductie en het N-gehalte bepalen enerzijds de N-inhoud, anderzijds is de C/N-verhouding van het gewas van belang bij de snelheid van vertering en daarmee van invloed op het tijdstip van vrijkomen van de stikstof ten gunste van het volgewas. Vooral vlinderbloemige groenbemestingsgewassen

zijn rijk aan stikstof en kunnen bij een goed geslaagd gewas een belangrijke stikstofbron vormen voor volgteelten. Maar ook enkele andere gewassen kunnen een aanzienlijke hoeveelheid stikstof bevatten (o.a. bladkool en facelia). De hoeveelheid stikstof die vrijkomt uit een verterende groenbemester en het tijdstip waarop is moeilijk te voorspellen. Bladrijke gewassen (zoals gele mosterd) verteren snel. Wanneer deze gewassen in de herfst worden ondergeploegd of aan het begin van de winter afvriezen zal de vrijkomende stikstof voor een aanzienlijk deel verloren gaan. Dit geldt ook voor de vlinderbloemige groenbemesters. Gewassen die wat meer verhouten (met een hogere C/N-verhouding) en een hoger drogestofgehalte hebben (grassen, bladrammenas, bladkool) verteren daarentegen langzamer en zullen voor een groter deel hun stikstof kunnen overdragen aan het volgewas. Gewassen die veel massa vormen, een hoog stikstofgehalte bezitten en een hoge C/N-verhouding hebben zijn ideale stikstofbronnen. In de praktijk komt het nogal eens voor dat de teelt van een groenbemester minder goed slaagt. In die gevallen is de N-opname van de groenbemester lager dan de cijfers in tabel 3.7 aangeven.



Tabel 3.7 | Stikstof: kengetallen en eigenschappen van groenbemesters

Groenbemester	bovengrondse ds. productie (kg/ha)	Bovengrondse N-opname (kg/ha)		C/N-verhouding	Officieel N vanggewas	N-fixerend gewas
		gemiddeld	spreiding			
Bladrammenas	3100	50	30-150	20	●	○
Gele mosterd	3100	40	30-80	20	○	○
Bladkool	3000	100	50-120	24	●	○
Zwaardherik	2000				○	○
Ethiopische mosterd	4000				○	○
Engels raaigras	2200	45	30-60	23	●	○
Italiaans raaigras	2500	45	20-80	22	●	○
Westerwolds raaigras	2400	40	40-45	22	●	○
Rietzwenkgras	2000				●	○
Winterrogge	1000	100	50-130	22	●	○
Japanse haver	1600				●	○
Soedangras	10000				○	○
Triticale					●	○
Witte klaver	2000	80	50-120	14	○	●
Rode klaver	2700	100	60-140	16	○	●
Alexandrijnse klaver	2200				○	●
Perzische klaver	2600	120	100-175	17	○	●
Voederwikke	2500	120	90-200	12	○	●
Incarnaat klaver	2700				○	●
Afrikaantje	6000	140	70-170	20	○	○
Facelia	2300	120	60-200	20	○	○
Raketblad	5000	90			○	○
Spurrie	2600				○	○

Lege vakjes: geen gegevens beschikbaar

○ Nee ○ Nee
● Ja ● Ja

Bouwplan

In het recente verleden was het moment van vrijkomen van percelen bijna volledig bepalend voor de groenbemesterkeuze. Gechargeerd gesteld: na vroeg ruimende gewassen was de logische keuze grassen of bladrammenas, in geval van laat ruimende gewassen bleven gele mosterd of rogge over. Wanneer de selectie nu gebaseerd wordt op het perceelsspecifieke hoofddoel dan is het vervolgens de vraag of en hoe deze in het bouwplan kunnen worden ingepast. De volgvruucht is daarbij de eerste sturende factor. De groenbemesterteelt is immers de voorbereiding voor het volgende seizoen. Wanneer de volgvruucht eisen stelt bijvoorbeeld vanwege het zaai- of plantmoment of voor de gevoeligheid voor N levering later in het seizoen, zal dit de keuze van de groenbemester mede bepalen.

Het bouwplan stuurt de keuze ook vanwege het tijdraam dat de opeenvolgende gewassen bieden. Een late teelt gevolgd door een vroege beperkt de keuze immers. In sommige situaties kan er vanwege de integrale benadering van de bodemkwaliteit zelfs aanleiding zijn om wijzigingen aan te brengen in het bouwplan of in de teeltwijze (bijvoorbeeld kiezen van een vroeg ras of vroege levering) zodat er meer ruimte komt voor de groenbemesterteelt. Er zijn gedurende het jaar verschillende momenten waarop groenbemestingsgewassen kunnen worden ingezaaid.

Wanneer op het betreffende perceel een cultuurgewas wordt geteeld zijn er twee mogelijkheden:

- er wordt gewacht tot na de oogst van het cultuurgewas
- het cultuurgewas dient als dekvruucht en de groenbemester wordt tijdens de teelt van het cultuurgewas ingezaaid (teelt als "ondervruucht").

Sommige groenbemesters kunnen na de teelt van een cultuurgewas niet ná een bepaalde datum gezaaid worden omdat de slagingskans dan te klein wordt. Een vlinderbloemige als Perzische klaver dient bijvoorbeeld vóór half augustus gezaaid te worden. Witte en rode klaver groeien dermate langzaam dat ze vóór augustus gezaaid moeten worden. Daarom worden deze groenbemesters wel in april gezaaid, maar dan onder dekvruucht (veelal in granen). Ook te vroeg zaaien kan bij sommige groenbemesters nadelen geven zoals (nacht)vorstschade, bloei en opslag.

Een perceel dat een heel jaar braak ligt, biedt uiteraard de beste mogelijkheid tot de keuze van een groenbemester omdat het zaaitijdstip dan zelf gekozen kan worden. De hieronder opgenomen zaai kalender wijkt af van die uit 2003. Door de warmere najaren en de mildere winters zijn er ruimere mogelijkheden ontstaan voor groenbemesters.

Tabel 3.8 | Zaaitijdstip groenbemesters

Groenbemester	jan	febr	mrt	april	mei	juni	juli	aug	sept	okt	nov	dec
Bladrammenas												
Gele mosterd												
Bladkool												
Zwaardherik												
Ethiopische mosterd												
Engels raaigras												
Italiaans raaigras												
Westerwolds raaigras												
Rietzwenkgras												
Winterrogge												
Japanse haver												
Soedangras												
Triticale												
Witte klaver												
Rode klaver												
Perzische klaver												
Alexandrijnse klaver												
Voederwikke												
Incarnaat klaver												
Afrikaantjes												
Facelia												
Raketblad												
Spurrie												

- geel = zaaien onder dekvruucht (oktober - half mei)
- groen = zaaien op braak land (mei - juni)
- rood = zaaien in vroege stoppel (juli - half augustus)
- paars = late stoppel (half augustus - half september)

Zaaien onder dekvruucht

Het zaaien onder dekvruucht heeft als voordeel dat het groeiseizoen van de groenbemester langer is. Een traag groeiende groenbemester (zoals Engels raaigras en witte klaver) kan op deze manier toch voldoende massa vormen, vooral bij een vroege oogst van de dekvruucht. Daarbij komt het voordeel dat een groenbemester die onder een dekvruucht is gezaaid meestal beter aanslaat doordat de grond in het voorjaar meer vocht bevat. Voor inzaai onder dekvruucht zijn de meeste groenbemestingsgewassen echter niet geschikt. Alleen verschillende gras- en klaversoorten komen hiervoor in aanmerking. Daarbij dienen de snel en hoog opgroeiende soorten (Italiaans- en Westerwolds raaigras, Perzische klaver en sommige rassen van de rode klaver) niet te vroeg te worden gezaaid om concurrentie met de dekvruucht en problemen bij de oogst te voorkomen. Van het berijden met oogstwerktuigen hebben klaversoorten meer last dan grassen.

Niet elke dekvruucht is even geschikt voor de onderteelt van een groenbemester. Graangewassen, die geteeld worden om de hoogste opbrengst te behalen, vormen veelal een te dicht gewas. Rassenkeuze en teeltwijze van de dekvruucht zullen aangepast moeten worden aan de groenbemester. Biologische teeltsystemen lenen zich beter voor de onderzaai van een groenbemester aangezien de dekvruucht veelal minder zwaar is.

Mengsel

Wanneer er bij het doorlopen van de hiervoor genoemde stappen geen aanleiding is tot het telen van een enkele soort, heeft het telen van een mengsel de voorkeur. Met het telen van een groenbemestermengsel kunnen verschillende voordelen van de afzonderlijke soorten benut worden. Zo kunnen verschillende wortelstypen, verschillende bodembedekking en gewasmassa en gewasgroei in de tijd met elkaar gecombineerd worden. Als uitgangspunt kunnen de voor het doel geselecteerde groenbemesters gemengd worden eventueel aangevuld met vlinderbloemigen en soorten genoemd in Hoofdstuk 8.