

Bloemkool / Broccoli

1% drift

clm



Middel	Toe- passings- tijdsp t	Advies- doser ing	Kg actieve stof	Milieu-effecten				Nuttige organismen	
				Grondwater		Water- leven	Lucht	Bestuivers	Bestrijders
				organische stofklassen					
				1,5-3%	3-6%	MBP	MBP	MBP	kg a.s./ha
Onkruidbestrijding									
Butisan ¹	mrt-aug	1,5	0,75	2	0	2	0,08	A	A
Centium	mrt-aug	0,25	0,09	0	0	0	0,03	?	?
Lentagran	mrt-aug	2	0,90	1800	260	36	0,06	A	A
Ziektebestrijding									
Amistar/ Ortiva (max 1/3 van aantal toepassingen)	mrt-aug	1	0,25	75	1	1	0,00	A	A
Amistar/ Ortiva (max 1/3 van aantal toepassingen)	sept-feb	1	0,25	130	1	1	0,00	A	A
Folio Gold (max 3x)	mrt-aug	2	1,07	340	2	4	0,18	?	?
Folio Gold (max 3x)	sept-feb	2	1,07	520	2	4	0,11	?	?
Horizon (max 3x), 75% driftreductie ⁴	mrt-aug	1	0,25	1500	200	0	0,01	A	A
Horizon (max 3x), 75% driftreductie ⁴	sept-feb	1	0,25	1500	75	0	0,01	A	A
Previcur N	mrt-aug	4	2,89	0	0	0	0,92	A	A
Previcur N	sept-feb	4	2,89	0	0	0	0,52	A	A
Rovral aquaflo ²	jan-dec	1	0,50	1	0	0	0,01	A	A
Score 250 EC (max 3x), 75% driftreductie ²	mrt-aug	0,5	0,13	0	0	0	0,00	A	A
Score 250 EC (max 3x), 75% driftreductie ²	sept-feb	0,5	0,13	25	0	0	0,00	A	A
Signum (max 3x)	mrt-aug	1	0,33	53	0	1	0,03	?	?
Signum (max 3x)	sept-feb	1	0,33	80	0	1	0,02	?	?
Plaagbestrijding									
Bacillus thuringiensis (Delfin)	jan-dec	0,5	0,50	0	0	0	0,00	A	A
Bacillus thuringiensis (Dipel Es, Scutello L)	jan-dec	0,9	0,90	0	0	0	0,00	A	A
Bacillus thuringiensis (Xentari, Turex)	jan-dec	1	0,54	0	0	0	0,00	A	A
Decis micro	jan-dec	0,12	0,01	0	0	52	0,00	B	C
deltamethrin (25 g/l)	jan-dec	0,3	0,01	0	0	51	0,00	B	C
Dimethoaat (tot 16 ^e bladstadium) ³	mrt-aug	0,5	0,20	0	0	1	0,01	C	C
Dimethoaat (tot 16 ^e bladstadium) ³	sept-feb	0,5	0,20	20	1	1	0,01	C	C
Ferramol ecostyle slakkenkorrels	jan-dec	30	0,30	0	0	0	0,00	?	?
Karate Zeon, 75% driftreductie ²	jan-dec	0,05	0,01	0	0	5	0,00	C	C
Methaldehyde-slakkenkorrels (1-3 t/m 31-8)	mrt-aug	7	0,45	0	0	0	0,35	A	A
Nomolt	jan-dec	0,4	0,06	0	0	840	0,00	B	B
Pirimor	mrt-aug	0,5	0,25	125	2	55	0,06	A	A
Pirimor	sept-feb	0,5	0,25	200	2	55	0,04	A	A
Plenum	mrt-aug	0,4	0,20	0	0	0	0,01	A	A
Plenum	sept-feb	0,4	0,20	0	0	0	0,00	A	A
Spruzit	mrt-aug	1	0,20	2	0	727	0,06	A	A
Spruzit	sept-feb	1	0,20	160	140	727	0,04	A	A
Steward (max. 3 per teelt: 6x per jaar)	mrt-aug	0,085	0,03	0	0	1	0,00	B	A
Steward (max. 3 per teelt: 6x per jaar)	sept-feb	0,085	0,03	1	0	1	0,00	B	A
Sumicidin super (max. 2 toep./jaar) ²	jan-dec	0,2	0,01	0	0	1	0,00	C	C
Tracer (max. 4 toep), 90% driftreductie ^{3,4}	mrt-aug	0,2	0,10	134	3	1	0,00	?	?
Tracer (max. 4 toep), 90% driftreductie ^{3,4}	sept-feb	0,2	0,10	170	3	1	0,00	?	?
Tracer, op tray ^{3,5}	mrt-aug	0,3	0,14	201	4	9	0,00	?	?

¹ Niet in grondwaterbeschermingsgebieden.² Voor dit middel gelden drifbeperkende maatregelen: drift = 0,25%.³ Niet in broccoli.⁴ Voor dit middel gelden drifbeperkende maatregelen: drift = 0,1%.⁵ Indien op tray toegepast max. 1 gewasbehandeling.

Legenda

Grondwater

Waterleven

Lucht

Nuttige organismen

Eenheid

MBP

MBP

kg a.s./ha

A Bruikbaar in geïntegr. teelt

Kleuren

≤ 100

≤ 10

≤ 0,12

B Beperkt bruikbaar

> 100 en ≤ 1000

> 10 en ≤ 100

> 0,12 en ≤ 0,42

C Niet bruikbaar

> 1000

> 100

> 0,42

? Risico niet bekend

Toelichting en streefwaarden

- Met de Milieu-effectenkaart is het mogelijk om bestrijdingsmiddelen te vergelijken op het risico voor uitspoeling naar grondwater, water-ven in de sloot, vervluchtiging naar de lucht en nuttige organismen. Het risico voor uitspoeling naar het grondwater is weergegeven in Milieubelastingspunten (MBP). Een score van 100 MBP komt overeen met de toelatingsnorm van het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb). De milieubelasting voor waterleven wordt bepaald door de hoeveelheid drift. Deze kaart gaat standaard uit van 1% drift. Voor middelen waarvoor op het etiket extra driftbeperkende maatregelen zijn voorgeschreven is gerekend met een lager driftpercentage (zie voetnoot). Met onderstaande tabel kunt u het drift% behorende bij uw eigen situatie bepalen en de specifieke MBP's berekenen.
- De vervluchtiging naar de lucht is weergegeven in kg actieve stof/hectare. Streefwaarde in Telen met toekomst is 0,42 kg a.s./ha. De waarden op de kaart zijn afkomstig van Alterra en RIVM.
- Het risico voor waterleven is weergegeven in Milieubelastingspunten (MBP). Een score van 10 MBP komt overeen met de toelatingsnorm van het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb). Het risico voor uitspoeling is vaak afhankelijk van de hoeveelheid neerslag die valt. Daarom is op deze kaart (indien relevant) onderscheid gemaakt in toepassingsstijdstip. In het najaar regent het immers meer dan in het voorjaar.
- Het risico voor waterleven is weergegeven in Milieubelastingspunten (MBP). Een score van 10 MBP komt overeen met de toelatingsnorm van het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb). Het risico voor uitspoeling is vaak afhankelijk van de hoeveelheid neerslag die valt. Daarom is op deze kaart (indien relevant) onderscheid gemaakt in toepassingsstijdstip. In het najaar regent het immers meer dan in het voorjaar.

Drift%, afhankelijk van de breedte van de teeltvrije zone en het type spuit.

Teeltvrije zone (cm)	Volveldsspuit (%)	Volveldsspuit + kantdoppen (%)	Volveldsspuit + driftarmedoppen 50% driftreductie (%)	Volveldsspuit + driftarmedoppen 75% driftreductie (%)	Volveldsspuit + driftarmedoppen 90% driftreductie (%)	Lucht-ondersteuning (%)	Rijensputten (%)
0	5,00	4,50	2,50	1,25	0,50	2,35	2,50
25	5,00	4,50	2,50	1,25	0,50	2,35	2,50
50	5,00	4,50	2,50	1,25	0,50	2,35	2,50
75	5,00	4,50	2,50	1,25	0,50	2,35	2,50
100	4,35	3,92	2,18	1,09	0,44	2,04	2,18
125	3,70	3,33	1,85	0,93	0,37	1,74	1,85
150	3,05	2,75	1,53	0,76	0,31	1,43	1,53
175	2,40	2,16	1,20	0,60	0,24	1,13	1,20
200	2,21	1,99	1,11	0,55	0,22	1,04	1,11
225	2,03	1,82	1,01	0,51	0,20	0,95	1,01
250	1,84	1,65	0,92	0,46	0,18	0,86	0,92
275	1,65	1,49	0,83	0,41	0,17	0,78	0,83
300	1,36	1,23	0,68	0,34	0,14	0,64	0,68
325	1,08	0,97	0,54	0,27	0,11	0,51	0,54
350	0,79	0,71	0,39	0,20	0,08	0,37	0,39
375	0,50	0,45	0,25	0,13	0,05	0,24	0,25
>375	0,50	0,45	0,25	0,13	0,05	0,24	0,25

Informatie

- Het risico voor bestrijders (natuurlijke vijanden zoals sluiwespes, lieveheersbeestjes, roofmijten) en bestuivers (bijen en hommels) is weergegeven met een symbool. Dit symbool geeft de bruikbaarheid in geïntegreerde teelt weer en is een samenvoeging van de effect-ten van bestrijdingsmiddelen voor elk afzonderlijk nuttig organisme. Meer gedetailleerde informatie kunt u vinden in de neveneffectengids van de verschillende leveranciers van nuttige organismen.

Deze kaart is opgesteld door Telen met toekomst, in samenwerking met CLM. De punten voor grondwater en waterleven zijn afgeleid van de CLM-Milieumeetlat. De BRL lucht is afkomstig van PO, Alterra en RIVM en de symbolen voor nuttige organismen zijn gebaseerd op de neven-effectengids van Kopert Biological Systems. Voor meer informatie kunt u terecht bij uw begeleider van Telen met toekomst. De Milieu-effectenkaarten zijn digitaal verkrijgbaar op www.telenmettoekomst.nl.

Aansprakelijkheid

CLM en Telen met toekomst aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van eventueel in de Milieu-effectenkaart voorkomende onjuistheden en voor onbedoeld gebruik van de kaart.