



Rassenbulletin Cichorei 2002

Dit rassenbulletin geeft de resultaten weer van het Cultuur- en Gebruikswaarde Onderzoek van cichorei. In 2002 heeft het onderzoek plaatsgevonden op drie locaties in Nederland. Twee proeven lagen op de zuidwestelijke kleigronden, nl. één in Vogelwaarde in Zeeuwsch-Vlaanderen en één in Colijnsplaat op Noord-Beveland. De derde proef lag op de zuidoostelijke zandgronden, nl. in Vredepeel.

De financiële opbrengst is gebaseerd op de rasverschillen in wortelopbrengst en inulinegetal. Eventuele verschillen in grondtarra zijn niet meegenomen. Deze verschillen lijken klein te zijn en konden tot nu toe niet betrouwbaar worden vastgesteld.

Eigenschappen (gem. 1999 t/m 2002), opbrengsten en gehalten (gem. 1997 t/m 2002)
van cichoreirassen.

		Verhoudingsgetallen						
		Vroegheid grondbedekking	Loofhoeveelheid	Schietterresistentie	Wortelopbrengst	Inulinegetal	Inuline-opbrengst	Financiële opbrengst**)
Rassenlijstrassen*)								
A	Arancha	7,0	6,0	9,0	104	98	102	101
A	Hera	7,5	7,5	8,5	99	99	98	97
A	Orchies	7,0	6,5	8,5	99	99	97	97
B	Bergues	7,5	8,0	7,5	105	95	99	97
N	Melci	7,5	7,0	7,5	105	101	105	106
N	Arioso	7,0	7,0	8,5	101	100	101	101
Rassen met schietergevoeligheid								
N	Nausica	7,5	7,5	5,0	99	100	99	99
N	Faste	7,0	6,5	5,0	97	104	101	102
2 jaar onderzocht								
	CHIC0103	7,0	7,5	9,0	102	101	103	104
100 = ..ton/ha, -, ton/ha, euro/ha					58,6	17,4	10,2	2654

*: Rubricering in Rassenlijst 2003

** : De financiële opbrengst is berekend op basis van 59 euro per ton netto cichorei en 0,55 euro per ton cichorei per 0,1 punt lager of hoger dan 16 inulinegetal

© Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, december 2002, ir. L. van den Brink.

Het PPO stelt zich niet aansprakelijk voor eventuele schadelijke gevolgen die kunnen ontstaan bij gebruikmaking van de gegevens.