

Ivan Van Waes teelt gras in een strikt systeem van vijfjaarlijkse teeltrotatie

Groeitrappen in het gras

De zandgronden van Ivan Van Waes in Zaffelare zijn bovengemiddeld vruchtbaar. Elk perceel leent zich goed voor de teeltrotatie met mais, graan en gras. De variatie in het zand, van grof en fijn tot lemig, zet aan tot groeitrappen in het gras.

tekst **Annelies Debergh**

In de verte spuwt de industrie in het Gentse havengebied gigantische witte rookpluimen de lucht in. Het beeld contrasteert met de groene plattelandssfeer rond het bedrijf van Ivan Van Waes en Kristien Van Nieuwerburgh in Zaffelare. In totaal heeft Ivan Van Waes (39) 25 hectare grasland, waaronder vijf hectare grasklaver, naast een tiental hectare Italiaans raaigras.

De tussenteelt Italiaans raaigras in combinatie met mais zorgt voor extra spreiding in de grasgroei. 'Zo kan ik meer percelen weidegras maaien en zijn de weiden in het voorjaar minder bevuild.' Het aandeel ziet de melkveehouder niet groeien. 'Ik heb mais graag op tijd gezaaid. Met meer dan tien hectare Italiaans raaigras is dat arbeidstechnisch moeilijk haalbaar.'

Jongvee na de koeien

De 85 koeien leveren een rollend jaargemiddelde van 10.818 kg melk met 4,00% vet en 3,38% eiwit bij een tussenkalftijd van 391 dagen. In de winter bestaat een derde van het rantsoen uit voordroogkuil. De koeien zijn in de zomer enkel overdag buiten. Na de graspiek in het voorjaar krijgen ze afhankelijk van de grasgroei voordroogkuil bijgevoerd, zegt Van Waes. 'Bij de koeien is het mogelijk om in de stal bij te sturen. Het moeilijkste punt in dit systeem is om voldoende gras te hebben voor het jongvee.'

Een doorsnee weideseizoen start vanaf half maart. De Oost-Vlaamse melkveehouder deelt het grasareaal elk jaar in drie delen in: op een derde wordt ingeschaard, de rest wordt eerst bemest en gemaaid. 'Naargelang het maaitijdstip op de andere percelen laat ik de koeien ook de tussenteelt Italiaans raaigras begrazen. Daarna wissel ik om en komen de koeien op de gemaaide percelen. Vanaf

een maaipercentage van honderd procent komt ook het jongvee op de wei.'

Het vochtdoorlatende zand gaf afgelopen zomer geen aanleiding tot te weinig gras. 'Het is een goeddragende zandgrond, niet echt arm. De bodemsamenstelling varieert van grof en fijn tot lemig zand. Dat helpt bij het creëren van groeitrappen. Ik heb trouwens liever een droge zomer met minder gras van uitstekende kwaliteit dan een natte zomer en enorme

grasopbrengsten van mindere kwaliteit.' In een intensieve teeltrotatie komt er na vier jaar mais een jaar graan en vervolgens vijf jaar gras. 'Graslandvernieuwing past uitstekend na de graanoogst. Het gras kan op tijd worden gezaaid en voor de winter wordt de nieuwe weide door het jongvee nog een keer begraasd en vervolgens gebloot.'

Voor de herinzaai kiest Ivan Van Waes een mengsel met zestig procent tetraploïd en veertig procent diploïd Engels raaigras. 'Omdat ik een weiland minstens elke vier jaar wil scheuren, kies ik liever geen al te dure mengsels.' Van Waes gaat prat op een goed onderhoud van de percelen. Een adequate mollenbestrijding, afsluiten van vertrapte grasplekken en een afhellende plaatsing van pompen behoren tot de aanpak. 'Intensief grasland beheren vergt veel tijd en arbeid, maar rendeert enorm.'



Ivan Van Waes: 'Omdat ik een weiland minstens elke vier jaar wil scheuren, kies ik liever geen al te dure mengsels'