

Werkzaamheden in april

De volken zitten sinds het verenigen op één honing-plus één broedkamer. Dat is anderhalve bak ruimte voor het broed, zoals ik de vorige keer al aangaf. Daarop komt een moerrooster, als half april ook de eerste 'echte' honingkamer op de volken gaat. Er komt echter pas een honingkamer op, zodra de bijen flink bouwen tussen de toplatten en de glazen dekplank, die nu haar waarde bewijst! Eerder ruimte geven zet de bijen enorm terug vanwege de kou, die ze dan te verduren krijgen. Indien nodig krijgen ze een tweede honingkamer op de eerste. (Meestal is één honingkamer genoeg in onze omgeving). Met één goed gevulde bak voorjaarshoning (ca. 23 potjes honing) ben ik dik tevreden.

Selectie

April is de maand om voorbereidingen te treffen voor de teelt van nieuwe moeren. Met een klein aantal volken is selectie moeilijk en vaak niet eens zinvol. Dat laat deze kleine man daarom over aan de grote mannen. *Telen* (vermeerderen) kan iedereen. Vandaar dat ik van tijd tot tijd, teeltmateriaal betrek van anderen. De laatste jaren is daar weinig van terecht gekomen, vanwege het Amerikaans vuilbroed. Nu bestaan mijn volken onderhand uit F16's in de plaats van F1's en dat is te merken aan het zwermgedrag en de grotere prikkelbaarheid. Dit jaar ben ik van plan om weer nieuwe larfjes te betrekken van raszuivere moeren.

Hierna volgen enkele tips; hoe u eenvoudig goede moeren kunt telen zonder veel poespas.

Overlarfdag

Voor de doorsnee imker is het handig om de *selectie* aan een ander over te laten en de *teelt* (vermeerdering) van hoogwaardig materiaal zelf ter hand te nemen. Dat kan door larven op een overlarfdag te halen en deze zelf verder op te kweken.

Handige tips voor eenvoudige moerenteelt

Maak van uw hoofdvolk tien dagen voor een overlarfdag een kunstzwerm. Breek op de overlarfdag 's morgens alle doppen in de hoofdvolk. Haal 's middags per volk 2 à 3 larven. Erg handig zijn houten stopjes met daaraan een kunststof dopje. Hang deze boven tussen de raten (gewoon ertussen klemmen). De volken zullen zich inmiddels goed moerloos voelen en de larfjes prima verzorgen, omdat het er weinig

zijn. Na 13 dagen (tuter) de kunststofdoppen verwijderen. Dat kan simpel door ze boven tussen de toplatten uit te pakken (de eigen doppen waren immers al weg!). De moeder loopt meteen uit in het volk waar ze moet komen.

Voordelen van deze werkwijze zijn: geen apart pleeg- en teeltvolk nodig; invoeren van moeren lukt voor 100%. Geen toestanden met starters en dergelijke en als 'kleine' imker kunt u toch hoogwaardig teeltmateriaal gebruiken. Een nadeel is dat in de hoofdvolk pas een week later een jonge moeder aan de leg kan zijn, dan normaal het geval geweest zou zijn.

Opmerkingen

1. Gebruik kunststof overlarfdopjes. Dit in verband met het verspreiden van ziekten (Amerikaans vuilbroed!)
2. Door de moerenteelt met enkele volken circa 9 à 10 dagen te beginnen, voordat van de resterende volken de kunstzwerm wordt gemaakt, hebt u de mogelijkheid om de rest van de volken meteen een gesloten dop met een overgelarfd moeder te geven. Deze volken hebben dan geen tijdverlies! Wel na circa 10 à 11 dagen de eigen doppen breken, als die nog aangezet mochten zijn! In elk geval breken voordat er kwakers komen!
3. Voor een goede verzorging is het zeer wenselijk om de dopjes *tussen de toplatten van het broednest* te klemmen, *niet in de honingkamer*. Anders worden ze bij slecht weer verlaten!
4. Kijk na 9-10 dagen of elk volk minimaal één goede dop heeft. Ze kunnen nu gemakkelijk verdeeld worden. Vaak lukken ze allemaal, of juist niet een! Op deze manier is dit probleem snel te verhelpen.
5. Wenst u toch enkele reservevolkjes op te zetten, dan kan dat simpel als volgt: Gooi bij het verwijderen van de twee overtollige doppen uit elk volk niet alles weg, maar gebruik enkele mooie exemplaren om enkele 3-ramertjes mee te voorzien van een moeder.
6. Hebt u na het maken van een reservevolkje nog goede doppen over, help dan een hopeloos moerloze collega vooruit. Veel succes!

Voor een uitgebreide versie over selectie: zie de volgende bijenbladen:

Bijenteelt 62(9): 170-173 (1985)

Bijenteelt 62(10): 199-201 (1985)

Bijenteelt 62(11): 214-217 (1985)

Bijenteelt 63(5): 101-103 (1986).