

Uitwendige parasieten:

Luizen


Ringschurft / ringworm

Schurftmijten

Maagdarmwormen

Luizen

Levenscyclus	Volwassen luizen leggen eitjes die vastkleven aan de haren van de geit. Na enkele vervellingen ontstaat uit de larve een volwassen luis. Zowel de volwassen luizen als de eitjes (neten) zijn met het blote oog zichtbaar. Luizen kunnen buiten de geit slechts korte tijd overleven.
Soorten	Er zijn bloedzuigende en bijtende luizen. Bijtende luizen leven van huidschilfers, haren en huidkliersecreten. Bloedzuigende luizen leven van bloed. Zij hebben stekende monddelen waarmee zij de huid doorboren.
Symptomen	Jeuk, eczeem, kaalheid, huidontsteking, vermagering, onrust. De geiten likken en schuren zich opvallend vaak. Zo ontstaan likplekken in de haren. De symptomen treden meestal op in het najaar, soms ook in het voorjaar.
Preventie	Quarantaine en behandeling van nieuw aangekochte geiten om insleep te voorkomen.
Behandeling	Er zijn diverse middelen verkrijgbaar voor de behandeling tegen luizen. Het meest toegepast zijn de in water oplosbare middelen, waarmee de geiten met behulp van een rugspuit van top tot teen worden natgespoten. De gebruikte middelen zijn giftig, dus gebruik een spuitmasker en reinig de uiers voor het melken zorgvuldig. Ook zijn er sputopmiddelen, die u op de rug van de geiten aanbrengt en middelen die bij de geit worden ingespoten. Het nadeel van de injectievloeistoffen is dat zij alleen werken tegen bloedzuigende luizen. De laatst genoemde middelen zijn duurder dan de oplosbare middelen. Lees voor het gebruik van alle middelen altijd zorgvuldig de gebruiksaanwijzing. Behandel altijd alle dieren die in dezelfde stalruimte aanwezig zijn, ook de dieren die (nog) geen verschijnselen hebben.



Ringschurft (Ringvuur, ringworm, trichophytie)

Oorzaak	Ringschurft wordt veroorzaakt door een schimmel (Trichophyton verrucosum). Deze schimmelinfectie is ook besmettelijk voor de mens.
Symptomen	Ringschurft is te herkennen aan ronde, kale asbestachtige plekken, met name rond de neus en ogen; maar ook op andere delen van het lichaam kan ringschurft worden aangetroffen. Na 4 tot 6 maanden treedt in het algemeen spontaan herstel op.
Preventie	Koop geen besmette dieren. Zet nieuw aangekochte dieren in quarantaine en behandel ze preventief. Zorg voor een goede ventilatie en voldoende licht in de stal. Na een besmetting de stal goed reinigen. Schimmelsporen kunnen overleven op afscheidingen en voerhekken. Reinigen met heet water is effectiever dan met koud water. Eventueel de stal nabehandelen met een schimmelbestrijdend middel. Behandeling In water oplosbare middelen toepassen, met een rugspuit aanbrengen op de geiten. Lees eerst de gebruiksaanwijzing. De middelen zijn giftig. Gebruik altijd een spuitmasker en reinig de uier voor het melken zorgvuldig.

Schurftmijten

Levenscyclus	Volwassen schurftmijten produceren eitjes die aan de haren vastkleven of in de huid worden gelegd. Na 3 tot 5 dagen komen deze eitjes uit. De totale levenscyclus varieert van 14 tot 28 dagen.
Oorzaak	Schurftmijten zijn kleine achtpotige diertjes, die met het blote oog niet zichtbaar zijn. Zij komen op meerdere plaatsen van het lichaam voor met name op de rug, de hals en rond de staartwortel. Schurftmijten komen uitsluitend voor bij geiten en runderen.
Symptomen	Kale plekken op de uierspiegel en op dichtbehaarde delen van de huid. Bij sommige soorten schurftmijten treedt een sterke verdikking van de huid op, waarbij plooien worden gevormd, met name op de hals.
Preventie	Koop geen besmette dieren. Zet alle nieuw aangekochte dieren in quarantaine en behandel ze preventief.
Behandeling	Met behulp van een rugspuit brengt u in wateroplosbare middelen aan op de geit. De geit van top tot teen behandelen voor een goed resultaat. Lees voor het gebruik zorgvuldig de gebruiksaanwijzing. Denk aan uw eigen veiligheid: gebruik een spuitmasker en reinig de uiers voor het melken zorgvuldig.