



RASSEN BULLETIN

ZOMERTARWE 2008

In dit rassenbulletin staan de opbrengsten en eigenschappen weergegeven van zomertarwe rassen. Het rassenonderzoek heeft in 2007 plaatsgevonden op 4 locaties op klei- en zandgrond, verspreid over Nederland. In de tabel zijn de eigenschappen en de opbrengsten, met en zonder ziektenbestrijding, (gemiddeld over de jaren 2002 t/m 2007), weergegeven. Er waren in 2007 2 nieuwe 1^e jaarsrassen in onderzoek.

Overzicht van de rasseneigenschappen en korrelopbrengst bij zomertarwe (gemiddeld over de jaren 2002 t/m 2007)

Een hoog cijfer duidt op een gunstige waardering van de betrokken eigenschap. Vroege afrijping wordt door een hoog cijfer aangeduid.

	lengte stro (rel)	Stevigheid	Vroegheid aar	Vroegrijpheid	Resistentie tegen:					Opbrengst klei (rel)		Opbrengst zand (rel)		
					Schot ¹⁾	Bruine Roest	Gele roest ¹⁾	Meeldauw ¹⁾	Bladvlekkenziekte	met ziektenbestrijding	zonder ziektenbestrijding	met ziektenbestrijding	zonder ziektenbestrijding	
Rassenlijststrassen														
A	Pasteur	100	7,5	7,5	6,5	6,5	9,0	„	8,0	7,5	92	92	94	103
A	Quattro	110	8,0	6,5	6,5	6,0	8,5	„	8,0	7,0	99	99	95	98
A	Tybalt	95	8,0	6,5	6,5	8,5	8,5	„	8,5	7,0	107	104	106	105
A	Zirrus	100	8,0	8,0	6,5	8,0	8,5	„	8,0	7,5	102	107	104	105
N	Trappe	104	8,0	7,0	6,5	7,5	7,5	„	7,5	7,5	107	109	103	95
B	Baldus	93	8,0	8,5	8,0	8,0	7,0	6,5	6,0	6,5	93	89	98	93
B	Lavett	109	7,0	7,5	7,5	8,5	7,0	7,0	8,5	6,0	95	94	90	91
		100=..cm	94						100=.. Ton/ha	8,3	7,8	7,6	6,9	

¹⁾ Rassenlijstcijfers zijn ongewijzigd t.o.v. rassenlijst 2007, omdat er geen nieuwe waarnemingen toegevoegd zijn.

„ Geen gegevens beschikbaar