

RASSEN BULLETIN ZOMERTARWE 2009

In dit rassenbulletin staan de opbrengsten en eigenschappen weergegeven van zomertarwe rassen. Het rassenonderzoek heeft in 2008 plaatsgevonden op 4 locaties op klei- en zandgrond, verspreid over Nederland. In de tabel zijn de eigenschappen en de opbrengsten, met en zonder ziektenbestrijding, (gemiddeld over de jaren 2003 t/m 2008¹), weergegeven.

Overzicht van de rasseneigenschappen en korrelopbrengst bij zomertarwe (gemiddeld over de jaren 2003 t/m 2008)

Een hoog cijfer duidt op een gunstige waardering van de betrokken eigenschap. Vroege afrijping wordt door een hoog cijfer aangeduid.

	Lengte van het stro	Stevigheid van het stro	Vroegheid in de aar komen	Vroegrijpheid	Resistentie tegen:					Korrelopbrengst (relatief)				
					Schof ²⁾	Bruine roest	Gele roest ³⁾	Meeldauw	Bladvlekkenziekte	Kleigrond		Zand- en dalgrond		
										Met ziektebestrijding	Zonder ziektebestrijding	Met ziektebestrijding	Zonder ziektebestrijding	
²⁾ Rassenlijstnamen														
A Quattro	108	8	6,5	6,5	6,0	8,5	..	8	7	98	97	95	97	
A Trappe	102	8	7	6,5	7,5	7,5	..	7,5	7,5	105	107	102	95	
A Tybalt	93	7,5	6,5	6,5	8,5	8,5	..	8,5	7	107	102	106	104	
A Zirrus	98	8	8	6,5	8	8,0	..	8	7,5	102	105	105	103	
B Baldus	91	7,5	8,5	8	8	7	6,5	6	6,5	92	87	98	93	
B Lavett	109	7,5	7,5	7,0	8,5	7,5	7	8,5	6	95	93	90	91	
B Pasteur	98	7,5	7,5	6,0	6,5	9	..	8	7,5	88	89	93	101	
100 = cm ; ton/ha	94									8,1	7,6	7,5	7,1	

- 1) Lengte van het stro en korrelopbrengsten zijn weergegeven in verhoudingsgetallen. Hoge waarderingscijfers betekenen goede stevigheid van het stro, vroeg in de aar komen, vroeg rijp en goede resistenties. .. : onvoldoende gegevens beschikbaar.
- 2) Rubricering op de Rassenlijst 2009: A = Algemeen aanbevolen ras, B = Beperkt aanbevolen ras.
- 3) Rassenlijstcijfers zijn ongewijzigd t.o.v. rassenlijst 2008, omdat er geen nieuwe waarnemingen zijn toegevoegd.