

Ik heb bij mijn kippen last van vogelmijt. Wat kan ik daar tegen doen?

Antwoord :

Vogelmijt (in de volksmond bloedluis) is een wijd verbreid probleem in de pluimveehouderij aan het worden. Bestrijding is lastig en het effect is, afhankelijk van de nauwkeurigheid en intensiviteit, één tot drie maanden merkbaar. Er vanaf komen is bijna onmogelijk. Zelfs het opwarmen (2 dagen 55°C met een RV onder de 10%) tussen twee koppels is geen garantie voor een bloedluisvrije stal.

In de biologische landbouw kunnen we gebruik maken van de volgende methoden:

- De bloedluizen bestrijden met een mengsel van groene zeep en spiritus (verhouding 1 op 1). Dit wordt ook wel toegepast tegen bladluizen.
- Het spuiten met biodiesel op de plekken waar de bloedluizen zich bevinden. Biodiesel heeft een dodelijk effect doordat ze de uitwendige ademhalingsopeningen op de rug van de bloedluis verstoppen. Gebruik 1 a 2 liter per 50 kipplaatsen (grondige bestrijding).
- Knoflook verstrekken door het drinkwater. Doordat het bloed van de kippen een knoflooksmaak krijgt zijn de bloedluizen minder geneigd de kippen lastig te vallen.
- De plekken waar de bloedluizen zich bevinden met een brander behandelen (alleen bij kleinere stallen).

Zie ook de rubriek

www.biologischeveehouderij.nl

Deze vraag is beantwoord op: 22-8-2003