

Vanaf +- 15 juli tot 8 oktober voer ik het melkvee snijmaïs bij (circa 15 kg per koe per dag). Ik doe dit om trommelzucht te voorkomen en om het eiwitoverschot te beperken. Het eerste lukt prima, het tweede maar matig. Het is nogal duur en bewerkelijk. Bovendien moet ik ze dit jaar 's nachts binnen houden om 15 kg opname te halen. Is er een alternatief?

Antwoord :

Een hoeveelheid van 15 kg snijmaïs (= 4-5 kg ds) is ruim als bijvoeding tijdens de weideperiode, maar over het algemeen wel effectief om de eiwitbenutting te verbeteren. U kunt de hoeveelheid bijvoeding verminderen, zodat de koeien het weer in een kortere periode kunnen opnemen en beweiding 's nachts ook weer mogelijk is. Om de kosten te drukken kunt u behalve minder bijvoeren, ook overstappen op graskuil met een relatief laag eiwitgehalte (liefst balen in verband met voersnelheid). Dit kan beheerskuil of -hooi zijn, maar hier kunt u niet te veel van bijvoeren zonder een productiedaling te zien: maximaal circa 3 kg ds. Om de eiwitbenutting echter te verhogen is het bijvoeren van laag-eiwit-graskuil veelal minder effectief dan het bijvoeren van snijmaïs.

U kunt meer informatie vinden over de economie van bijvoeren in het weideseizoen in Vlugschrift 139, te downloaden via www.louisbolk.nl

Deze vraag is beantwoord op: 22-9-2005