



Rassenbulletin CORN COB MIX 2006

Voor een juiste rasvergelijking en -adviesing wordt door het Praktijkonderzoek Plant & Omgeving (PPO-AGV) te Lelystad jaarlijks een viertal rassenproeven aangelegd. In 2005 zijn de proeven uitgevoerd te Raalte, Doetinchem, Vredepeel en Bavel. De tabel geeft de gemiddelde resultaten weer van het Cultuur- en Gebruikswaarde Onderzoek van Corn Cob Mix. De aanbevelingen zijn conform de Aanbevelende Rassenlijst voor Landbouwgewassen 2006. In de waarderings- en opbrengstcijfers zijn de resultaten van 2005 meegenomen. Hoge cijfers betekenen een gunstige waardering voor de betrokken eigenschap.

Overzicht van de raseigenschappen bij Corn Cob Mix (CCM). Gemiddelden over de jaren 2000 t/m 2005 ¹⁾											
Rassenlijst rubriek ²⁾ Rasnaam / -code	Beginontwikkeling	Vroegheid bloei	Plantlengte	Oogstbaarheid ³⁾	Resistentie stengelrot	Stevigheid	Dorsbaarheid	Korrel			
								Vroegrijpheid	Drogstofgehalte	Drogstofopbrengst	
Rassenlijst											
A Ohio	8	9	95	7.5	7	8.5	8.5	8.5	104	97	
A Alliance	7	7.5	100	8	8	8.5	7.5	7	99	101	
A Rivaldo	8	8	106	8.5	8	8	7	6	97	103	
B Cerruti	7	8	97	7	6.5	8	7.5	6.5	99	99	
N Companero	9	8.5	103	7.5	7	9	8.5	8	102	99	
Nieuw op Rassenlijst 2006											
N LG3212	8	7	108	7.5	8	6	8	7.5	100	102	
N ES Ballade	8	9	102	8	8	7.5	8.5	8	103	101	
N Ambiance	7	7	99	9	9	9	8	6	96	104	
3 jaar onderzocht											
Auxxel	7	7.5	102	8.5	8.5	8.5	6.5	7.5	100	99	
DKC2949	5.5	7	98	6	5.5	8.5	7	6.5	99	108	
Carletto	7.5	7.5	107	6.5	6	7	8	7	99	107	
KXA2241	8.5	8	108	7	6.5	8	8	7	100	107	
2 jaar onderzocht											
ADV3042	7	7	96	8	7	9	8	7	99	101	
A5471	6.5	7	110	9	9	8	8	8	102	101	
KX2030	8.5	7.5	111	6.5	6.5	6.5	7.5	6.5	97	111	
DUO408	7.5	6.5	106	8.5	8	8.5	8	5.5	95	106	
NX0433	7	6.5	108	8.5	8	7.5	8.5	8	103	105	
X0773G	6	6.5	102	7.5	7	8.5	7.5	5.5	96	104	
100 = ... Resp. in cm, % en ton/ha									273	70.2	10.07

Bron: Persbericht 239 van de Commissie voor de Samenstelling van de Rassenlijst voor Landbouwgewassen en PPO-AGV.

1) Plantlengte, drogestofgehalte en drogestofopbrengst in verhoudingsgetallen.

2) Rubricering op Rassenlijst 2006: A = Algemeen aanbevolen ras; B = Beperkt aanbevolen ras; N = Nieuw aanbevolen ras.

3) De oogstbaarheid duidt op de kans op omgevallen planten door zowel een stengelrotaantasting als door gebrek aan stevigheid, beide eigenschappen zijn ook afzonderlijk weer gegeven.

Voor Corn Cob Mix is de korrelopbrengst de belangrijkste eigenschap. Daarnaast zijn de vroegrijpheid van de korrel en de oogstbaarheid belangrijk, omdat er een vrij droog product geoogst moet worden. Een te nat geoogst product is moeilijk te malen. Het belang van de eigenschap dorsbaarheid is afhankelijk van het gewenste percentage spil in het geoogste product.

© Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V., november 2005, J. Groten.

PPO stelt zich niet aansprakelijk voor eventuele schadelijke gevolgen die kunnen ontstaan bij gebruikmaking van de gegevens.