

Q RIVIERKLEI-VEEN-INVERSELANDSCHAP

Qs	Veenstroomruggonden
Qk	Komkleigronden langs de veenstroomruggen
Qks	Komkleigronden op veenstroomrug
Qkvs	Komkleigronden op veen op veenstroomrug
Qkv	Komkleigronden op veen
- - -	Stroombeddingen opgevuld met zware klei en/of veen.
Ro	Overslaggronden
Zs	Donken
-	Vergraven, uitgegraven en opgehoogde gronden

LEGENDA

R RIVIERKLEILANDSCHAP

Ra	Oevergronden
Rak	Oevergronden op komklei
Rs	Stroomruggonden
Rsk	Stroomruggonden op komklei
Rk	Komkleigronden

a - a	Lekoeverwal
b - b	Hagesteijnse rug
c - c	Tienhovense rug
d - d	Zijderveldse rug
e - e	Schoonrewoerdse rug
f - f	Schaikse rug
g - g	Linge oeverwal

SCHAAL 1: 50000


0 1 2 3 km

Alle rechten voorbehouden

Kleurendruk verzorgd door het Ministerie van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening, Bureau van den Hoofdingenieur.

VIJFHERENLANDEN
GRASLANDVEGETATIECARTOGRAM
GRASSLAND VEGETATION MAP

SCHAAL 1:50000
SCALE



Karakteristiek Characteristic	% van alle percelen % of all lots	behorende tot de belonging to the
tijdelijk te nat temporarily too wet	— — — — — >50	25-50 vochtige variant humidity variant
tijdelijk te droog temporarily too dry	+ + + + + >50	30-50 droge variant drought variant
te arm too poor	• • • • • >50	< 50 arme variant poor variant

LEGENDA
LEGEND

Nr	Karakteristiek Characteristic	verdeling over de graslandgroepen distribution over the grassland groups								
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX
1	zeer goed, >50% engels raigras very good, >50% perennial rye grass	24	7	1	-	-	-	-	-	-
2	goed, 30-50% engels raigras good, 30-50% perennial rye grass	49	25	12	4	4	1	-	-	4
3	voldoende, 15-30% engels raigras satisfactory 15-30% perennial rye grass	21	39	48	27	18	17	-	13	11
5	matig, florin dominant moderate, florin dominant	-	2	1	3	1	-	-	2	4
7	onvoldoende, >30% armoede aanwijzers unsatisfactory, >30% poverty indicating species	-	-	-	2	1	10	56	-	4
8	te nat, >25% vocht aanwijzende soorten too wet, >25% humidity indicating species	-	2	2	1	6	2	33	23	55
9	goed hooiland, >25% beemdvossestaart good hay fields, >25% meadow foxtail	1	-	3	-	13	-	-	2	-
11	matig, overheersing van matige soorten zoals florin en witbol moderate, dominance of moderate species viz. florin and meadow soft grass	5	25	33	63	57	70	11	60	22

- Osier beds
- Orchard
- Arable land
- Pasture
- Hay fields
- Mixed use
- Roads
- Ditches
- Scour holes

