

Meer IBR-uitbraken in Nederland

In de tweede helft van 2012 zijn er meer IBR-uitbraken geweest dan normaal gesproken in dezelfde tijd van het jaar. Van 18 bedrijven die in de maand juli neusswabs hebben ingezonden voor het aantonen van IBR-virus (met de PCR), bleek op de helft sprake te zijn van een IBR-uitbraak.

Opvallend is dat 6 van deze uitbraken in Friesland plaatsvonden. Over het hele 3e kwartaal van 2012 zijn van 77 bedrijven neusswabs ingestuurd. In 24 (= 31%) van deze neusswabs werd IBR-virus gevonden. Normaal gesproken wordt er in ongeveer een kwart van de ingezonden neusswabs IBR-virus gevonden (waarbij de meeste uitbraken in de winter plaatsvinden). Ter vergelijking: in het 3e kwartaal van 2011 zijn van 88 bedrijven neusswabs ingestuurd, toen werd in 14 (= 16%) swabs IBR-virus aangetoond.



Actie GD IBR-tankmelkabonnement

Gedurende het tweede kwartaal van 2013 (april t/m juni) kunt u voor slechts € 44,95 (excl. btw) vrijblijvend kennismaken met het GD IBR-tankmelkabonnement. Wie gebruik maakt van deze actie kan in dezelfde periode gratis het bloed van verwerpers laten onderzoeken op afweerstoffen tegen IBR. Daarnaast ontvangen deelnemers kosteloos de IBR-checklist om risicofactoren op hun bedrijf in beeld te brengen. Mocht u besluiten om IBR blijvend onder controle te houden op uw bedrijf, dan kan deelname aan het IBR-tankmelkabonnement dienen als opstap naar vrij-certificering. Na twee jaar kunt u op deze manier het certificaat behalen voor ongeveer een derde van de kosten van certificeren via bloedonderzoek. Tankmelkonderzoek op afweerstoffen tegen IBR is interessant voor zowel bedrijven die vaccineren als bedrijven die niet vaccineren. Er wordt namelijk alleen onderzocht op afweerstoffen tegen het veldvirus en niet op afweerstoffen van vaccin.

Na drie maanden wordt het abonnement automatisch stopgezet en na aanmelding hoeft u verder niets te doen; de melkmonsters worden automatisch genomen via de RMO. Aanmelden kan online via de GD-webwinkel (www.gd-winkel.nl) of telefonisch via 0900-1770.

Typische IBR-verschijnselen

De verschijnselen die genoemd werden waren typische IBR-verschijnselen: neus- en ooguitvloeiing, snotten, ademhalingsproblemen, koorts, soms productieproblemen en eenmaal zelfs plotselinge sterfte. Het is belangrijk om het hele jaar door alert te zijn op deze verschijnselen. Maar geregeld komen er ook IBR-uitbraken voor zonder of met heel weinig verschijnselen. Dergelijke uitbraken zijn o.a. vast te stellen door de tankmelk regelmatig op IBR-afweerstoffen te laten onderzoeken.

Diagnose & behandeling

Wanneer u denkt dat IBR op uw bedrijf speelt, kunt u uw dierenarts, het liefst dezelfde dag, van dieren die acuut ziek zijn een neusslijmmonster laten nemen. Bij een klassieke, zichtbare uitbraak van IBR kan verdere schade door de uitbraak worden beperkt door het koppel zo snel mogelijk in de neus te vaccineren met levend vaccin. Nog niet besmette groepen runderen die in een andere ruimte staan kunnen mogelijk beschermd worden door extra hygiënemaatregelen en vaccinatie.

Aanpak IBR in Europa

In Nederland geldt voor IBR een vrijwillige bestrijding. Melkveehouders die IBR willen bestrijden kunnen kiezen uit een IBR-vrij certificering, IBR monitoren door tankmelkonderzoeken en/of vaccineren. Steeds meer landen om ons heen hebben een artikel 9- of een artikel 10-status voor IBR: bij een artikel 9-status werkt de regio of de lidstaat met een door de EU erkend bestrijdingsplan, bij een artikel 10-status is de regio of het land officieel vrij van een bepaalde dierziekte. In beide gevallen kunnen eisen worden gesteld aan dieren die die landen importeren.

